

## Myrrhentinktur

Tinktur

### Zusammensetzung:

100 g Myrrhentinktur enthalten: arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Tinktur aus Myrrhe (1:5 [Verhältnis Droge zu Auszugsmittel]); Auszugsmittel: Ethanol 90% (V/V)

### Darreichungsform und Inhalt:

30 ml / 50 ml Tinktur

### Stoff- oder Indikationsgruppe:

Pflanzliches Arzneimittel bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum.

### Anwendungsgebiete und Art der Anwendung:

Lokale Behandlung leichter Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut. Zum Betupfen der Mundschleimhaut und zum Gurgeln und Spülen nach Verdünnung.

### Hinweis:

Sollten die Beschwerden länger als eine Woche andauern, wiederkehren oder unklare Beschwerden auftreten, ist ein Arzt aufzusuchen.

### Gegenanzeigen:

Myrrhentinktur ist von Alkoholkranken nicht anzuwenden.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Zur Anwendung von Myrrhentinktur in Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Myrrhentinktur soll daher von diesem Personenkreis nicht angewendet werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

### Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 85 Vol.-% Alkohol.

### Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, werden die betroffenen Schleimhautstellen 2-3 mal täglich mit der Tinktur betupft bzw. es werden zum Gurgeln oder Spülen 5 bis 10 Tropfen Tinktur in ein Glas Wasser gegeben. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Hinweise für den Fall von Anwendungsfehlern oder Überdosierung:

Eine Einnahme von größeren Mengen Myrrhentinktur kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen. In diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhalts werden 20,2 g Alkohol (Flasche 30 ml) bzw. 33,7 g Alkohol (Flasche 50 ml) aufgenommen.

### Nebenwirkungen:

Bei unverdünnter Anwendung der Tinktur können vorübergehend ein leichtes Brennen und eine Geschmacksirritation auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### Hinweise:

Dicht verschlossen, vor Licht geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

*Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im September 2017.*

### Pharmazeutisches Unternehmen:

Henry Lamotte Oils GmbH

Merkurstrasse 47

28197 Bremen

e-mail: rezepturwaren@lamotte-oils.de

Qualität für höchste Ansprüche

**SCHLÜSSEL-ÖLE®**

