

## **Biochemische Mineralsalze nach Dr. W. H. Schüssler**

**Schüssler Nr. 11  
Silicea D6**

### **Homöopathisches Arzneimittel**

#### **Gebrauchsinformation**

**400/ 1000 Tabletten zum Einnehmen**

#### **Zur Anwendung bei Erwachsenen**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Wenn während der Anwendung des Arzneimittels Ihre Beschwerden bestehen bleiben, holen Sie sich bitte medizinischen Rat.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

#### **1 Tablette enthält den Wirkstoff**

Acidum silicicum Trit. D6 250mg  
sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Kartoffelstärke

Dieses Arzneimittel enthält Lactose (bitte verdeckten Text beachten).

#### **Pharmazeutischer Unternehmer/ Hersteller**

Apofaktur e.K.  
Bahnhofstraße 52, D-70734 Fellbach

Apothekenpflichtig  
Reg.-Nr.: 8555.55.53

Verwendbar bis: [Monat/Jahr]  
Ch.-B.:

#### **Hinweise zur sicheren Anwendung**

Nicht anzuwenden bei bekannter Allergie gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile Kartoffelstärke und Magnesiumstearat.

Die Anwendung bei Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren erfolgt nur nach Rücksprache mit dem homöopathisch erfahrenen Therapeuten.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose, daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt einnehmen, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckerarten leiden.

#### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette ein. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Die Tabletten sollten mit einem zeitlichen Abstand zu den Mahlzeiten eingenommen werden.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach dem aufgedruckten Verfallsdatum!

Haltbarkeit nach Öffnen des Gefäßes: 12 Monate

**Stand der Information:** 09/2019

### **Wechselwirkungen**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### **Nebenwirkungen**

Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.