

# Gebruuchsinformation

*Liebe Patientin, lieber Patient!*

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **GINKGOBAKEHL® D4** Flüssige Verdünnung Homöopathisches Arzneimittel

**Wirkstoff:** Ginkgo biloba e foliis sicc. Dil. D4

### **Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

### **Hinweis an den Anwender:**

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

### **Gegenanzeigen:**

**GINKGOBAKEHL® D4** darf nicht eingenommen werden

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Ginkgo biloba
- in der Schwangerschaft

*Wann dürfen Sie **GINKGOBAKEHL® D4** erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?*

Bei Alkohol- oder Leberkranken sollte aufgrund des Alkoholgehaltes das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

*Was müssen Sie in der Stillzeit beachten?* Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Stillzeit nicht angewendet werden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?* Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern und Jugendlichen liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Patienten mit einer krankhaft erhöhten Blutungsneigung (hämorrhagische Diathese) und gleichzeitiger Einnahme von gerinnungshemmenden Mitteln (Antikoagulantien) und Medikamenten, welche die Verklumpung von Blutplättchen hemmen (Thrombozytenaggregationshemmer) sollten **GINKGOBAKEHL® D4** nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

Zubereitungen aus Ginkgo können zu einer Verstärkung der Blutungsneigung führen, die Einnahme von **GINKGOBAKEHL® D4** sollte deshalb 3 bis 4 Tage vor einer Operation vorsichtshalber beendet werden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Wird das Arzneimittel gleichzeitig mit gerinnungshemmenden Arzneimitteln (Antikoagulantien) angewendet, kann deren Wirkung verstärkt werden. Bei der Anwendung von Medikamenten, welche die Verklumpung von Blutplättchen hemmen (Thrombozytenaggregationshemmer und andere nicht steroidale Antiphlogistika), kann deren Effekt beeinflusst werden.

### **Allgemeiner Hinweis:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### **Warnhinweise:**

Dieses Präparat enthält 52 Vol.-% Alkohol (Ethanol)! Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (entsprechend 5 Tropfen) bis zu 0,05 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann.

*Wieviel und wie oft sollten Sie **GINKGOBAKEHL® D4** anwenden?* Soweit nicht anders verordnet ist die übliche Dosis für Erwachsene: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6x täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Die Einnahme sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3x täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

1 Milliliter **GINKGOBAKEHL® D4** enthält ca. 42 Tropfen.

*Wie lange sollten Sie **GINKGOBAKEHL® D4** anwenden?* Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden. Hinweis zur korrekten Entnahme aus der Tropfflasche siehe unten.

### **Nebenwirkungen:**

Es wurden nach der Einnahme von **GINKGOBAKEHL® D4** Magen-Darm-Beschwerden, Fieber, Kopfschmerzen, Überempfindlichkeitsreaktionen oder allergische Hautreaktionen (Rötung, Schwellung, Juckreiz) beobachtet. Darüber hinaus wurde bei Langzeitanwendung sehr selten über Blutungen berichtet, deren ursächlicher Zusammenhang mit der Einnahme von Ginkgo-Zubereitungen nicht gesichert ist.

*Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?*

In diesem Fall sollten Sie die Anwendung unterbrechen und einen Arzt aufsuchen.

### Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### Hinweis:

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze.

### Zusammensetzung:

10 ml flüssige Verdünnung enthalten:

Wirkstoff:

10 ml **Ginkgo biloba e foliis sicc. Dil. D4** (HAB, Vorschrift 4a, Lsg. D1 mit Ethanol 62 % (m/m)).

### Darreichungsform und Inhalt:

10 ml / 30 ml / 100 ml flüssige Verdünnung zum Einnehmen.



### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

**SANUM-Kehlbeck**  
GmbH & Co. KG

Postfach 1355 · D-27316 Hoya  
Tel.: + 49 (0)42 51 - 9352-0  
Fax: + 49 (0)42 51 - 93 52 -291  
E-Mail: [info@sanum.com](mailto:info@sanum.com)

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Reg.-Nr.: 15304.00.00

Apothekenpflichtig

Stand der Gebrauchsinformation: 12 / 2017

Zur weiteren Anwendung steht **GINKGOBAKEHL® D4**, Flüssige Verdünnung zur Injektion zur Verfügung.



Trennung an der abstehenden Lasche anfassen und rundherum abziehen.



Weiße Schutzkappe mit Daumen und Zeigefinger kräftig anfassen und zur Seite abknicken.



Tropfenweise Entnahme durch vorsichtiges Zusammendrücken der Gummipipette mit Daumen und Zeigefinger



Nach Gebrauch Schutzkappe fest aufdrücken bis sie hörbar einrastet. Hierdurch dichter Verschluss der Tropflasche.