

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

- Lenalidomid HEXAL 2,5 mg Hartkapseln**
- Lenalidomid HEXAL 5 mg Hartkapseln**
- Lenalidomid HEXAL 7,5 mg Hartkapseln**
- Lenalidomid HEXAL 10 mg Hartkapseln**
- Lenalidomid HEXAL 15 mg Hartkapseln**
- Lenalidomid HEXAL 20 mg Hartkapseln**
- Lenalidomid HEXAL 25 mg Hartkapseln**

Lenalidomid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
• Wenn Sie Fragen zum Packungsbeilage haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt. Vielleicht möchten Sie dies später nochmals lesen.
• Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
• Dieses Arzneimittel enthält einen Wirkstoff, der verschluckt werden kann, wenn Sie nicht auf die Waage achten. Es kann anderen Menschen schaden, wenn Sie dieses Arzneimittel an andere weitergeben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, wenn Sie dieses Arzneimittel an andere weitergeben.
• Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. (Siehe Abschnitt 4.)

Was in dieser Packungsbeilage steht

- 1. Was ist Lenalidomid HEXAL und wofür wird es angewendet?
- 2. Was sollte Sie vor der Einnahme von Lenalidomid HEXAL beachten?
- 3. Wie sollte Lenalidomid HEXAL eingenommen werden?
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- 5. Wie ist Lenalidomid HEXAL aufzubewahren?
- 6. Was ist in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist Lenalidomid HEXAL und wofür wird es angewendet?

Was ist Lenalidomid HEXAL?
Lenalidomid HEXAL enthält den Wirkstoff lenalidomid. Dieses Arzneimittel gehört zur Klasse der Immunmodulatoren, die die Funktion des Immunsystems beeinflussen.

Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?

- Lenalidomid HEXAL wird angewendet bei Erwachsenen mit:
 - Myelodysplastischen Syndrom
 - Myelofibrose
 - Polypolämyelom

Polypolämyelom

Ein multiples Myelom ist eine Krebsart, die bestimmte weiße Blutkörperchen (Antikörper) überproduziert. Diese Antikörper sammeln sich im Knochenmark an und töteln sich gegenseitig ab. Dadurch können die Knochen und Nieren geschädigt werden.

Das multiple Myelom kann im Allgemeinen nicht geheilt werden. Allerdings können die Anzeichen und Symptome stark abgeschwächt werden oder eine Zeit lang sogar ganz verschwinden. Dies kann durch eine Behandlung mit einem Arzneimittel wie Lenalidomid erreicht werden.

Neu diagnostiziertes multiples Myelom – bei Patienten nach einer Knochenmarkstrahlentherapie

Lenalidomid HEXAL wird allein als Erhaltungstherapie nach einer Bestrahlung der Patienten mit Transplantat angewendet.

Neu diagnostiziertes multiples Myelom – bei Patienten bei denen eine Knochenmarkstrahlentherapie durchgeführt wurde

Lenalidomid HEXAL wird zusammen mit anderen Arzneimitteln zur Behandlung eines multiples Myeloms eingesetzt. Diese anderen antineoplastischen Arzneimittel („Chemotherapie“) sind:

- mit dem Chemotherapeutikum „Bortezomib“
- mit einem antineoplastischen Arzneimittel („Chemotherapie“)

• mit „Melphalan“, einem Chemotherapeutikum, und mit einem anderen antineoplastischen Arzneimittel („Chemotherapie“).

Zu Ihrer Behandlung nehmen Sie diese anderen Arzneimittel zusammen mit Lenalidomid HEXAL ein, später nehmen Sie nur noch Lenalidomid HEXAL ein.

Wenn Sie 75 Jahre oder älter sind und wenn Ihre Nierenfunktion stark eingeschränkt ist, wird Ihnen ein Arzt vor Behandlungsbeginn sorgfältig untersuchen.

Multiples Myelom – bei Patienten, die zuvor bereits eine Bestrahlung erhalten haben

Lenalidomid HEXAL wird in Kombination mit dem antineoplastischen Arzneimittel „Dexamethason“ eingenommen.

Lenalidomid HEXAL kann die Verschärfung der Anzeichen und Symptome des multiples Myeloms verhindern. Dies wird außerdem gezeigt, dass Lenalidomid HEXAL das Wiederkehren des multiples Myeloms nach erfolgter Behandlung verzögert.

Myelodysplastische Syndrome (MDS)

Unter MDS wird eine Gruppe von verschiedenen Erkrankungen des Knochenmarks und Knochenmarkszellen und Blutzellen entwickelt sich abnorm und können ihre Funktion nicht mehr richtig erfüllen. Die betroffenen Patienten können sich für eine Anzahl von Anzeichen und Symptomen auszeichnen, unter einer niedrigen Zahl von Blutzellen, ein beeinträchtigtes Immunsystem und haben ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Lenalidomid HEXAL wird allein angewendet zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit diagnostiziertem MDS, wenn die Knochenmarkszellen und Blutzellen nicht mehr richtig funktionieren. Dies wird außerdem gezeigt, dass Lenalidomid HEXAL die Wahrscheinlichkeit für ein erneutes Auftreten von Blutzellen („transfusionsabhängige Regämie“).

• Sie sind bei der Anzahl der Knochenmarkszellen, die abnormale Blutzellen produzieren, erhöht. Dies wird außerdem gezeigt, dass Lenalidomid HEXAL die Wahrscheinlichkeit für ein erneutes Auftreten von Blutzellen („transfusionsabhängige Regämie“).

• Sie haben eine Anämie, was bedeutet, dass Ihr Körper nicht genügend rote Blutzellen produziert.

• Andere Behandlungen, die Sie erhalten haben, waren ungenügend oder nicht ausreichend wirksam.

Lenalidomid HEXAL kann die Anzahl von gesunden roten Blutzellen im Körper erhöhen, indem es die Anzahl der abnormen Zellen verringert.

• Das kann die Anzahl der benötigten Blutzelltransfusionen senken und die Wahrscheinlichkeit für eine Transfusion mindern.

Myelofibrose (MFI)

Lenalidomid HEXAL wird zusammen mit anderen Arzneimitteln namens „Rituximab“ zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit vorbehandelter Myelofibrose angewendet.

Follikuläres Lymphom (FL)

Das FL ist eine langsam wachsende Krebsart der B-Lymphozyten. Diese Zellen gehören zu den weißen Blutzellen, die für die Immunabwehr des Körpers verantwortlich sind. Wenn Sie ein FL haben, können sich die weißen Blutzellen im Knochenmark, im Lymphknoten und in der Milz ansammeln.

Lenalidomid HEXAL wird zusammen mit einem anderen Arzneimittel namens „Rituximab“ zur Behandlung von erwachsenen Patienten angewendet, die sich in der ersten Phase der Erkrankung befinden.

• Wenn Sie allergisch gegen Lenalidomid oder einen der anderen Inhaltsstoffe dieses Arzneimittels sind, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Wenn Sie allergisch gegen Lenalidomid sind, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Wenn Sie irgendwelche dieser Punkte auf Sie zutrifft, sollten Sie Lenalidomid HEXAL nicht einnehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bleien sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Ihrem behandelnden Fachpersonal, bevor Sie Lenalidomid HEXAL einnehmen, wenn:

- Sie schwanger sind, vermuten, schwanger zu sein, oder eine Schwangerschaft planen, **da es erwartet ist, dass Lenalidomid HEXAL dem ungeborenen Kind schaden** (siehe Abschnitt 3.2) „Schwangerschaft, Stillzeit und Empfängnisverhütung“ – Informationen für Frauen und Männer)
- wenn Sie schwanger werden können, so es sind, wenn Sie befruchtet werden könnten, wenn Sie schwanger sind, wenn Sie schwanger werden (siehe Abschnitt 2. „Schwangerschaft, Stillzeit und Empfängnisverhütung“ – Informationen für Frauen und Männer)
- Sie eine Schwangerschaft planen, **da es erwartet ist, dass Lenalidomid HEXAL dem ungeborenen Kind schaden** (siehe Abschnitt 3.2) „Schwangerschaft, Stillzeit und Empfängnisverhütung“ – Informationen für Frauen und Männer)
- wenn Sie in der Vergangenheit schon einmal mehrere der folgenden Symptome gleichzeitig aufgetreten sind: ausgebreiteter Hautausschlag, rote, hohle Flecken

• Sie an einer Nierenfunktionsstörung leiden – Ihr Arzt wird Lenalidomid HEXAL nicht einnehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie sich nicht sicher sind.

• Sie an einer Herz-Kreislauferkrankung leiden, wenn Sie einen Bluthochdruck haben oder Sie schon einmal einen Bluthochdruck hatten oder wenn Sie rauchen, hohen Bluthochdruck oder hohe Cholesterinwerte haben.

• Sie an einer Nierenfunktionsstörung leiden – Ihr Arzt wird Lenalidomid HEXAL nicht einnehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie sich nicht sicher sind.

• Sie an einer Nierenfunktionsstörung leiden – Ihr Arzt wird Lenalidomid HEXAL nicht einnehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie sich nicht sicher sind.

haben. Sie dürfen während der Behandlung und für mindestens 7 Tage nach Ende der Behandlung keinen Samen spenden.

Verkehrsmittel und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Wenn Sie nach der Einnahme dieses Arzneimittels müde sind, wenn Sie sich benommen, müde, schläfrig oder schwindlig fühlen oder bemerken, dass Sie sich verschlimmern sehen, sollten Sie Lenalidomid HEXAL nicht einnehmen.

Lenalidomid HEXAL enthält Lactose und Natrium

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg pro Kapsel, d. h. es ist nahezu „natriumfrei“).

3. Wie ist Lenalidomid HEXAL einzunehmen?

Die Behandlung mit Lenalidomid HEXAL muss unter der Aufsicht von Ärzten erfolgen, die Erfahrung in der Behandlung von erwachsenen Patienten mit MDS, MFI oder FL haben.

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, bei denen keine Knochenmarkstrahlentherapie durchgeführt werden kann, oder die zuvor Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. „Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?“).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten nach einer Knochenmarkstrahlentherapie oder zur Behandlung von Patienten mit MDS, MFI oder FL wird es eingenommen zusammen mit anderen Arzneimitteln namens „Rituximab“ eingenommen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Behandlungssykli

Lenalidomid HEXAL wird in bestimmten Tagen eines Zeitraums von 3 Wochen (21 Tage) eingenommen.

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, bei denen keine Knochenmarkstrahlentherapie durchgeführt werden kann, oder die zuvor Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. „Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?“).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten nach einer Knochenmarkstrahlentherapie oder zur Behandlung von Patienten mit MDS, MFI oder FL wird es eingenommen zusammen mit anderen Arzneimitteln namens „Rituximab“ eingenommen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden die weiteren Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bitte den jeweiligen Packungsbeilagen dieser Arzneimittel entnehmen.

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free



10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free

10 cm
10 cm
Free
Free
Free
Free



- Kapselhülle: Gelatine, Titandioxid und Eisen(II)-hydroxid-oxid x H₂O
- Druckrinne: Schellack (gelblich, entwachert), Propylenglycol, konzentrierte Ammoniak-Lösung, Kaliumhydroxid und Eisen(II)-III-oxid

Lenalidomid HEXAL 10 mg Hartkapseln

- Der Wirkstoff ist Lenalidomid. Jede Kapsel enthält 10 mg Lenalidomid.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
 - Kapselhülle: Lactose, mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium und Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]
 - Kapselhülle: Gelatine, Titandioxid, Indigocarmin und Eisen(II)-hydroxid-oxid x H₂O
 - Druckrinne: Schellack (gelblich, entwachert), Propylenglycol, konzentrierte Ammoniak-Lösung, Kaliumhydroxid und Eisen(II)-III-oxid

Lenalidomid HEXAL 15 mg Hartkapseln

- Der Wirkstoff ist Lenalidomid. Jede Kapsel enthält 15 mg Lenalidomid.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
 - Kapselhülle: Lactose, mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium und Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]
 - Kapselhülle: Gelatine, Titandioxid, Indigocarmin
 - Druckrinne: Schellack (gelblich, entwachert), Propylenglycol, konzentrierte Ammoniak-Lösung, Kaliumhydroxid und Eisen(II)-III-oxid

Lenalidomid HEXAL 20 mg Hartkapseln

- Der Wirkstoff ist Lenalidomid. Jede Kapsel enthält 20 mg Lenalidomid.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
 - Kapselhülle: Lactose, mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium und Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]
 - Kapselhülle: Gelatine und Titandioxid, Indigocarmin und Eisen(II)-hydroxid-oxid x H₂O
 - Druckrinne: Schellack (gelblich, entwachert), Propylenglycol, konzentrierte Ammoniak-Lösung, Kaliumhydroxid und Eisen(II)-III-oxid

Lenalidomid HEXAL 25 mg Hartkapseln

- Der Wirkstoff ist Lenalidomid. Jede Kapsel enthält 25 mg Lenalidomid.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
 - Kapselhülle: Lactose, mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium und Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]
 - Kapselhülle: Gelatine und Titandioxid
 - Druckrinne: Schellack (gelblich, entwachert), Propylenglycol, konzentrierte Ammoniak-Lösung, Kaliumhydroxid und Eisen(II)-III-oxid

Wie Lenalidomid HEXAL aussieht und Inhalt der Packung

Lenalidomid HEXAL 2,5 mg Hartkapseln
 Unlurchsichtiges weißes Ulnar- und undurchsichtiges grünes bis hellgrünes Oberteil, mit einer Länge von ungefähr 14,3 mm, mit den Aufdrucken „L9NL“ und „2,5“.

Lenalidomid HEXAL 5 mg Hartkapseln
 Unlurchsichtiges weißes Ulnar- und undurchsichtiges weißes Oberteil, mit einer Länge von ungefähr 16,0 mm, mit den Aufdrucken „L9NL“ und „5“.

Lenalidomid HEXAL 7,5 mg Hartkapseln
 Unlurchsichtiges weißes Ulnar- und undurchsichtiges gelbes Oberteil, mit einer Länge von ungefähr 16,0 mm, mit den Aufdrucken „L9NL“ und „7,5“.

Lenalidomid HEXAL 10 mg Hartkapseln
 Unlurchsichtiges gelbes Ulnar- und undurchsichtiges grünes bis hellgrünes Oberteil, mit einer Länge von ungefähr 21,7 mm, mit den Aufdrucken „L9NL“ und „10“.

Lenalidomid HEXAL 15 mg Hartkapseln
 Unlurchsichtiges weißes Ulnar- und undurchsichtiges blaues bis hellblaues Oberteil, mit einer Länge von ungefähr 21,7 mm, mit den Aufdrucken „L9NL“ und „15“.

Lenalidomid HEXAL 20 mg Hartkapseln
 Unlurchsichtiges blaues bis hellblaues Ulnar- und undurchsichtiges grünes bis hellgrünes Oberteil, mit einer Länge von ungefähr 21,7 mm, mit den Aufdrucken „L9NL“ und „20“.

Lenalidomid HEXAL 25 mg Hartkapseln
 Unlurchsichtiges weißes Ulnar- und undurchsichtiges weißes Oberteil, mit einer Länge von ungefähr 21,7 mm, mit den Aufdrucken „L9NL“ und „25“.

OPA/Aluminium/PVC/Aluminium Blisterpackungen, OPA/Aluminium/PVC/Aluminium Kalender-Blisterpackungen, Perforierte OPA/Aluminium/PVC/Aluminium Blisterpackungen zur Abgabe von Einzeldosen.

Perforierte OPA/Aluminium/PVC/Aluminium Kalender-Blisterpackungen zur Abgabe von Einzeldosen.

Packungsgrößen
 OPA/PVC/Al Blisterpackungen: Packungen mit 7, 14, 21, 28 und 42 Hartkapseln.

OPA/Al/PVC/Al Kalender-Blisterpackungen: Packungen mit 7, 14, 21, 28 und 42 Hartkapseln in 1, 2, 3, 4 bzw. 6 Blisterpackungen à 7 Hartkapseln.

Perforierte OPA/Al/PVC/Al Blisterpackungen zur Abgabe von Einzeldosen: Packungen mit 7x1, 14x1, 21x1 und 28x1 Hartkapsel.

Perforierte OPA/Al/PVC/Al Kalender-Blisterpackungen zur Abgabe von Einzeldosen: Packungen mit 7x1, 14x1, 21x1 und 28x1 Hartkapsel.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer
 Haus AG
 Industriestrasse 25
 83607 Holzkirchen
 Telefon: (0824) 908-0
 Telefax: (0824) 908-1290
 E-Mail: service@hexal.com

Hersteller
 Solinus Pharma GmbH
 Otto-von-Guericke-Allee 1
 39179 Barleben

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und im Vereinigten Königreich (Nordirland) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

- Belgien: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Bulgarien: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Kroatien: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Tschechische Republik: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Dänemark: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Finnland: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Deutschland: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Griechenland: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Ungarn: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Island: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Italien: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Niederlande: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Norwegen: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Polen: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Portugal: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Rumänien: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Slowakei: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Slowenien: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Spanien: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Schweden: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
- Vereinigtes Königreich (Nordirland): Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln

Lenalidomid Sandoz 2,5 mg harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 5 mg harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 7,5 mg harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 10 mg harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 15 mg harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 20 mg harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 25 mg harte capsules

Lenalidomid Sandoz 5 mg hard capsules
 Lenalidomid Sandoz 10 mg hard capsules
 Lenalidomid Sandoz 15 mg hard capsules
 Lenalidomid Sandoz 20 mg hard capsules
 Lenalidomid Sandoz 25 mg hard capsules

Lenalidomid Sandoz 2,5 mg harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 5 mg harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 7,5 mg harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 10 mg harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 15 mg harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 20 mg harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 25 mg harte capsules

Lenalidomid Sandoz 2,5 mg oklirp'd kapsul
 Lenalidomid Sandoz 5 mg oklirp'd kapsul
 Lenalidomid Sandoz 7,5 mg oklirp'd kapsul
 Lenalidomid Sandoz 10 mg oklirp'd kapsul
 Lenalidomid Sandoz 15 mg oklirp'd kapsul
 Lenalidomid Sandoz 20 mg oklirp'd kapsul
 Lenalidomid Sandoz 25 mg oklirp'd kapsul

Lenalidomid Sandoz 10 mg kemény kapszula
 Lenalidomid Sandoz 15 mg kemény kapszula
 Lenalidomid Sandoz 20 mg kemény kapszula
 Lenalidomid Sandoz 25 mg kemény kapszula

Lenalidomid Sandoz 2,5 mg hörð hyll
 Lenalidomid Sandoz 5 mg hörð hyll
 Lenalidomid Sandoz 7,5 mg hörð hyll
 Lenalidomid Sandoz 10 mg hörð hyll
 Lenalidomid Sandoz 15 mg hörð hyll
 Lenalidomid Sandoz 20 mg hörð hyll
 Lenalidomid Sandoz 25 mg hörð hyll

Lenalidomid Rowex 2,5 mg hard capsules
 Lenalidomid Rowex 5 mg hard capsules
 Lenalidomid Rowex 7,5 mg hard capsules
 Lenalidomid Rowex 10 mg hard capsules
 Lenalidomid Rowex 15 mg hard capsules
 Lenalidomid Rowex 20 mg hard capsules
 Lenalidomid Rowex 25 mg hard capsules

Lenalidomid Sandoz 2,5 mg, harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 5 mg, harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 7,5 mg, harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 10 mg, harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 15 mg, harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 20 mg, harte capsules
 Lenalidomid Sandoz 25 mg, harte capsules

Lenalidomid Sandoz 2,5 mg kapsule
 Lenalidomid Sandoz 5 mg kapsule
 Lenalidomid Sandoz 7,5 mg kapsule
 Lenalidomid Sandoz 10 mg kapsule
 Lenalidomid Sandoz 15 mg kapsule
 Lenalidomid Sandoz 20 mg kapsule
 Lenalidomid Sandoz 25 mg kapsule

Lenalidomid Sandoz 2,5 mg kapsule
 Lenalidomid Sandoz 5 mg kapsule
 Lenalidomid Sandoz 7,5 mg kapsule
 Lenalidomid Sandoz 10 mg kapsule
 Lenalidomid Sandoz 15 mg kapsule
 Lenalidomid Sandoz 20 mg kapsule
 Lenalidomid Sandoz 25 mg kapsule

Lenalidomid Sandoz 2,5 mg kapsul, hard
 Lenalidomid Sandoz 5 mg kapsul, hard
 Lenalidomid Sandoz 7,5 mg kapsul, hard
 Lenalidomid Sandoz 10 mg kapsul, hard
 Lenalidomid Sandoz 15 mg kapsul, hard
 Lenalidomid Sandoz 20 mg kapsul, hard
 Lenalidomid Sandoz 25 mg kapsul, hard

Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
 Lenalidomid Sandoz 5 mg - Hartkapseln
 Lenalidomid Sandoz 7,5 mg - Hartkapseln
 Lenalidomid Sandoz 10 mg - Hartkapseln
 Lenalidomid Sandoz 15 mg - Hartkapseln
 Lenalidomid Sandoz 20 mg - Hartkapseln
 Lenalidomid Sandoz 25 mg - Hartkapseln

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2023.

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und Hexal wünschen gute Besserung!

12 mm
Text Free Area

12 mm
Text Free Area

12 mm
Text Free Area

70 mm

OLD

50102980

8908.2001