

Liebe Patientin, lieber Patient !

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Poly-cyl® L

Ho-Len-Complex® Gelenkschmerz-Complex

Zusammensetzung:

10 g (entsprechend 10,8 ml) Mischung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Colchicum	Dil. D4	1,5 g
Dulcamara	Dil. D4	1,5 g
Ferrum phosphoricum	Dil. D8	1,5 g
Guajacum	Dil. D3	1,5 g
Kalium jodatum	Dil. D4	1,0 g
Rhus toxicodendron	Dil. D4	1,5 g
Spiraea ulmaria	Ø	1,5 g

1 ml entspricht 21 Tropfen

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackung mit 30 ml / 50 ml / 100 ml Mischung

Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:



Pharma Liebermann GmbH

Hauptstr. 27

D- 89423 Gundelfingen/Donau

Telefon: (09073) 9 58 93 - 0

Telefax: (09073) 9 58 93 - 55

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung des Befindens bei Gelenkschmerzen.

Hinweis:

Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Poly-cyl® L Ho-Len-Complex® Gelenkschmerz-Complex nicht anwenden?

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse sowie bei Alkoholkranken.

Wann dürfen Sie Poly-cyl® L Ho-Len-Complex® Gelenkschmerz-Complex erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Poly-cyl® L Ho-Len-Complex® Gelenkschmerz-Complex nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Bei Leberkranken ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Wegen des Bestandteils Colchicum darf das Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Warnhinweis:

Poly-cyl® L Ho-Len-Complex® Gelenkschmerz-Complex enthält 52 Vol.% Alkohol!

Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Poly-cyl® L Ho-Len-Complex® Gelenkschmerz-Complex nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da sonst Poly-cyl® L Ho-Len-Complex® Gelenkschmerz-Complex nicht richtig wirken kann!

Wieviel und wie oft sollten Sie Poly-cyl® L Ho-Len-Complex® Gelenkschmerz-Complex anwenden?

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Die Einnahme sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Wie und wann sollten Sie Poly-cyl® L Ho-Len-Complex® Gelenkschmerz-Complex anwenden?

Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser einnehmen und einige Zeit im Mund belassen.

Wie lange sollten Sie Poly-cyl® L Ho-Len-Complex® Gelenkschmerz-Complex anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Poly-cyl® L Ho-Len-Complex® Gelenkschmerz-Complex auftreten?

In sehr seltenen Fällen können - auch einige Tage nach der Einnahme des Arzneimittels - Magen-Darm-Beschwerden oder Hautreaktionen auftreten.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Etikett sowie auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: Mai 2011

Zul-Nr. 6657993.00.00

Aktualisierungsstand [Gebrauchs.info](#) August 2013