

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden  
Telefon: 07221 501-00, Telefax: 07221 501-210, E-Mail: info@heel.de

**Bezeichnung des Tierarzneimittels**

---

# Engystol<sup>®</sup><sub>T</sub>

ad us. vet.

---

Tabletten

Homöopathisches Arzneimittel

Für Tiere

Hund, Katze

**Zusammensetzung:** 1 Tablette zu 301,5 mg enthält: Wirkstoffe: Sulfur Trit. D4 36,0 mg, Sulfur Trit. D10 36,0 mg, Vincetoxicum e cinere Trit. D30 (HAB, Vorschrift 6) 12,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria Trit. D6 72,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria Trit. D10 72,0 mg, Vincetoxicum hirundinaria Trit. D30 72,0 mg. Die Bestandteile 1 bis 6 werden über die letzten zwei Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40c mit Lactose-Monohydrat als Verreibung gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat.

**Anwendungsgebiet(e):** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

**Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels.


**Nebenwirkungen:** Keine bekannt. Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine schwerwiegende Nebenwirkung oder eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese bitte dem Tierarzt mit.

**Zieltierart(en):** Hund, Katze

---

**-Heel Vet**

---



**Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:** Tabletten zum Eingeben  
Standarddosierung: Die Tagesdosis beträgt entsprechend der Tierart:  
Großer Hund (über 25 kg): 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 3 Tabletten  
Mittelgroßer Hund (15-25 kg): 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 2 Tabletten  
Kleiner Hund (bis zu 15 kg), Katze: 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 1 Tablette  
Je nach Beschwerden kann die Standarddosierung an bis zu fünf aufeinanderfolgenden Tagen gegeben werden.

**Initial-/Akutdosierung:** Bei akuten Beschwerden anfangs alle halbe bis ganze Stunde über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden die angegebene Einzeldosis verabreichen, dann mit der Standarddosierung fortfahren.

**Dosierung zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen:** Zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen die Einzeldosis jeweils in Abständen von 2 bis 4 Tagen verabreichen. Hinweis: Engystol T ad us. vet. sollte ohne tierärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

**Wartezeit:** Entfällt

**Besondere Lagerungshinweise:** Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich. Nach Anbruch 12 Monate haltbar. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren! Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

**Besondere Warnhinweise:**

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart: Keine.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender: Keine bekannt.

**Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:** Zur Verträglichkeit von Engystol T ad us. vet. bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

**Wechselwirkungen:** Keine bekannt. Wenn Engystol T ad us. vet. gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie Ihren Tierarzt.

**Genehmigungsdatum der Packungsbeilage:** Juli 2020

**Weitere Angaben:**

Packungsgrößen: 100 und 500 Tabletten

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 402677.00.00

