

## Gebrauchsinformation

### **Liebe Patientin, lieber Patient,**

**bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Die Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Agaricus comp. / Phosphorus und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Agaricus comp. / Phosphorus beachten?
3. Wie ist Agaricus comp. / Phosphorus anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

# Agaricus comp. / Phosphorus

## Flüssige Verdünnung zur Injektion



### **1. Was ist Agaricus comp. / Phosphorus und wofür wird es angewendet?**

Agaricus comp. / Phosphorus ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Osteoporose.

### **Anwendungsgebiete**

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehört zu den Anwendungsgebieten die Verminderung des Knochengewebes (Osteoporose), insbesondere schmerzhafte Formen.

### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Agaricus comp. / Phosphorus beachten?**

#### **Agaricus comp. / Phosphorus darf nicht angewendet werden:**

- bei bekannter Allergie gegen einen der Wirkstoffe oder gegen Milchprotein.

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Bei anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

#### **Kinder**

Bei Kindern unter 12 Jahren sollte Agaricus comp. / Phosphorus Flüssige Verdünnung zur Injektion nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wie alle Arzneimittel sollte Agaricus comp. / Phosphorus in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln**

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **3. Wie ist Agaricus comp. / Phosphorus anzuwenden?**

Wenden Sie Agaricus comp. / Phosphorus immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes an.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*

1 - 3 mal wöchentlich bis 1 mal täglich 1 ml subcutan injizieren.

Die subcutane Injektion erfolgt in der Regel in den Oberschenkel oder die Oberarmaußenseite bzw. in die Bauchregion. Nach Säuberung der Einstichstelle (z.B. durch Abreiben mit 70%igem Alkohol) eine Hautfalte bilden und die Injektionsnadel schräg einstechen. Den Spritzenstempel leicht zurückziehen. Sollte Blut erscheinen, wurde ein Blutgefäß getroffen. Die Injektion in diesem Fall an einer anderen Stelle wiederholen. Wenn kein Blut erscheint, langsam injizieren, anschließend die Nadel herausziehen und auf die Einstichstelle kurz mit einem Tupfer drücken.

Es wird in jedem Fall empfohlen, die Injektionstechnik durch eine darin erfahrene Person zu erlernen.

#### *Dauer der Anwendung*

Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

*Wenn Sie die Anwendung von Agaricus comp. / Phosphorus vergessen haben:*

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Lactose enthält geringe Mengen Milchprotein und kann deshalb allergische Reaktionen hervorrufen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine Nebenwirkung Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

### **5. Was ist sonst noch wichtig?**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf den Ampullen und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

### **Aufbewahrungsbedingungen**

Nicht über 25 °C lagern.

### **Zusammensetzung**

1 Ampulle enthält: Wirkstoffe: Agaricus (HAB 34) Dil. D8 [HAB, V. 3a, D2 mit Ethanol 43 % (m/m), D3 mit Ethanol 30 % (m/m), D4 mit Ethanol 15 % (m/m)] 0,2 g / Argentum metallicum praeparatum Dil. D6 aq. 0,2 g / Aspidium filix-mas, Spora Dil. D3 [HAB, V. 4a; Ø mit Ethanol 62 % (m/m)] 0,2 g / Conchae Dil. D7 aq. 0,2 g / Phosphorus Dil. D6 0,2 g.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.

### **Darreichungsform und Packungsgrößen**

8 Ampullen, 48 Ampullen zu 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** Februar 2011

