

## NeyFama® Nr. 60 D7

### Wirkstoff:

[Extractum lyophilisatum ex corp. luteum lysat. bovis mat. (14 %) et testes lysat. bovis juv. (2 %) et gland. suprarenal. lysat. suis juv. (14 %) et hepar lysat. bovis fetal. et juv. (1:1) (14 %) et lien lysat. bovis fetal. (14 %) et pancreas lysat. bovis juv. (14 %) et mamma lact. lysat. bovis mat. (14 %) et gland. parathyreoid. lysat. suis juv. (14 %)] Dil. D7 aquos.

Homöopathisches Arzneimittel

### Zusammensetzung:

1 Amp. (2 ml) enthält:

#### Arzneilich wirksamer Bestandteil:

[Extractum lyophilisatum ex corp. luteum lysat. bovis mat. (14 %) et testes lysat. bovis juv. (2 %) et gland. suprarenal. lysat. suis juv. (14 %) et hepar lysat. bovis fetal. et juv. (1:1) (14 %) et lien lysat. bovis fetal. (14 %) et pancreas lysat. bovis juv. (14 %) et mamma lact. lysat. bovis mat. (14 %) et gland. parathyreoid. lysat. suis juv. (14 %)] Dil. D7 aquos. (HAB, V. 5b) 20 mg.

**Sonstige Bestandteile:** Natriumchlorid 18,10 mg, Wasser für Injektionszwecke 1961,90 mg.

### Darreichungsformen und Packungsgrößen:

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Originalpackung: 5 OPC-Ampullen zu je 2 ml

Klinikpackung: 50 OPC-Ampullen zu je 2 ml

### Pharmazeutischer Unternehmer:

vitOrgan Arzneimittel GmbH, Postfach 4240, 73745 Ostfildern

Tel. (0711) 44812-0, Fax (0711) 44812-41, E-Mail: [info@vitOrgan.de](mailto:info@vitOrgan.de)

### Hersteller:

Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH  
Industriestraße 3, 34212 Melsungen

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

### Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Eiweißbestandteile vom Rind und/oder Schwein.

Bei Kinderwunsch oder Schwangerschaft und in der Stillzeit darf NeyFama® Nr. 60 D7 nicht angewendet werden.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

NeyFama® Nr. 60 D7 sollte bei Infekten und Entzündungsprozessen nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Wechselwirkungen:**

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, wird 2- bis 3-mal pro Woche 1 Ampulle NeyFama® Nr. 60 D7 i. c., s. c., i. m. appliziert.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat angewandt werden.

### **Nebenwirkungen:**

In Ausnahmefällen kann es bei allergisch disponierten oder vorsensibilisierten Patienten unter der vorgeschlagenen Dosierung zu Übelkeit, Pulsbeschleunigung, Beklemmungsgefühl oder Exanthem kommen. Diese sind durch Antiallergika (Antihistaminika), gegebenenfalls Glucocorticoide, beherrschbar. Bei lokalen Reizerscheinungen sind entzündungshemmende Externa anzuwenden.

Hinweis:

Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

### **Meldungen von Nebenwirkungen:**

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen beim

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
www.bfarm.de

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Nicht über 25° C aufbewahren.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Datum der Fassung der Packungsbeilage: 01/2017

---

## **Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren**

Apothekenpflichtig  
Reg.-Nr.: 2521205.00.00  
0117-02  
07DT89