

## Gebrauchsanweisung für

HERMES

**Cevitt**<sup>®</sup>

HALS &amp; RACHEN

Lutschtabletten

**Liebe Anwenderin, lieber Anwender, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung des Medizinproduktes Cevitt Hals & Rachen Lutschtabletten beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.**

#### **Was ist Cevitt Hals & Rachen und bei welchen Beschwerden kann ich Cevitt Hals & Rachen anwenden?**

Cevitt Hals & Rachen Lutschtabletten werden zur Behandlung von Hustenreiz und gereizter Mund- und Rachenschleimhaut und damit verbundenen Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Heiserkeit angewandt.

Beim Lutschen von Cevitt Hals & Rachen bildet sich im Mund zusammen mit dem Speichel ein Hydrogel. Dieses legt sich wie ein Schutzfilm über die gereizte Mund- und Rachenschleimhaut. So kann sich diese wieder regenerieren und Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Heiserkeit werden gelindert.

#### **Wie ist Cevitt Hals & Rachen anzuwenden?**

Kinder von 6–10 Jahren können alle 4–5 Stunden eine Lutschtablette anwenden. Die Tagesdosis sollte 3 Lutschtabletten nicht überschreiten. Erwachsene und Kinder über 10 Jahren können alle 2–3 Stunden eine Lutschtablette anwenden. Die Tagesdosis sollte 6 Lutschtabletten nicht überschreiten.

Cevitt Hals & Rachen Lutschtabletten sollten nicht zerkaut oder im Ganzen geschluckt werden.

Wenn sich Ihre Beschwerden innerhalb von 3–5 Tagen nicht bessern, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was muss ich bei der Anwendung von Cevitt Hals & Rachen beachten?**

Wann sollte ich auf die Anwendung von Cevitt Hals & Rachen verzichten?

Wenn Sie allergisch gegen einen der Bestandteile von Cevitt Hals & Rachen Lutschtabletten sind, dürfen Sie Cevitt Hals & Rachen nicht anwenden.

Bei einer stark eingeschränkten Speichelproduktion (z. B. durch das Sjögren Syndrom) sollten Cevitt Hals & Rachen Lutschtabletten nicht angewendet werden.

Wann sollte ich vor der Anwendung von Cevitt Hals & Rachen Rücksprache mit einem Arzt halten?

Cevitt Hals & Rachen enthält Aspartam als Quelle für Phenylalanin und kann schädlich sein, wenn Sie eine Phenylketonurie haben.

Cevitt Hals & Rachen enthält Sorbitol. Bitte wenden Sie Cevitt Hals & Rachen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt an, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

#### **Kinder**

Cevitt Hals & Rachen ist für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet.

Cevitt Hals & Rachen darf von Kindern ab 6 Jahren nur dann angewendet werden, wenn gewährleistet ist, dass die Tablette gelutscht werden kann und nicht die Gefahr besteht, dass die Tablette unkontrolliert verschluckt wird.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

##### *Schwangerschaft:*

Über die Anwendung von Cevitt Hals & Rachen während der Schwangerschaft liegen keine Erkenntnisse vor. Wenn Sie schwanger sind, sollte die Anwendung deshalb nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

##### *Stillzeit:*


Stillende Mütter sollten Cevitt Hals & Rachen Lutschtabletten nur nach Absprache mit einem Arzt anwenden.

Anwendung von Cevitt Hals & Rachen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Die Anwendung von Cevitt Hals & Rachen kann durch die Bildung der Hydrogel-Schicht die Resorption von anderen Arzneimitteln verzögern. Durch das in Cevitt Hals & Rachen enthaltene Zink kann es ebenfalls zu einer Verminderung der Wirkung anderer Arzneimittel kommen. Deshalb sollte zwischen der Einnahme von Cevitt Hals & Rachen Lutschtabletten und anderen Medikamenten ein Abstand von 3 Stunden eingehalten werden.

### Wie lange ist Cevitt Hals & Rachen haltbar?

Das Verfallsdatum ist auf dem Röhrchen und der Faltschachtel durch das Symbol  gekennzeichnet. Bitte wenden Sie Cevitt Hals & Rachen Lutschtabletten nach diesem Datum nicht mehr an. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

### Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Cevitt Hals & Rachen Lutschtabletten können bei übermäßiger Einnahme stuhlerweichend und abführend wirken.

### Wie sollte ich Cevitt Hals & Rachen aufbewahren?

Medizinprodukte sorgfältig aufbewahren. Bewahren Sie Cevitt Hals & Rachen Lutschtabletten für Kinder unzugänglich auf.

Cevitt Hals & Rachen Lutschtabletten unter 25°C und trocken lagern.

Entsorgen Sie Cevitt Hals & Rachen Lutschtabletten nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Cevitt Hals & Rachen Lutschtabletten zu entsorgen sind, wenn Sie sie nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

### Weitere Informationen über Cevitt Hals & Rachen

Was Cevitt Hals & Rachen enthält

Carbomer, Xanthan, Natriumhyaluronat, Mannitol, Natriumhydrogencarbonat, Sorbitol, Citronensäure, Aspartam, Vitamin C, Aroma, Zinkcitrat Dihydrat.

Wie Cevitt Hals & Rachen aussieht und Inhalt der Packung

Weiß, runde, flache Lutschtabletten mit einer glatten Oberfläche. Cevitt Hals & Rachen Lutschtabletten sind in Aluminiumröhrchen mit 20 Tabletten erhältlich.

Hersteller

Fairpharm Vertriebs GmbH  
Am Krebsenbach 5-7  
83670 Bad Heilbrunn

Vertreiber

HERMES ARZNEIMITTEL GMBH  
Georg-Kalb-Str. 5-8  
82049 Großhesselohe/München  
Tel.: 089/79102-0 Fax: 089/79102-280

### Diese Gebrauchsanweisung wurde erstellt im März 2014.



Mindestens haltbar bis



Los-Nr.



Packungsbeilage beachten

71317C

## Kennen Sie schon Cevitt® immun direct?

Kein Glas

Kein Wasser

Ideal für unterwegs



#### Cevitt® immun direct

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Verzehrsempfehlung: 1x täglich den Inhalt eines Beutels verzehren. Die Micro-Pellets direkt auf die Zunge geben, langsam zergehen lassen und schlucken. Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.