

**Gegenanzeigen:** Lactoseintoleranz. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Das Arzneimittel sollte wegen nicht ausreichender Untersuchungen in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. **Dosieranleitung:** Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. **Wechselwirkungen:** Keine bekannt. **Allgemeiner Hinweis:** Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt. **Nebenwirkung:** Keine bekannt. **Hinweis:** Bei der Anwendung

homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. **Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit:** Nach Ablauf des auf dem Etikett angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. Nicht über 25°C lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Zusammensetzung:** 1 Tablette enthält: Acidum arsenicosum D6 trit. 25,0 mg, Argentum nitricum D6 trit. 37,5 mg, Kalium bichromicum D8 trit. 37,5 mg, Magnesium phosphoricum D8 trit. 25 mg, Senecarpus anacardium D4 trit. 37,5 mg, Nux vomica D6 trit. 37,5 mg. **Sonstige Bestandteile:** Lactose Monohydrat, Kartoffelstärke, Magnesiumstearat. Enthält Lactose. **Anwendungsgebiete:** Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Hersteller:  
Kattwig Arzneimittel GmbH  
Zur Grenze 30  
48529 Nordhorn

Ch.-B.:

verwendbar bis:

100 Tabletten V. 202306-A3



PZN - 00263610

Tabletten zum Einnehmen  
Apothekenpflichtig

Presselin®  
Gastro



Gebrauchsinformation: HIER OFFNEN

42 mm

Combustin Pharmazeutische Präparate GmbH | Offinger Str. 3 | 88525 Dürmentingen | HOMOÖPATHISCHES ARZNEIMITTEL

V. Stei Hg - O