



# Wobenzym®

## Endlich mehr Tage ohne Gelenkschmerzen\*

\* Als Folge von Verletzungen, verschleißbedingten Gelenkentzündungen (aktivierten Arthrosen).



### Indikationen

Entzündungshemmendes Arzneimittel (Antiphlogistikum). Angewendet zur unterstützenden Behandlung von Erwachsenen bei:

- Schwellungen, Entzündungen oder Schmerzen als Folge von Verletzungen
- oberflächlicher Venenentzündung (Thrombophlebitis)
- schmerzhaften und aktivierten Arthrosen (chronischer Gelenkabnutzung)
- Weichteilrheumatismus (Erkrankungsbild mit Beschwerden im Bereich von Muskeln, Sehnen, Bändern)
- Entzündung des Harn- und Geschlechtstrakts (Urogenitaltrakt)

Die in Wobenzym® enthaltene Enzymkombination wirkt abschwellend und entzündungsregulierend, dadurch wirkt es ursächlich und unterdrückt nicht nur die Symptome.

### Dosierung und Einnahme

- Tagesdosis 6–12 Tabletten, z.B. 2 × 3 oder 2 × 6 Tabletten täglich.
- Erfahrungsgemäß empfiehlt sich eine Einnahme von 2 × 6 Tabletten täglich in der 1. Woche und 2 × 3 Tabletten täglich ab der 2. Woche. Als Kur über 2 Monate: 2 × 3 Tabletten täglich.



Für eine optimale Wirkung sollte die Einnahme außerhalb der Mahlzeiten erfolgen, mindestens 30 Minuten vor oder mindestens 90 Minuten nach dem Essen. Die maximale Dosis von 12 Tabletten täglich soll nicht überschritten werden.

#### Dauer der Anwendung

- Bei akuten Entzündungen bis zum völligen Abklingen der Beschwerden
- Bei chronischen / rezidivierenden Erkrankungen nach Ermessen des Therapeuten
- Zur Langzeittherapie geeignet
- Anwendung ohne ärztlichen Rat nicht länger als 14 Tage



### Inhaltsstoffe

#### Inhaltsstoffe Wobenzym®

##### Wirkstoffe pro Tablette

Bromelain	67,5–76,5 mg eingestellt auf 450 F.I.P Einheiten
Trypsin	32–48 mg eingestellt auf 24 µkat
Rutosid-Trihydrat	100 mg

##### Liste sonstiger Bestandteile

Lactose-Monohydrat, vorverkleisterte Stärke (Mais), Magnesiumstearat [pflanzlich], Stearinsäure, gereinigtes Wasser, hochdisperses Siliciumdioxid, Maltodextrin, Talkum

##### Filmüberzug

Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1), Titandioxid (E171), Macrogol 6000, Triethylcitrat, Vanillin

### Produktvorteile

- Hochwirksam bei Schmerzen und Entzündungen\*
- Effektives Enzympräparat mit Wirkstoffen natürlichen Ursprungs
- Aktiviert den körpereigenen Heilungsprozess durch die unterstützende Wirkung von Enzymen
- Bekämpft die Schmerzursache: die Entzündung\*
- Langfristig gut verträglich

\* Als Folge von Verletzungen, verschleißbedingten Gelenkentzündungen (aktivierten Arthrosen).

### Lagerung

Nicht über 25 °C aufbewahren.  
Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.

### Darreichungsform

Magensaftresistente Tabletten

# Detailinformationen zu **Wobenzym®**



## Gegenanzeigen

Wobenzym® darf nicht angewendet werden

- bei Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, Ananas oder einen der genannten sonstigen Bestandteile
- bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren
- während der Schwangerschaft und Stillzeit
- bei Patienten mit angeborener oder erworbener Blutgerinnungsstörung
- bei Patienten mit schweren Nieren- und / oder Leberschäden
- bei Patienten, die unmittelbar vor einem chirurgischen Eingriff stehen (4 Tage vorher absetzen)
- bei gleichzeitiger Anwendung von Antikoagulanzen und / oder Thrombozytenaggregationshemmern

## Wechselwirkungen

Bei gleichzeitiger Verabreichung mit Antibiotika sind die Plasma- und Urinspiegel von Antibiotika, im Speziellen von Tetracyklinen, Sulfonamiden und Amoxicillin erhöht. Bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten, die die Blutgerinnung beeinflussen, kann die Hemmung der Blutgerinnung verstärkt werden.

## Nebenwirkungen

Gelegentlich: Asthmaähnliche Beschwerden, Völlegefühl, Flatulenz, Veränderung des Stuhls in Beschaffenheit, Farbe, Geruch; Selten: Allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz, Hautrötung, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt verschiedener Art wie Magen-Darm-Krämpfe; Sehr selten: Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Schwitzen, Kopfschmerzen, Hungergefühl.



## Wichtige Hinweise

Nach dem auf dem Umkarton und dem Blister nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Nach dem ersten Öffnen der 800er Dose 6 Monate verwendbar.

Keine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit / Bedienung von Maschinen.

Keine ausreichenden Untersuchungen bei Schwangeren, Stillenden und Kindern.

## Bestellinformationen

VE	Varianten	PZN
100 Stk.	Tabletten	13751831
200 Stk.	Tabletten	13751848
360 Stk.	Tabletten	13751854
800 Stk.	Tabletten	13751860



### Wobenzym® magensaftresistente Tablette

**Anwendungsgebiete:** Zur unterstützenden Behandlung von Erwachsenen bei Schwellungen, Entzündungen oder Schmerzen als Folge von Verletzungen; Thrombophlebitis; Entzündung des Urogenitaltraktes; schmerzhafter und aktivierter Arthrose und Weichteilrheumatismus. **Zusammensetzung:** 1 Tablette enthält als Wirkstoffe: 67,5-76,5 mg Bromelain (eingestellt auf 450 F.I.P.-Einheiten), 32-48 mg Trypsin (eingestellt auf 24 µkat) und 100 mg Rutosid-Trihydrat. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, vorverkleisterte Stärke (Mais), Magnesiumstearat [pflanzlich], Stearinsäure, gereinigtes Wasser, hochdisperses Siliciumdioxid, Maltodextrin, Talkum, Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1), Titandioxid (E171), Macrogol 6000, Triethylcitrat, Vanillin. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Arzneimittels oder Ananas; Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren; Schwangerschaft, Stillzeit; gleichzeitige Einnahme von Medikamenten, die die Blutgerinnung beeinflussen; Blutgerinnungsstörungen wie z.B. Bluterkrankheit; schwere Leber- oder Nierenschäden; unmittelbar anstehende Operation. **Enthält Laktose.** **Nebenwirkungen:** Gelegentlich: Asthmaähnliche Beschwerden, Völlegefühl, Flatulenz, Veränderung des Stuhls in Beschaffenheit, Farbe, Geruch. Selten: Allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz, Hautrötung, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, Magen-Darm-Krämpfe. Sehr selten: Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Schwitzen, Kopfschmerzen, Hungergefühl. Stand: Juni 2017