Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Nortriptylinpaul und Valproinsäure

Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Ende Abschnitt 4.

WARNHINWEIS

Wird Valproat HEXAL® chronic während der Schwangerschaft eingenommen, kann es beim ungeborenen Kind zu angeborenen Schäden kommen. Ihre Ärztin/Ihr Arzt muss Ihnen die Risiken einer Behandlung mit Valproinsäure während der Schwangerschaft erklären und prüfen, ob eine sinkende Methode zur Schwangerschaftsverhütung (Kontrazeptivum) anwendbar. Ihr Arzt wird dieses mit Ihnen besprechen. Sie müssen aber auch den in Abschnitt 2 dieser Packungsbeilage angegebenen Anweisungen folgen.
Die mögliche Anwendung von Valproat HEXAL chronic während der Schwangerschaft, wenn dies notwendig erachtet wird, wird in Abschnitt 2 dieser Packungsbeilage angegeben Anweisungen folgen.
Sie dürfen die Einnahme von Valproat HEXAL chronic nur dann beenden, wenn Ihr Arzt Sie dazu auffordert, da sich ansonsten Ihr Zustand verschlechtern kann.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Valproat HEXAL chronic und wofür wird es angewendet?
2. Was sollte Sie vor der Einnahme von Valproat HEXAL chronic beachten?
3. Wie ist Valproat HEXAL chronic einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Valproat HEXAL chronic aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1 Was ist Valproat HEXAL chronic und wofür wird es angewendet?

Valproat HEXAL chronic ist ein Mittel zur Behandlung von Anfallsleiden (Antiepileptikum).

Valproat HEXAL chronic wird angewendet zur Behandlung von
- Anfällen, die von beiden Gehirnhälften ausgehen (generalisierte Anfälle), z. B. Absencen, myoklonische und tonisch-klonische Anfälle.
- Anfällen, die von einem begrenzten Bereich einer Gehirnhälfte ausgehen (fokale Anfälle) und sich unter Umständen auf beide Gehirnhälften ausbreiten (sekundär-generalisierte Anfälle).

Valproat HEXAL chronic kann bei anderen Anfallsformen, z. B. Anfällen mit gemischtem Erscheinungsbild sowie bei Anfällen, die sich von einem umschriebenen Hirngebiet auf beide Hirnhälften ausbreiten, zusammen mit anderen Arzneimitteln angewendet werden. Ihr Arzt entscheidet gegebenenfalls, wenn diese Anfallsformen auf die übliche antiepileptische Behandlung nicht ansprechen.

Bei der Orientierung von biologen (nicht retardierten) Dienstzungenformen Valproat HEXAL chronic ist Valproat HEXAL chronic angezeigt von Valproinsäure zu achten.

Die Kleinkinder, bei Valproat HEXAL chronic nur in Ausnahmefällen Mittel erster Wahl. Wenn es eingesetzt wird, sollte Valproat HEXAL chronic nur unter besonderer Aufsicht eines Arztes verwendet werden. Valproat HEXAL chronic wendet und möglichst nicht zusammen mit anderen Arzneimitteln gegen Anfallsleiden verabreicht werden.

2 Was sollten Sie vor der Einnahme von Valproat HEXAL chronic beachten?

Valproat HEXAL chronic darf nicht eingenommen werden,
- wenn Sie eine Leberkrankheit oder eine Störung der Leberfunktion bei einer der in Abschnitt 4 genannten weiteren Arzneimitteln aufgetreten ist.
- wenn bei Ihnen oder jemandem aus Ihrer Familie Ihrer schwerwiegende Stoffwechselstörungen aufgetreten ist. Dies kann zu einer Leber- oder Hirnschwerwiegende Störung der Funktion von Leber oder Bauchspeicheldrüse bedeutet.
- wenn bei Geschwistern eine Störung der Leberfunktion aufgetreten ist.
- wenn Sie eine Porphyrie (Stoffwechselstörung) haben.
- wenn Sie eine Störung der Bildung von Blutzellen oder Störungen im Stoffwechsel des Blutbestandteile (hepatische Porphyrie) bestehen.
- wenn Sie unter Blutgerinnungsstörungen leiden.
- wenn Sie einen genetischen Defekt haben, der eine mitochondriale Erkrankung verursacht (z. B. Alpers-Huttenlocher-Syndrom).
- wenn bei Ihnen eine Störung des Harnstoffzyklus (bestimmte Stoffwechselstörungen) vorliegt.
- wenn bei Ihnen ein unbehandelter Carnitinmangel (eine sehr seltene Stoffwechselstörung) vorliegt.
- wenn Sie schwanger sind oder stillen. Valproat HEXAL chronic darf nicht zur Behandlung von Epilepsie anwenden, es sei denn, es stehen keine anderen wirksamen Behandlungen zur Verfügung.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Valproat HEXAL chronic einnehmen.

Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt
- Bei Symptomen für eine schwere und/oder Bauchspeicheldrüsenentzündung (siehe unter „Leber- und/oder Bauchspeicheldrüsenentzündung"). Das Risiko von einer Bauchspeicheldrüsenentzündung ist bei Personen, die noch Kinder unter 3 Jahren, Personen, die gleichzeitig andere Anfallsleiden haben, die eine Ursache für Anfälle haben, die Anfallsleiden aufweisen, hungern und anderen Formen der Epilepsie haben, eingenommen wird.
- Wenn Sie oder Ihre Kinder Probleme wie Gleichgewichts- und Koordinationsstörungen, Sehproblemen, Gedächtnisverlust oder Konzentrationsschwäche, Ihnen erholsteln, informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt. Dies kann auf einen erhöhten Ammoniakspiegel im Blut zurückzuführen sein.
- Bei einer Verschlimmerung Ihrer Krampfanfälle. Wie bei anderen Arzneimitteln gegen Anfallsleiden kann es bei einigen Patienten zu einer Zunahme mit Valproat HEXAL chronic und einer Abnahme der Häufigkeit oder Schwere von Krampfanfällen kommen. Beruhigtsicher Sie in diesem Fall umgehend Ihren Arzt.
- Eine gangne Anzahl von Patienten, die mit Antiepileptika wie Valproat HEXAL chronic behandelt wurden, haben Gedanken, Absichten oder Gefühl zu verletzen oder sich das Leben zu nehmen. Wenn Sie zu irgendetwas Geist, die Verletzung oder Selbstmord führen, sollten Sie sofort mit Ihrem Arzt in Verbindung.

Besonders Vorsicht bei Einnahme von Valproat HEXAL chronic ist erforderlich
- bei einer höheren Schildrüse des Knochenmarks
- bei systemischen Lupus erythematodes (eine Reaktion der körpereigenen Abwehr gegen eigenes Gewebe)
- bei Stoffwechselerkrankungen, insbesondere angeborenen Enzymmangelkrankheiten.

Unter der Behandlung mit Valproinsäure kann es zu einem Anstieg des Ammoniakspiegels (Hyperammonämie) kommt. Nach. Suchen Sie bei Anzeichen und Symptomen wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erbrechen, erniedrigtem Blutdruck oder bei Veränderung des Bewusstseins Ihren Arzt. Diese sind Zeichen für einen erhöhten Ammoniak und Valproinsäure bestehen, gegebenenfalls ist die Dosis zu reduzieren. Wenn Sie bei Ihnen oder Ihrem Kind Anzeichen für Leberschäden beobachten oder vermuten, sollte Sie sofort Ihren Arzt informieren. Ihr Arzt wird die Anwendung Valproinsäure prüfen und Ihnen die Valproinsäure-Therapie bestehen werden (siehe auch unter „Valproat HEXAL chronic darf nicht eingenommen werden").
Bei einer Stoffwechselerkrankung, die durch einen Mangel an dem Enzym Carnitin-Palmitoyl-Transferase (CPT II) bestehgt ist, ist unter der Behandlung mit Valproinsäure ein vermehrtes Auftreten von Fällen des Anfalles sowie schwerwiegenden Muskelbeschwerden (Rhabdomyolyse) erhöht.
Wenn Sie oder Ihr Kind Anzeichen für eine Leberschädigung, Ihrer Ärztin sind durch einen genetischen Defekt bei einer mitochondrialen Erkrankung gibt, da dadurch das Risiko einer Leberschädigung besteht.
Wenn Sie oder Ihr Kind Anzeichen für einen Mangel an Blutzellen oder Blutplättchen, oder Ihr Kind eine Nahrung beeinträchtigt ist, insbesondere bei Kindern unter 3 Jahren.
Wenn bei Ihnen ein Carnitinmangel besteht und Sie Carnitin einnehmen.
Wenn Sie Valproinsäure einnehmen, wenn Sie Kinder unter 3 Jahren, Personen, die gleichzeitig andere Anfallsleiden haben, die eine Ursache für Anfälle haben, die Anfallsleiden aufweisen, hungern und anderen Formen der Epilepsie eingenommen wird, Ihr Arzt wird Ihnen eine Zahnsalbe und Pflege von Verletzungen oder sportlichen Blutungen. Da einerseits Blutungen und andererseits Hämatome (Blutansammlungen) Anzeichen dafür bedeutet, dass Sie Valproat HEXAL chronic einnehmen, Ihr Arzt darüber informiert werden, dass Sie Valproat HEXAL chronic einnehmen, damit die Blutgerinnung überprüft werden kann.
Bei gleichzeitiger Einnahme von Valproinsäure und die Blutgerinnung beeinträchtigenden Arzneimitteln (z. B. Acetylsalicylsäure, Warfarin, Heparin, Clopidogrel, Ticlopidin, Dipyridamol, Tirofiban, Eptifibatid) Blutungen gewarnt werden.
Bei gleichzeitiger Einnahme von Acetylsalicylsäure („ASS"), die zu einer Erhöhung der Valproinsäurekonzentration (die Wirkustanz von Valproat HEXAL chronic) im Blut führen kann.
bei einer bestehenden HIV-Infektion, da Valproat HEXAL chronic eventuell die Viruslast erhöhen kann (HIV-Infektion).

Kinder und Jugendliche
Besonders Vorsicht bei der Einnahme von Valproat HEXAL chronic ist erforderlich bei
- Kleinkindern, die gleichzeitig andere Arzneimittel gegen Anfallsleiden einnehmen
- mehrfachbehinderten Kindern und Jugendlichen mit schweren Anfallsformen.

Die gleichzeitige Einnahme von Valproat HEXAL chronic und Acetylsalicylsäure sollte bei fieberhaften Erkrankungen bei Säuglingen und Kindern unterbleiben und bei Jugendlichen nur auf ausdrückliche ärztliche Anweisung erfolgen.

Warnhinweis
Leber- und/oder Bauchspeicheldrüsenentzündung
Gelegentlich wurden über schwere gesundheitliche Schädigungen der Leber sowie Schädigungen der Bauchspeicheldrüse besichtet worden. Patienten, insbesondere Kinder unter 3 Jahren und Kinder, deren Anfallsleiden bei besonders in den ersten 6 Monaten der Behandlung, ärztlich engmaschig überwacht werden.
Einer Leber- und/oder Bauchspeicheldrüsenschädigung können unspezifische Zeichen vorausgehen, z. B. Appetitverlust, Müdigkeit, z. B.
- erneutes Auftreten von Anfällen
- Gelbsucht (Gelbfärbung der Haut oder des Weißen im Auge)
- Fieber

Sind diese Beschwerden anhaltend oder schwerwiegend, muss ein Arzt bis nachträglich werden, um über die weitere Behandlung mit Valproat HEXAL chronic zu entscheiden.

Maßnahmen zur Frühdiagnose einer Leber- und/oder Bauchspeicheldrüsenentzündung
Vor Behandlungsbeginn soll durch Ihren Arzt eine ausführliche Befragung, sowie Ihre eigenen Angaben und gegebenenfalls Ihrer Familienmitglieder vorhandene frischen Stoffwechselstörungen, Erkrankung der Leber oder Bauchspeicheldrüse, Blutfall und Gerinnungsstörungen erfolgen.

Vor Wochen nach Behandlungsbeginn sollte eine erneute laborchemische Kontrolle durchgeführt werden.

Bei kinisch unauffälligen Patienten mit krankheit erhöhten 4-Wochen-Wert ten sollte eine Verlaufskontrolle dreimal im Abstand von maximal 2 Wochen, dann einmal jährlich bei Ihnen und Ihrem Pharmazeut durchgeführt werden.

Eltern/Bezugspersonen sollten bei klinischen Auffälligkeiten unabhängig von diesen Zeiten sofort den behandelnden Arzt informieren.

Bei **Jugendlichen** (etwa ab dem 15. Lebensjahr) und **Erwachsenen** sind im 1. Halbjahr monatliche Kontrollen des klinischen Befundes und der Laborwerte sowie im jeden Fall bei Auftreten von Beschwerden.

Nach 12-monatiger Therapie ohne Auffälligkeiten sind nur noch 2-3 ärztliche Kontrollen pro Jahr erforderlich.

Kinder
Zu Beginn der Behandlung kann eine Gewichtszunahme auftreten. Kontrolle sowie Behandlung Ihrer Kinder mit einer ausgewogenen Ernährung und ausreichender Ihrem Arzt gegeben Maßnahmen.

Valproat HEXAL chronic darf nicht angewendet werden zur Migränevorbeugung. Ihre (siehe auch Abschnitt „Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit").

Valproat HEXAL chronic kann Schlddrüsenhormone aus der Plasmaeiweißbindung verdrängen, sodass dann Ihre Schilddrüsenwerte trotzdem im normal Bereich sein. Ihr Arzt wird Ihnen eine Schilddrüsenuntersuchung entsehen kann.

Einnahme von Valproat HEXAL chronic zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder Ihnen verschrieben wurden.
Einnahme von Valproat HEXAL chronic zusammen mit anderen Arzneimitteln

Die Wirkung und Nebenwirkungen von Valproat HEXAL chronic können verstärkt werden durch
- Felbamat (Mittel gegen Anfallsleiden)
- Cimetidin (Mittel gegen Magengeschwüre)
- Erythromycin (Mittel gegen bakterielle Infektionen)
- Acetazolamid (Mittel gegen Glaukom und Epilepsie)

Die Wirkung von Valproat HEXAL chronic kann abgeschwächt durch
- Rifampicin (Mittel gegen Tuberkulose)
- Carbapenemen (Mittel gegen Infektionen mit bakteriellen Infektionen, wie z. B. Imipenem, Panipenem und Meropenem)

Die gleichzeitige Anwendung von Valproinsäure und Carbapenemen sollte bei vermeiden werden, weil dadurch die Wirksamkeit von Valproinsäure vermindert werden kann.
- Protease-Inhibitoren (Mittel zur Behandlung von HIV-Infektionen)
- Colestyramin (Mittel zur Senkung der Blutfette)
- Ostrogenhaltige Mittel (einschließlich bestimmter empfängnisverhütender Hormonpräparate)
- Metamizol (Mittel zur Behandlung von Schmerzen und Fieber)
- Mefloquin (Mittel zur Behandlung und zur Vorbeugung der Malaria)

Die Wirkung von Valproat HEXAL chronic kann verstärkt oder abgeschwächt werden durch
- eine gleichzeitige Gabe von Fluoxetin (Mittel gegen Depressionen). Die Konzentration der Valproinsäure (der Wirkstoff von Valproat HEXAL chronic) im Serum kann erhöht werden; es sind jedoch auch Fälle beschrieben, in denen sie erniedrigt wurde.

Valproat HEXAL chronic verstärkt die Wirkung und selbstes die Nebenwirkungen von
- Phenobarbital, Primidon, Phenytoin, Carbamazepin, Lamotrigin, Felbamat (Arzneimittel gegen Anfallsleiden)
- Neuroleptika (Arzneimittel gegen seelische Erkrankungen), Benzodiazepine, Mirtazapin, Mefloquin (Arzneimittel gegen Malaria), Antidepressiva (Arzneimittel gegen Depressionen), Lithium (Arzneimittel gegen manische und depressive Anfallsleiden), Antibiotika (Arzneimittel gegen Depressionen (z. b. Nortriptylin)
- Codein (Arzneimittel gegen Husten)
- Zidovudin (Arzneimittel zur Behandlung von HIV-Infektionen)
- Acenarsinthrin mit gerinnungshemmender Wirkung (z. B. Vitamin-K-Antagonisten oder Acetylsalicylsäure). Es kann zu einer erhöhten Blutungsneigung kommen.
- Rufinamid (Mittel gegen Anfallsleiden) (insbesondere bei Kindern ist Vorsicht geboten)
- Propofol (Mittel zur Narkose)
- Nimodipin (Mittel zur Behandlung von Hirnleistungsstörungen).

Bei Kindern kann der Serumspiegel von Phenytoin (anderes Arzneimittel gegen Anfallsleiden) bei gleichzeitiger Verabreichung von Valproinsäure Blutzuckerspiegel, angst- und spannungslösendes Arzneimittel sowie Arzneimittel gegen Anfallsleiden) erhöht werden.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit valproinsäurehaltigen Arzneimitteln und Clonazepam (Arzneimittel gegen Anfallsleiden) trat bei Patienten mit Anfällen in Form von kurzen Bewusstseinsverlust (Absence-Status) (Minderung der Aufmerksamkeit) in der Vorgeschichte ein Absence-Status (Ringer dauernder Dämmerzustand) auf.

Sonstige Wechselwirkungen
- Valproat HEXAL chronic hat keinen Effekt auf den Lithiumserumspiegel.
- Die Wirkung von empfängnisverhütenden Hormonpräparaten („Pille") wird nicht beeinflusst.
- Bei Diabetikern kann eine Untersuchung auf Keton-Körper im Urin falsch positive Ergebnisse bei der Anwendung von Valproinsäure. Ihr Arzt wird Ihnen darüber informieren.
- Andere Arzneimittel, die den Leberstoffwechsel beeinflussen, können die Rate der Valproinsäure-Elimination beeinflussen, wie beispielsweise Carbapenemen (Mittel zur Behandlung von Epilepsie und anderen Erkrankungen).
- Bei gleichzeitiger Gabe von Valproinsäure und Topiramat (Arzneimittel gegen Anfallsleiden) ist über Zeichen einer Hirnschädigung (Encephalopathie) sowie Hyperammonämie (Anzeichen einer Hirnschädigung) und Hyperammonämie bei Kindern.
- Wird Valproat HEXAL chronic zusammen mit Acetazolamid (Mittel zur Behandlung von grünem Star (Glaukom) angewendet, kann es zu einem Anstieg des Ammoniakspiegels im Blut mit dem Risiko einer Hirnschädigung (Encephalopathie) kommen.
- Bei gleichzeitiger Anwendung von Valproinsäure und Pharmabestät oder Felbamat (Arzneimittel gegen Anfallsleiden) kann es zu einem Anstieg der Felbamatspiegel im Blut kommen.
- Die gleichzeitige Anwendung von Valproinsäure und Quetiapin (ein Arzneimittel zur Behandlung von Depressionen) kann das Risiko einer Entzündung mindertem Anzahl an weißen Blutkörperchen (Leukopenie, Neutropenie) erhöhen.
- Valproat HEXAL chronic kann die Plasmakonzentration von Olanzapin (ein Arzneimittel zur Behandlung von Depressionen) verringern.
- Einige Arzneimittel zur Behandlung von Infektionen, die Proteine enthalten (z. B. Rifampicin, Carbapenemen, Cefamandol, Cefoperazon, Cefotetan, Ceftriaxon) können die Wirkung von Valproinsäure verringern.
- Bei einer Patientin mit schizoaffektiver Störung (seelische Störung) trat bei gleichzeitiger Gabe von Valproat HEXAL chronic, Risperidon (Arzneimittel gegen Anfallsleiden) und Risperidon (Neuroleptikum) eine Ketatonie (Zustand starren Verharrens, der Kataplexie) und Hyperthermie auf.

Ihr Arzt wird feststellen, ob gleichzeitig angewendete Arzneimittel abgesetzt werden sollen oder ob Ihre Dosis angepasst werden muss.

Einnahme von Valproat HEXAL chronic zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol
Nahrungsmittel beeinflussen die Wirkung von Valproat HEXAL chronic abgeschwächt oder verstärkt sowie die Nebenwirkungen können verstärken. Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, wenn Sie Fragen zur Ernährung haben.

Die Bioverfügbarkeit von Valproat HEXAL chronic wird durch die gleichzeitige Nahrungsaufnahme nicht entscheidend beeinflusst.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit
Schwangerschaft
Wichtige Hinweise für Frauen
- Wenn Sie schwanger sind, dürfen Sie Valproat HEXAL chronic nicht zur Behandlung von Epilepsie anwenden, es sei denn, es stehen keine anderen wirksamen Behandlungen zur Verfügung.
- Wenn Sie eine Frau im gebärfähigen Alter sind, sollten Sie Valproat HEXAL chronic nicht zur Behandlung von Epilepsie anwenden, es sei denn, es stehen keine anderen wirksamen Behandlungen zur Verfügung.
- Valproat HEXAL chronic darf nicht zur Vorbeugung von Migräne angewendet werden, es sei denn, es stehen keine anderen wirksamen Behandlungen zur Verfügung.
- Wenn Sie Valproat HEXAL chronic zur Behandlung von Epilepsie einnehmen, es sei denn, dass Ihr Arzt Ihnen dieses empfiehlt, sollten Sie Valproat HEXAL chronic eine wirksame Methode zur Schwangerschaftsverhütung anwenden. Ihr Arzt wird Sie über mögliche Risiken einer Behandlung mit Valproat HEXAL chronic von Ihrer Empfängnisverhütung beenden, bevor Sie dazu über mögliche Risiken informiert sind. Ihr Arzt wird Sie weiter beraten (siehe unter „Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit - Wichtige Hinweise für Frauen").

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Valproat HEXAL chronic einnehmen.

Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt
- Bei Symptomen für eine schwere und/oder Bauchspeicheldrüsenentzündung (siehe unter „Leber- und/oder Bauchspeicheldrüsenentzündung"). Das Risiko von einer Bauchspeicheldrüsenentzündung ist bei Personen, die noch Kinder unter 3 Jahren, Personen, die gleichzeitig andere Anfallsleiden haben, die eine Ursache für Anfälle haben, die Anfallsleiden aufweisen, hungern und anderen Formen der Epilepsie haben, eingenommen wird.
- Wenn Sie oder Ihre Kinder Probleme wie Gleichgewichts- und Koordinationsstörungen, Sehproblemen, Gedächtnisverlust oder Konzentrationsschwäche, Ihnen erholsteln, informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt. Dies kann auf einen erhöhten Ammoniakspiegel im Blut zurückzuführen sein.
- Bei einer Verschlimmerung Ihrer Krampfanfälle. Wie bei anderen Arzneimitteln gegen Anfallsleiden kann es bei einigen Patienten zu einer Zunahme mit Valproat HEXAL chronic und einer Abnahme der Häufigkeit oder Schwere von Krampfanfällen kommen. Beruhigtsicher Sie in diesem Fall umgehend Ihren Arzt.
- Eine gangne Anzahl von Patienten, die mit Antiepileptika wie Valproat HEXAL chronic behandelt wurden, haben Gedanken, Absichten oder Gefühl zu verletzen oder sich das Leben zu nehmen. Wenn Sie zu irgendetwas Geist, die Verletzung oder Selbstmord führen, sollten Sie sofort mit Ihrem Arzt in Verbindung.

Besonders Vorsicht bei Einnahme von Valproat HEXAL chronic ist erforderlich
- bei einer höheren Schildrüse des Knochenmarks
- bei systemischen Lupus erythematodes (eine Reaktion der körpereigenen Abwehr gegen eigenes Gewebe)
- bei Stoffwechselerkrankungen, insbesondere angeborenen Enzymmangelkrankheiten.

Unter der Behandlung mit Valproinsäure kann es zu einem Anstieg des Ammoniakspiegels (Hyperammonämie) kommt. Nach. Suchen Sie bei Anzeichen und Symptomen wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erbrechen, erniedrigtem Blutdruck oder bei Veränderung des Bewusstseins Ihren Arzt. Diese sind Zeichen für einen erhöhten Ammoniak und Valproinsäure bestehen, gegebenenfalls ist die Dosis zu reduzieren. Wenn Sie bei Ihnen oder Ihrem Kind Anzeichen für Leberschäden beobachten oder vermuten, sollte Sie sofort Ihren Arzt informieren. Ihr Arzt wird die Anwendung Valproinsäure prüfen und Ihnen die Valproinsäure-Therapie bestehen werden (siehe auch unter „Valproat HEXAL chronic darf nicht eingenommen werden").
Bei einer Stoffwechselerkrankung, die durch einen Mangel an dem Enzym Carnitin-Palmitoyl-Transferase (CPT II) bestehgt ist, ist unter der Behandlung mit Valproinsäure ein vermehrtes Auftreten von Fällen des Anfalles sowie schwerwiegenden Muskelbeschwerden (Rhabdomyolyse) erhöht.
Wenn Sie oder Ihr Kind Anzeichen für eine Leberschädigung, Ihrer Ärztin sind durch einen genetischen Defekt bei einer mitochondrialen Erkrankung gibt, da dadurch das Risiko einer Leberschädigung besteht.
Wenn Sie oder Ihr Kind Anzeichen für einen Mangel an Blutzellen oder Blutplättchen, oder Ihr Kind eine Nahrung beeinträchtigt ist, insbesondere bei Kindern unter 3 Jahren.
wenn bei Ihnen ein Carnitinmangel besteht und Sie Carnitin einnehmen.
Wenn Sie Valproinsäure einnehmen, wenn Sie Kinder unter 3 Jahren, Personen, die gleichzeitig andere Anfallsleiden haben, die eine Ursache für Anfälle haben, die Anfallsleiden aufweisen, hungern und anderen Formen der Epilepsie eingenommen wird, Ihr Arzt wird Ihnen eine Zahnsalbe und Pflege von Verletzungen oder sportlichen Blutungen. Da einerseits Blutungen und andererseits Hämatome (Blutansammlungen) Anzeichen dafür bedeutet, dass Sie Valproat HEXAL chronic einnehmen, Ihr Arzt darüber informiert werden, dass Sie Valproat HEXAL chronic einnehmen, damit die Blutgerinnung überprüft werden kann.
Bei gleichzeitiger Einnahme von Valproinsäure und die Blutgerinnung beeinträchtigenden Arzneimitteln (z. B. Acetylsalicylsäure, Warfarin, Heparin, Clopidogrel, Ticlopidin, Dipyridamol, Tirofiban, Eptifibatid) Blutungen gewarnt werden.
Bei gleichzeitiger Einnahme von Acetylsalicylsäure („ASS"), die zu einer Erhöhung der Valproinsäurekonzentration (die Wirkustanz von Valproat HEXAL chronic) im Blut führen kann.
bei einer bestehenden HIV-Infektion, da Valproat HEXAL chronic eventuell die Viruslast erhöhen kann (HIV-Infektion).

Kinder und Jugendliche
Besonders Vorsicht bei der Einnahme von Valproat HEXAL chronic ist erforderlich bei
- Kleinkindern, die gleichzeitig andere Arzneimittel gegen Anfallsleiden einnehmen
- mehrfachbehinderten Kindern und Jugendlichen mit schweren Anfallsformen.

Die gleichzeitige Einnahme von Valproat HEXAL chronic und Acetylsalicylsäure sollte bei fieberhaften Erkrankungen bei Säuglingen und Kindern unterbleiben und bei Jugendlichen nur auf ausdrückliche ärztliche Anweisung erfolgen.

Warnhinweis
Leber- und/oder Bauchspeicheldrüsenentzündung
Gelegentlich wurden über schwerwiegende gesundheitliche Schädigungen der Leber sowie Schädigungen der Bauchspeicheldrüse besichtet worden. Patienten, insbesondere Kinder unter 3 Jahren und Kinder, deren Anfallsleiden bei besonders in den ersten 6 Monaten der Behandlung, ärztlich engmaschig überwacht werden.
Einer Leber- und/oder Bauchspeicheldrüsenschädigung können unspezifische Zeichen vorausgehen, z. B. Appetitverlust, Müdigkeit, z. B.
- erneutes Auftreten von Anfällen
- Gelbsucht (Gelbfärbung der Haut oder des Weißen im Auge)
- Fieber

Sind diese Beschwerden anhaltend oder schwerwiegend, muss ein Arzt bis nachträglich werden, um über die weitere Behandlung mit Valproat HEXAL chronic zu entscheiden.

Maßnahmen zur Frühdiagnose einer Leber- und/oder Bauchspeicheldrüsenentzündung
Vor Behandlungsbeginn soll durch Ihren Arzt eine ausführliche Befragung, sowie Ihre eigenen Angaben und gegebenenfalls Ihrer Familienmitglieder vorhandene frischen Stoffwechselstörungen, Erkrankung der Leber oder Bauchspeicheldrüse, Blutfall und Gerinnungsstörungen erfolgen.

Vor Wochen nach Behandlungsbeginn sollte eine erneute laborchemische Kontrolle durchgeführt werden.

Bei kinisch unauffälligen Patienten mit krankheit erhöhten 4-Wochen-Wert ten sollte eine Verlaufskontrolle dreimal im Abstand von maximal 2 Wochen, dann einmal jährlich bei Ihnen und Ihrem Pharmazeut durchgeführt werden.

Eltern/Bezugspersonen sollten bei klinischen Auffälligkeiten unabhängig von diesen Zeiten sofort den behandelnden Arzt informieren.

Bei **Jugendlichen** (etwa ab dem 15. Lebensjahr) und **Erwachsenen** sind im 1. Halbjahr monatliche Kontrollen des klinischen Befundes und der Laborwerte sowie im jeden Fall bei Auftreten von Beschwerden.

Nach 12-monatiger Therapie ohne Auffälligkeiten sind nur noch 2-3 ärztliche Kontrollen pro Jahr erforderlich.

Kinder
Zu Beginn der Behandlung kann eine Gewichtszunahme auftreten. Kontrolle sowie Behandlung Ihrer Kinder mit einer ausgewogenen Ernährung und ausreichender Ihrem Arzt gegeben Maßnahmen.

Valproat HEXAL chronic darf nicht angewendet werden zur Migränevorbeugung. Ihre (siehe auch Abschnitt „Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit").

Valproat HEXAL chronic kann Schlddrüsenhormone aus der Plasmaeiweißbindung verdrängen, sodass dann Ihre Schilddrüsenwerte trotzdem im normal Bereich sein. Ihr Arzt wird Ihnen eine Schilddrüsenuntersuchung entsehen kann.

Einnahme von Valproat HEXAL chronic zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder Ihnen verschrieben wurden.
Einnahme von Valproat HEXAL chronic zusammen mit anderen Arzneimitteln

Die Wirkung und Nebenwirkungen von Valproat HEXAL chronic können verstärkt werden durch
- Felbamat (Mittel gegen Anfallsleiden)
- Cimetidin (Mittel gegen Magengeschwüre)
- Erythromycin (Mittel gegen bakterielle Infektionen)
- Acetazolamid (Mittel gegen Glaukom und Epilepsie)

Die Wirkung von Valproat HEXAL chronic kann abgeschwächt durch
- Rifampicin (Mittel gegen Tuberkulose)
- Carbapenemen (Mittel gegen Infektionen mit bakteriellen Infektionen, wie z. B. Imipenem, Panipenem und Meropenem)

Die gleichzeitige Anwendung von Valproinsäure und Carbapenemen sollte bei vermeiden werden, weil dadurch die Wirksamkeit von Valproinsäure vermindert werden kann.
- Protease-Inhibitoren (Mittel zur Behandlung von HIV-Infektionen)
- Colestyramin (Mittel zur Senkung der Blutfette)
- Ostrogenhaltige Mittel (einschließlich bestimmter empfängnisverhütender Hormonpräparate)
- Metamizol (Mittel zur Behandlung von Schmerzen und Fieber)
- Mefloquin (Mittel zur Behandlung und zur Vorbeugung der Malaria)

Die Wirkung von Valproat HEXAL chronic kann verstärkt oder abgeschwächt werden durch
- eine gleichzeitige Gabe von Fluoxetin (Mittel gegen Depressionen). Die Konzentration der Valproinsäure (der Wirkstoff von Valproat HEXAL chronic) im Serum kann erhöht werden; es sind jedoch auch Fälle beschrieben, in denen sie erniedrigt wurde.

Valproat HEXAL chronic verstärkt die Wirkung und selbstes die Nebenwirkungen von
- Phenobarbital, Primidon, Phenytoin, Carbamazepin, Lamotrigin, Felbamat (Arzneimittel gegen Anfallsleiden)
- Neuroleptika (Arzneimittel gegen seelische Erkrankungen), Benzodiazepine, Mirtazapin, Mefloquin (Arzneimittel gegen Malaria), Antidepressiva (Arzneimittel gegen Depressionen), Lithium (Arzneimittel gegen manische und depressive Anfallsleiden (gegen Depressionen) (z. b. Nortriptylin)
- Codein (Arzneimittel gegen Husten)
- Zidovudin (Arzneimittel zur Behandlung von HIV-Infektionen)
- Acenarsinthrin mit gerinnungshemmender Wirkung (z. B. Vitamin-K-Antagonisten oder Acetylsalicylsäure). Es kann zu einer erhöhten Blutungsneigung kommen.
- Rufinamid (Mittel gegen Anfallsleiden) (insbesondere bei Kindern ist Vorsicht geboten)
- Propofol (Mittel zur Narkose)
- Nimodipin (Mittel zur Behandlung von Hirnleistungsstörungen).

Bei Kindern kann der Serumspiegel von Phenytoin (anderes Arzneimittel gegen Anfallsleiden) bei gleichzeitiger Verabreichung von Valproinsäure Blutzuckerspiegel, angst- und spannungslösendes Arzneimittel sowie Arzneimittel gegen Anfallsleiden) erhöht werden.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit valproinsäurehaltigen Arzneimitteln und Clonazepam (Arzneimittel gegen Anfallsleiden) trat bei Patienten mit Anfällen in Form von kurzen Bewusstseinsverlust (Absence-Status) (Minderung der Aufmerksamkeit) in der Vorgeschichte ein Absence-Status (Ringer dauernder Dämmerzustand) auf.

Sonstige Wechselwirkungen
- Valproat HEXAL chronic hat keinen Effekt auf den Lithiumserumspiegel.
- Die Wirkung von empfängnisverhütenden Hormonpräparaten („Pille") wird nicht beeinflusst.
- Bei Diabetikern kann eine Untersuchung auf Keton-Körper im Urin falsch positive Ergebnisse bei der Anwendung von Valproinsäure. Ihr Arzt wird Ihnen darüber informieren.
- Andere Arzneimittel, die den Leberstoffwechsel beeinflussen, können die Rate der Valproinsäure-Elimination beeinflussen, wie beispielsweise Carbapenemen (Mittel zur Behandlung von Epilepsie und anderen Erkrankungen).
- Bei gleichzeitiger Gabe von Valproinsäure und Topiramat (Arzneimittel gegen Anfallsleiden) ist über Zeichen einer Hirnschädigung (Encephalopathie) sowie Hyperammonämie (Anzeichen einer Hirnschädigung) und Hyperammonämie bei Kindern.
- Wird Valproat HEXAL chronic zusammen mit Acetazolamid (Mittel zur Behandlung von grünem Star (Glaukom) angewendet, kann es zu einem Anstieg des Ammoniakspiegels im Blut mit dem Risiko einer Hirnschädigung (Encephalopathie) kommen.
- Bei gleichzeitiger Anwendung von Valproinsäure und Pharmabestät oder Felbamat (Arzneimittel gegen Anfallsleiden) kann es zu einem Anstieg der Felbamatspiegel im Blut kommen.
- Die gleichzeitige Anwendung von Valproinsäure und Quetiapin (ein Arzneimittel zur Behandlung von Depressionen) kann das Risiko einer Entzündung mindertem Anzahl an weißen Blutkörperchen (Leukopenie, Neutropenie) erhöhen.
- Valproat HEXAL chronic kann die Plas

- Ihr Arzt wird, lange bevor Sie schwanger werden, versuchen, Sie auf ein anderes Arzneimittel umzustellen, oder die Behandlung mit Valproat HEXAL chrono beenden.
- Sie müssen unverzüglich einen Termin mit Ihrem Arzt vereinbaren, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein.

ICH BIN SCHWANGER UND NEHME VALPROAT HEXAL CHRONO EIN
Sie dürfen die Einnahme von Valproat HEXAL chrono nur dann beenden, wenn Ihr Arzt Sie dazu auffordert, da sich ansonsten Ihr Zustand verschlechtern kann. Sie müssen unverzüglich einen Termin mit Ihrem Arzt vereinbaren, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein. Ihr Arzt wird Sie weiter beraten.

Bei Babys von Müttern, die mit Valproat behandelt wurden, besteht ein schwerwiegendes Risiko für Geburtsfehler und Entwicklungsprobleme, die zu schwerwiegenden Behinderungen führen können.

Sie werden an einen Spezialisten überwiesen, der auf die Behandlung von Epilepsie spezialisiert ist, damit dieser alternative Behandlungsoptionen prüfen kann.

Für den Ausnahmefall, dass Valproat HEXAL chrono während der Schwangerschaft die einzig geeignete Behandlungsoption darstellt, werden sowohl die Behandlung Ihrer Grunderkrankung als auch die Entwicklung Ihres ungeborenen Kindes sehr engmaschig überwacht. Sie und Ihr Partner können hinsichtlich einer Schwangerschaft unter Valproat beraten und unterstützt werden.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die Einnahme von Folsäure. Folsäure kann das allgemeine Risiko für *Spina bifida* und eine frühe Fehlgeburt verringern, das bei allen Schwangerschaften besteht. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie das Risiko für Geburtsfehler senkt, das mit der Einnahme von Valproat verbunden ist.

Kernbotschaften
- Sie müssen unverzüglich einen Termin mit Ihrem Arzt vereinbaren, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein.
- Sie dürfen die Einnahme von Valproat HEXAL chrono nur dann beenden, wenn Ihr Arzt Sie dazu auffordert.
- Kümmern Sie sich darum, dass Sie an einen Spezialisten überwiesen werden, der auf die Behandlung von Epilepsie spezialisiert ist, damit dieser die Notwendigkeit alternativer Behandlungsoptionen prüfen kann.
- Sie müssen über die Risiken von Valproat HEXAL chrono während der Schwangerschaft ausführlich aufgeklärt werden, einschließlich der Teratogenität (Geburtsfehler) und körperlicher und geistiger Entwicklungsstörungen bei Kindern.
- Kümmern Sie sich darum, dass Sie zur pränatalen Überwachung an einen Spezialisten überwiesen werden, damit möglicherweise auftretende Fehlbildungen erkannt werden können.

Lesen Sie sich bitte unbedingt den Leitfaden für Patienten durch, den Sie von Ihrem Arzt erhalten werden. Ihr Arzt wird mit Ihnen das jährlich auszufüllende Formular zur Bestätigung der Risikoaufklärung besprechen und Sie bitten, es zu unterschreiben, und es dann behalten. Von Ihrem Apotheker werden Sie zudem eine Patientenkarte erhalten, die Sie an die Risiken bei Anwendung von Valproat während der Schwangerschaft erinnern soll.

Stillzeit
Valproinsäure tritt in geringen Mengen in die Muttermilch über. Wenn Sie stillen, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt um Rat.

Fortpflanzungsfähigkeit
Dieses Arzneimittel kann Ihre Zeugungsfähigkeit beeinträchtigen. Fallberichte zeigten, dass sich diese Effekte nach dem Absetzen des Wirkstoffs gewöhnlich zurückbilden bzw. nach einer Reduzierung der Dosis zurückbilden können. Brechen Sie Ihre Behandlung nicht ab, ohne vorher mit Ihrem Arzt darüber gesprochen zu haben.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Sie dürfen sich nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt an das Steuer eines Fahrzeugs setzen oder Maschinen bedienen.

Zu Beginn einer Behandlung mit Valproat HEXAL chrono und bei höherer Dosierung oder gleichzeitiger Einnahme anderer, ebenfalls am Zentralnervensystem angreifender Arzneimittel, können zentralnervöse Wirkungen, wie z. B. Schläfrigkeit oder Verwirrtheit, das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass - unabhängig von der Auswirkung des zu behandelnden Grundleidens - die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von elektrischen Werkzeugen und Maschinen vermindert wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.

Valproat HEXAL chrono enthält Natrium
Dieses Arzneimittel enthält 28 mg Natrium (Hauptbestandteil von Kochsalz/Speisesalz) pro Retardtablette. Dies entspricht 1,4 % der für einen Erwachsenen empfohlenen maximalen täglichen Natriumaufnahme mit der Nahrung.

3 Wie ist Valproat HEXAL chrono einzunehmen?

Die Behandlung mit Valproat HEXAL chrono muss von einem Arzt eingeleitet und überwacht werden, der auf die Behandlung von Epilepsie spezialisiert ist.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt dürfen Sie keine Behandlungs- oder Dosisänderungen vornehmen, um den Behandlungserfolg nicht zu gefährden.

Die Dosierung wird individuell von Ihrem behandelnden Facharzt bestimmt und kontrolliert, wobei Anfallsfreiheit bei möglichst niedriger Dosierung, besonders auch in der Schwangerschaft, angestrebt werden sollte.

Dosierung
Es empfiehlt sich ein stufenweiser (einschleichender) Aufbau der Dosierung bis zur optimal wirksamen Dosis.

Valproat HEXAL chrono Retardtabletten sind teilbar, wodurch eine individuelle Dosierung ermöglicht wird.

Bei alleiniger Gabe (Monotherapie) von Valproinsäure beträgt die Anfangsdosis in der Regel 5-10 mg Valproinsäure/kg Körpergewicht. Die Tagesdosis wird danach schrittweise alle 4-7 Tage um etwa 5 mg Valproinsäure/kg Körpergewicht erhöht, bis die anfallskontrollierende Dosierung erreicht ist.

Die volle Wirkung ist in einigen Fällen erst nach 4-6 Wochen zu beobachten. Die Tagesdosen sollten deshalb nicht zu früh über mittlere Werte hinaus gesteigert werden.

Die mittlere Tagesdosis beträgt während der Langzeitbehandlung im Allgemeinen:
- 30 mg **Valproinsäure**/kg Körpergewicht/Tag für Kinder
- 25 mg **Valproinsäure**/kg Körpergewicht/Tag für Jugendliche
- 20 mg **Valproinsäure**/kg Körpergewicht/Tag für Erwachsene und ältere Patienten

Entsprechend werden folgende orientierende Tagesdosen empfohlen (siehe Dosierungstabelle):

Dosierungstabelle

Lebensalter	Körpergewicht (kg)	durchschnittliche Dosis (mg/Tag)*	Anzahl Valproat HEXAL chrono 300 mg Retardtabletten
Erwachsene	ab ca. 60	1.200-2.100	4-7
Jugendliche ab 14 Jahre	ca. 40-60	1.000-1.500	3½-5
Kinder**			
3-6 Monate	ca. 5,5-7,5	150	siehe Hinweise**
6-12 Monate	ca. 7,5-10	150-300	siehe Hinweise**
1-3 Jahre	ca. 10-15	300-450	siehe Hinweise**
3-6 Jahre	ca. 15-25	450-750	1½-2½
7-14 Jahre	ca. 25-40	750-1.200	2½-4

* Angaben bezogen auf mg Natriumvalproat
** Hinweise
Für Kinder bis zu 3 Jahren sollten vorzugsweise die zur Verfügung stehenden Darreichungsformen mit niedrigerem Wirkstoffgehalt verwendet werden.
Für Kinder bis zu 6 Jahren eignen sich besonders die zur Verfügung stehenden Darreichungsformen mit niedrigerem Wirkstoffgehalt.

Besondere Patientengruppen
Wenn Sie an einer eingeschränkten Nierenfunktion oder einem Eiweißmangel im Blut leiden, kann der Blutspiegel der Wirksubstanz (Valproinsäure) von Valproat HEXAL chrono erhöht sein. Ihr Arzt muss die Tagesdosis, die Sie erhalten, nötigenfalls durch eine niedrigere Dosierung anpassen.

Wenn Sie eine Hämodialyse erhalten, entscheidet Ihr Arzt möglicherweise, Ihre Dosierung anzupassen.

Hinweise zur Umstellung einer Behandlung
Falls Sie von einem anderen Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff oder von einem Arzneimittel mit einem anderen Wirkstoff gegen Anfallsleiden auf eine Behandlung mit Valproat HEXAL chrono umgestellt werden sollen, erfolgt diese Umstellung nach Anweisungen Ihres behandelnden Arztes.

Bei den meisten Patienten, die mit nicht retardierten Darreichungsformen vorbehandelt wurden, kann die Umstellung auf die retardierte Darreichungsform sofort oder innerhalb weniger Tage erfolgen. Dabei sollte die vorher verabreichte Dosis in gleicher Höhe weiter eingenommen werden. Eine Dosisreduzierung nach Anfallsabnahme ist möglich.

Wird Valproat HEXAL chrono zusammen mit anderen Antiepileptika eingenommen oder soll es eine frühere Medikation ersetzen, muss die Dosis der bis dahin eingenommenen Antiepileptika, besonders des Phenobarbitals, unverzüglich vermindert werden. Falls die vorausgegangene Medikation abgesetzt wird, hat dies ausschleichend zu erfolgen.

Andere Arzneimittel gegen Anfallsleiden beschleunigen den Abbau von Valproinsäure. Werden diese Arzneimittel abgesetzt, steigt die Valproinsäure-Konzentration im Blut langsam an, sodass die Valproinsäure-Konzentration im Serum über einen Zeitraum von 4-6 Wochen nach Absetzen der Begleitmedikation kontrolliert werden muss. Die Tagesdosis von Valproat HEXAL chrono ist gegebenenfalls zu vermindern.

Die Serumkonzentration (bestimmt vor der ersten Tagesdosis) sollte 100 mg/l nicht überschreiten. Der Behandlungserfolg steht in keiner direkten Beziehung zur täglichen Dosis oder der Wirkstoffkonzentration im Serum. Darum sollte die Dosierung im Wesentlichen nach Anfallskontrolle erfolgen.

Die Tagesdosis von Valproat HEXAL chrono kann auf 1-2 Einzelgaben verteilt werden.

Zur stufenweisen Steigerung der Dosis und für eine präzise Einstellung der Erhaltungsdosis stehen verschiedene Dosisstärken und Darreichungsformen zur Verfügung.

Art der Anwendung
Die Retardtabletten sollten möglichst 1 Stunde vor den Mahlzeiten (morgens nüchtern) unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit (z. B. einem Glas Wasser) eingenommen werden. Es wird empfohlen, keine kohlensäurehaltigen Getränke wie Mineralwasser oder Ähnliches zum Einnehmen der Retardtabletten zu verwenden.

Dauer der Anwendung
Die Behandlung von Anfallsleiden ist grundsätzlich eine Langzeitbehandlung.

Über die Einstellung, Behandlungsdauer, Dosierung und das Absetzen von Valproat HEXAL chrono sollte im Einzelfall ein Facharzt (Neurologe, Neuropädiater) in Abhängigkeit vom individuellen Krankheitsverlauf entscheiden.

Im Allgemeinen ist ein Herabsetzen der Dosis oder ein Absetzen des Arzneimittels frühestens nach 2-3-jähriger Anfallsfreiheit zu erwägen.

Das Herabsetzen bzw. Absetzen des Arzneimittels muss in schrittweiser Verringerung der täglichen Einnahmemenge über 1-2 Jahre erfolgen.

Kinder können der Dosis pro kg Körpergewicht, anstelle altersgemäßer Dosisanpassung, entwachsen, wobei sich der EEG-Befund nicht verschlechtern sollte.

Die Erfahrungen mit Valproat HEXAL chrono in der Langzeitanwendung sind, insbesondere bei Kindern unter 6 Jahren, begrenzt.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Valproat HEXAL chrono zu stark oder zu schwach ist, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt darüber.

Gelegentlich können die Bestandteile der Retardtabletten als weißer Rückstand sichtbar im Stuhl wiedererscheinen. Dies bedeutet aber keine Beeinträchtigung der Wirkung des Arzneimittels, da der Wirkstoff im Laufe der Darmpassage aus dem Tablettengerüst (Matrix) vollständig herausgelöst wird.

Wenn Sie eine größere Menge von Valproat HEXAL chrono eingenommen haben als Sie sollten
Wenn Sie zu viel von Valproat HEXAL chrono eingenommen haben, benachrichtigen Sie umgehend Ihren Arzt, damit er nötigenfalls erforderliche Maßnahmen einleiten kann. Die unter den „Nebenwirkungen" genannten unerwünschten Erscheinungen können im verstärkten Maße auftreten, so z. B. eine erhöhte Anfallsneigung sowie Verhaltensstörungen sowohl bei Erwachsenen wie bei Kindern. Nach massiver Überdosierung sind vereinzelt Todesfälle aufgetreten.

Symptome einer Überdosierung können sein:
Verwirrtheit, Schläfrigkeit, Koma mit verminderter Muskelspannung, verminderte Reflexe, Pupillenverengung sowie eingeschränkte Atem- oder Herzfunktion.

Darüber hinaus riefen hohe Dosen bei Erwachsenen wie bei Kindern neurologische Störungen wie erhöhte Anfallsneigung oder Verhaltensänderungen hervor.

Wenn Sie die Einnahme von Valproat HEXAL chrono vergessen haben
Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Bitte nehmen Sie dann Ihr Arzneimittel weiter so ein, wie es verordnet ist.

Wenn Sie die Einnahme von Valproat HEXAL chrono abbrechen
Sie dürfen auf keinen Fall die Behandlung mit Valproat HEXAL chrono eigenmächtig verändern, unterbrechen oder vorzeitig beenden.
Bitte sprechen Sie vorher mit Ihrem behandelnden Arzt, wenn Unverträglichkeiten oder eine Änderung in Ihrem Krankheitsbild eintreten. Sie können sonst den Behandlungserfolg gefährden und erneut epileptische Anfälle auslösen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen
Häufig:	kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen
Gelegentlich:	kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
Selten:	kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen
Sehr selten:	kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der folgenden Nebenwirkungen schwerwiegend wird oder länger als einige Tage anhält; Sie benötigen möglicherweise eine medizinische Behandlung.

Gutartige, bösartige und unspezifische Neubildungen (einschließlich Zysten und Polypen)
Selten: Fehlbildung der Vorläuferzellen für Blutzellen im Rückenmark (myelodysplastisches Syndrom), zeigt sich im Blutbild.

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems
Häufig: verminderte Zahl der roten Blutkörperchen (Anämie), der Blutplättchen (Thrombozytopenie) oder stark verminderte Zahl der weißen Blutkörperchen (Leukopenie), Blutbildveränderungen aufgrund einer vorübergehenden Unterdrückung des Knochenmarks
Gelegentlich: stark verminderte Zahl aller Blutzellen (Panzytopenien), Blutungen
Selten: Verringerung der Vorstufe eines Gerinnungsfaktors im Blut (Fibrinogenmangel); Beeinträchtigung der Knochenmarkfunktion mit herabgesetzter Zahl der weißen Blutzellen (Lymphopenien, Neutropenien), mit starker Verminderung bestimmter weißer Blutkörperchen (Agranulozytose), mit fehlender Bildung (Aplasie) der roten Blutkörperchen oder mit der Bildung vergrößerter roter Blutkörperchen in normaler (Makrozytose) oder verminderter Zahl (makrozytäre Anämie). Dies zeigt sich im Blutbild und äußert sich manchmal durch Anzeichen wie Fieber und Atembeschwerden.
Sehr selten: zu viele weiße Blutzellen im Blut (Lymphozytose)

Endokrine Erkrankungen
Gelegentlich: erhöhte Spiegel des antidiuretischen Hormons (Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion, SIADH), vermehrte Behaarung bei Frauen, Vermännlichung, Akne, Haarausfall mit dem bei Männern typischen Erscheinungsbild und/oder erhöhte Androgenspiegel
Selten: Unterfunktion der Schilddrüse, die zu Müdigkeit oder Gewichtszunahme führen kann.

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Sehr häufig: allein auftretender und mäßig ausgeprägter Anstieg des Ammoniakspiegels im Blut (Hyperammonämie) ohne Veränderung der Leberfunktionswerte, jedoch vereinzelt mit Symptomen des Zentralnervensystems, wie z. B. Gleichgewichts- und Koordinationsstörungen, Abgeschlagenheit oder verminderte Aufmerksamkeit, in Verbindung mit Erbrechen. Informieren Sie bei diesen Symptomen unverzüglich Ihren Arzt. Möglicherweise benötigen Sie dringend ärztliche Betreuung (siehe auch Abschnitt 2 „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen").
Häufig: Gewichtszunahme (ein Gefährdungsgrund für das Auftreten von zystischen Veränderungen der Eierstöcke) oder Gewichtsabnahme, erhöhter Appetit oder auch Appetitlosigkeit; erniedrigte Natriumkonzentration im Blut (Hyponatriämie), die zu Verwirrtheit führen kann.
Selten: Fettleibigkeit, Störungen im Stoffwechsel des roten Blutfarbstoffes (Porphyrie)
Nicht bekannt: erniedrigte Carnitinspiegel (in Untersuchungen des Blutes oder der Muskeln)

Psychiatrische Erkrankungen
Häufig: Verwirrtheitszustände, Halluzinationen (Sehen, Fühlen oder Hören von Dingen, die nicht vorhanden sind), Aggression*, Unruhe*, Aufmerksamkeitsstörungen*
Gelegentlich: Reizbarkeit, Überaktivität
Selten: abnormales Verhalten*, Lernschwäche*, geistige und körperliche (psychomotorische) Überaktivität*
*Diese Nebenwirkungen wurden hauptsächlich bei Kindern beobachtet.

Erkrankungen des Nervensystems
Sehr häufig: Zittern (Tremor)
Häufig: extrapyramidale Störungen (Bewegungsstörungen, die die Steuerung der Muskeltätigkeit durch das Gehirn betreffen, wie z. B. unkontrollierte Muskelkontraktionen; z. T. bleibende Störungen), Zustand der Erstarrung (Stupor)*, Schläfrigkeit, Krämpfe (Konvulsionen)*, eingeschränktes Erinnerungsvermögen, Kopfschmerzen, Augenzittern (Nystagmus), Schwindelgefühl und Kribbeln/Missempfinden (Parästhesien)
Gelegentlich: Koma*, Hirnschädigung* (Enzephalopathie), Teilnahmslosigkeit* (Lethargie), Parkinson-Syndrom, das sich nach Absetzen von Valproinsäure zurückbildet, erhöhte Muskelspannung (Spastizität), gestörte Bewegungskoordination (Ataxie), wie z. B. Gangunsicherheit, Verschlimmerung von Krampfanfällen (siehe Abschnitt 2 „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen").
Kurz nach Anwendung von valproinsäurehaltigen Arzneimitteln wurden Zeichen einer Hirnschädigung (Enzephalopathie) beschrieben, die sich nach Absetzen des Arzneimittels zurückbildeten. In einigen Fällen waren diese mit erhöhten Ammoniakspiegeln sowie bei Kombinationstherapie mit Phenobarbital mit einem Anstieg des Phenobarbitalspiegels verbunden.
Selten: Doppeltsehen, ausgeprägte Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit (Demenz), die sich nach Absetzen der Behandlung zurückbildet, teilweise mit Schwund von Hirngewebe; leichte Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit (kognitive Störung)
Selten wurde über Erkrankungen des Gehirns (chronische Enzephalopathien) mit Störungen der Gehirnfunktion sowie Störungen der geistigen Leistungsfähigkeit, vor allem bei höherer Dosierung oder gleichzeitiger Einnahme von anderen Mitteln gegen Anfallsleiden, berichtet.
Nicht bekannt: Benommenheit

*Es wurden Fälle beschrieben, in denen ein Zustand der Erstarrung (Stupor) und Teilnahmslosigkeit bis hin zu flüchtigen, komatösen Bewusstseinsstörungen oder Hirnschädigungen (Enzephalopathie) auftraten, teils zusammen mit einer erhöhten Anfallshäufigkeit und insbesondere bei gleichzeitiger Gabe von Phenobarbital oder Topiramat oder einer raschen Erhöhung der Dosierung. Nach Verringerung der Dosierung oder nach Absetzen des Arzneimittels bildeten sich diese Symptome zurück.

Bei einer **Langzeitbehandlung** mit Valproat HEXAL chrono, insbesondere bei einer gleichzeitigen Einnahme von Phenytoin (anderes Arzneimittel gegen Epilepsie), kann es zu Zeichen einer Hirnschädigung (Enzephalopathie) kommen: vermehrte Krampfanfälle, Antriebslosigkeit, Erstarrung (Stupor), herabgesetzte Muskelspannung (muskuläre Hypotonie), Bewegungsstörungen und schwere Allgemeinveränderungen in den Aufzeichnungen der Hirnströme (EEG).

Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths
Häufig: Gehörverlust (z. T. bleibend)
Sehr selten: Tinnitus (Ohrgeräusche)

Gefäßerkrankungen
Häufig: spontane Blutergüsse oder Blutungen (siehe auch Abschnitt 2 „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen" und „Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit")
Gelegentlich: Blutgefäßentzündung (Vaskulitis)

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums
Gelegentlich: Atembeschwerden und Schmerzen aufgrund einer Entzündung des Brustfells bzw. Ansammlung von Flüssigkeit zwischen Lunge und Brustkorb (Pleuraerguss)

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts (Magen-Darm-Trakt)
Sehr häufig: Übelkeit
Häufig: Erbrechen, Zahnfleischerkrankung (hauptsächlich Zahnfleischwucherung), Entzündung der Mundschleimhaut (wunde Stellen, Schwellungen, Geschwüre und brennendes Gefühl im Mund), Durchfall, besonders zu Beginn der Behandlung, sowie Oberbauchbeschwerden, die sich gewöhnlich ohne Absetzen nach wenigen Tagen zurückbilden
Gelegentlich: Schädigung der Bauchspeicheldrüse, teilweise mit tödlichem Verlauf (siehe auch „Leber- und/oder Bauchspeicheldrüsenschädigung" unter Abschnitt 2 „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen"), vermehrter Speichelfluss (besonders zu Beginn der Behandlung)
Nicht bekannt: gastrointestinale Beschwerden (diese sind normalerweise vorübergehend und treten zu Beginn der Behandlung auf), Verstopfung

Leber- und Gallenerkrankungen
Häufig: dosisunabhängig auftretende, schwerwiegende (bis tödlich verlaufende) Leberschädigungen. Bei Kindern, besonders bei gleichzeitiger Einnahme von anderen Arzneimitteln gegen Anfälle, ist das Risiko einer Leberschädigung deutlich erhöht (siehe auch „Leber- und/oder Bauchspeicheldrüsenschädigung" unter Abschnitt 2 „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen").

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes
Häufig: Überempfindlichkeit, vorübergehender und/oder dosisabhängiger Haarausfall, Nagel- und Nagelbetterkrankungen, Dünnerwerden des Haares
Gelegentlich: Schwellung (Angioödem) mit schmerzhaften, juckenden Quaddeln, meistens im Bereich der Augen, Lippen, des Rachens und des Kehlkopfes und manchmal an Händen, Füßen und im Genitalbereich, Hautausschlag, Veränderungen der Haare (wie z. B. veränderte Haarstruktur, Wechsel der Haarfarbe, abnormes Haarwachstum)
Selten: schwere Reaktionen der Haut: Blasenbildung, Hautablösung oder Blutungen der Haut (einschließlich Lippen, Augen, Mund, Nase, Genitalien, Hände oder Füße) mit oder ohne Ausschlag, manchmal mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Schüttelfrost oder Muskelschmerzen (Stevens-Johnson-Syndrom oder toxische epidermale Nekrolyse bzw. Lyell-Syndrom); Hautausschlag (insbesondere an den Handflächen und Fußsohlen) oder Hautläsionen mit einem rosa/roten Ring und einer blassen Mitte, die jucken, schuppen oder mit Flüssigkeit gefüllt sein können (Erythema multiforme); Syndrom mit durch Medikamente ausgelöstem Hautausschlag, Fieber und Lymphknotenschwellung sowie mit einem Anstieg bestimmter weißer Blutkörperchen (Eosinophilie) und möglicher Beeinträchtigung anderer Organe (DRESS), Hautreaktionen wie z. B. Hautausschlag (exanthematöser Hautausschlag).

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen
Es wurden Fälle von Verringerungen der Knochendichte (Osteopenie und Osteoporose) bis hin zu Knochenbrüchen berichtet. Bitte beraten Sie sich mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie Antiepileptika über eine lange Zeit anwenden, wenn bei Ihnen eine Osteoporose festgestellt wurde oder wenn Sie gleichzeitig Kortison oder andere Steroidhormone einnehmen.
Selten: Reaktionen der körpereigenen Abwehr gegen eigenes Bindegewebe mit Anzeichen wie Gelenkschmerzen, Fieber, Erschöpfung und Hautausschlag (systemischer Lupus erythematodes, siehe auch Abschnitt 2 „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen"), schwerwiegender Muskelabbau, einhergehend mit Muskelschwäche und Muskelschmerzen (Rhabdomyolyse)

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Häufig: Harninkontinenz (ungewolltes Wasserlassen)
Gelegentlich: Nierenversagen, Anzeichen kann eine verminderte Harnmenge sein. Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, wenn diese schwerwiegende Nebenwirkung auftritt. Möglicherweise benötigen Sie dringend ärztliche Betreuung.
Selten: Einnässen oder verstärkter Harndrang, entzündliche Nierenerkrankung (tubulointerstitielle Nephritis), Ausscheidung großer Mengen an Urin und Durstgefühl (Fanconi-Syndrom)

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse
Häufig: schmerzhafte Regelblutung (Dysmenorrhö), unregelmäßige Regelblutung
Gelegentlich: Ausbleiben der Regelblutung (Amenorrhö)
Selten: Unfruchtbarkeit bei Männern, die sich gewöhnlich nach Absetzen der Behandlung zurückbildet bzw. sich nach einer Reduzierung der Dosis zurückbilden kann. Brechen Sie Ihre Behandlung nicht ab, ohne vorher mit Ihrem Arzt darüber gesprochen zu haben.
Erhöhte Mengen des Geschlechtshormons Testosteron im Blut und zystische Veränderungen der Eierstöcke (polyzystische Ovarien)
Sehr selten: Brustbildung bei Männern (Gynäkomastie)

Kongenitale (angeborene), familiäre und genetische Störungen
(siehe Abschnitt „Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit")

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort
Gelegentlich: verminderte Körpertemperatur (Hypothermie), Wassereinlagerungen in den Armen und/oder Beinen (periphere Ödeme)

Untersuchungen
Selten: Blutgerinnungsstörungen, erkennbar an veränderten Laborwerten in Bezug auf die Blutgerinnung (siehe auch Abschnitt 2 „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen" und „Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit"), verminderte Vitamin-B_7-Spiegel im Körper (Biotin-Mangel)

Sonstiges
Beim Auftreten **nicht dosisabhängiger** Nebenwirkungen sowie möglicher Zeichen einer Leber- oder Bauchspeicheldrüsenschädigung (siehe auch „Leber- und/oder Bauchspeicheldrüsenschädigung" unter Abschnitt 2 „Was sollten Sie vor der Einnahme von Valproat HEXAL chrono beachten?") benachrichtigen Sie bitte sofort Ihren Arzt, der über die Fortführung der Behandlung mit Valproat HEXAL chrono entscheiden wird.

Zusätzliche Nebenwirkungen bei Kindern
Einige Nebenwirkungen von Valproat treten bei Kindern häufiger auf oder sind schwerwiegender als bei Erwachsenen. Dies beinhaltet Leberschäden, Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis), Aggression, Unruhe, Aufmerksamkeitsstörungen, abnormales Verhalten, geistige und körperliche (psychomotorische) Überaktivität und Lernschwäche.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5 Wie ist Valproat HEXAL chrono aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „verwendbar bis" oder „verw. bis" angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6 Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Valproat HEXAL chrono enthält
Die Wirkstoffe sind Natriumvalproat und Valproinsäure.

1 Retardtablette enthält 200 mg Natriumvalproat und 87 mg Valproinsäure, entsprechend insgesamt 300 mg Natriumvalproat.

Die sonstigen Bestandteile sind: Acesulfam-Kalium, basisches Butylmethacrylat-Copolymer (Ph.Eur.), Dibutyldecandioat, Hypromellose, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich], Natriumdodecylsulfat, Siliciumdioxid-Hydrat, Titandioxid (E 171).

Wie Valproat HEXAL chrono aussieht und Inhalt der Packung
Valproat HEXAL chrono sind weiße, oblonge Retardtabletten mit beidseitiger Bruchkerbe.

Valproat HEXAL chrono ist in Packungen mit 50, 100 und 200 Retardtabletten erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer
Hexal AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: service@hexal.com

Hersteller
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2023.

Weitere Informationen zur sicheren Anwendung von Valproat HEXAL chrono finden Sie im Bereich „Produkte/Produktinfos" auf unserer Homepage.

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und Hexal wünschen gute Besserung!