

Gebrauchsanweisung

OCUsalin® day

Sterile, hypertone Augentropfen

10 ml Flasche

Ohne Konservierungsstoffe

OCUsalin® day ist ein Medizinprodukt zur vorübergehenden Linderung der Symptome eines Hornhautödems.

ZUSAMMENSETZUNG

1 ml enthält: Natriumhyaluronat 0,4 %, Borsäure, Kolliphor P 407, Trometamol, Sorbitol, Wasser.

WAS IST OCUsalin® day?

Eine Flasche **OCUsalin® day** enthält 10 ml sterile, hypertone Augentropfen ohne Konservierungsstoffe.

Die innovative Rezeptur verleiht **OCUsalin® day** mukoadhäsive Eigenschaften, die ein besseres Anhaften an der Augenoberfläche ermöglichen und so die Befeuchtung und den Schutz des Auges gewährleisten.

WANN IST OCUsalin® day ANZUWENDEN?

OCUsalin® day sind sterile, hypertone Augentropfen ohne Konservierungsstoffe, die zur vorübergehenden Linderung der Symptome eines Hornhautödems, zum Beispiel Veränderung des Sehvermögens und Schmerzen, angezeigt sind.

Die Osmolarität von **OCUsalin® day** ist höher als die der Tränenflüssigkeit. Dieser Konzentrationsunterschied ist für die ödematöse Flüssigkeitsresorption notwendig. Die Anwendung von **OCUsalin® day** erhöht die Osmolarität der Hornhautoberfläche, was zur Folge hat, dass Wasser aus den Hornhautschichten an die Oberfläche geleitet wird.

Das Natriumhyaluronat in **OCUsalin® day** bildet einen schützenden, befeuchtenden Film am Auge. Natriumhyaluronat macht die Anwendung von **OCUsalin® day** angenehmer, dank seiner mechanisch schützenden und die Gleitfähigkeit fördernden Eigenschaften, die dem typischen Brennen und der Irritation hypertoner Lösungen entgegenwirken.

WIE IST OCUsalin® day ANZUWENDEN?

- Waschen Sie sich die Hände gründlich, bevor Sie **OCUsalin® day** anwenden.
- Neigen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten und ziehen Sie das Unterlid Ihres Auges nach unten, um eine kleine Tasche zu bilden.
- Halten Sie die Flasche senkrecht über Ihrem Auge und schauen Sie in Richtung der blauen Spitze der Flasche.
- Drücken Sie die Flasche sanft, um einen Tropfen in Ihr Auge zu träufeln. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Auge.
- Stellen Sie sicher, dass die Flaschenspitze weder Ihr Auge noch Ihre Finger berührt.
- Mit der Verschlusskappe ordnungsgemäß nach Gebrauch verschließen.
- Verabreichen Sie einen oder zwei Tropfen in jedes Auge, alle drei bis vier Stunden, oder wie vom Arzt/von der Ärztin verordnet.



WARNHINWEISE

- Wenden Sie **OCUsalin® day** nicht an, wenn eine Überempfindlichkeit bekannt ist oder Sie gegen einen der Bestandteile allergisch sind.
- Falls eine Augenirritation auftritt, beenden Sie die Anwendung von **OCUsalin® day** und fragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin um Rat.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Innerhalb von 8 Wochen nach Anbruch verwenden.
- Nicht schlucken.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Stellen Sie sicher, dass die Flaschenspitze weder Ihr Auge noch Ihre Finger berührt.
- Teilen Sie **OCUsalin® day** mit niemanden.

LFHAG01300

pharma STULLN

- In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Sie nach Anwendung von **OCUsalin® day** wegen der Viskosität der Lösung vorübergehend verschwommen sehen. Bitte warten Sie einige Minuten, bevor Sie einer Tätigkeit nachgehen, die klare Sicht erfordert.
- Entfernen Sie Kontaktlinsen, bevor Sie **OCUsalin® day** anwenden, da sonst die Oberfläche der Kontaktlinsen beeinträchtigt werden könnte. Warten Sie mindestens dreißig Minuten, bevor Sie sie wieder einsetzen.
- Falls Sie auch andere Augentropfen oder -salben benutzen, lassen Sie mindestens dreißig Minuten zwischen jeder Anwendung verstreichen.
- Falls Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin, bevor Sie **OCUsalin® day** anwenden.
- Normalerweise ist das Produkt für eine kontinuierliche Anwendung über maximal sieben aufeinander folgende Tage vorgesehen; bitten Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin um Rat, falls sich Ihre Symptome nicht verbessern.

LOT Chargen-Nummer und  „verwendbar bis“ sind auf dem Etikett und der Faltschachtel eingeprägt.

STERILE A aseptische Herstellung.

 Beschreibung und Art der Anwendung siehe beigefügte Gebrauchsanweisung.

 Lagerungstemperatur.

 Nicht verwenden bei beschädigter Flasche oder Siegelring.



Hersteller:
NTC S.r.l.
 Via Luigi Razza 3
 20124 Milano
 Italy

Vertrieb in Deutschland:
 Pharma Stulln GmbH
 Werksstraße 3
 92551 Stulln
 Germany



CE 0426

STAND DER INFORMATION: 06/2019

LFHAG01300

pharma STULLN