

# Sanum

## Bovisan® D6 Flüssige Verdünnung



Darreichungsform:	Tropfen zum Einnehmen und Einreiben
Präparatgruppe:	Bakterienpräparate
Wirkstoff:	Mycobacterium bovis (BCG) e volumine cellulae D6
Zusammensetzung:	5 ml enthalten: 5 ml Mycobacterium bovis (BCG) e volumine cellulae D6 dil. (HAB, Vorschrift 5a).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	<p>Zum Einnehmen: 1x täglich 5-10 Tropfen vor einer Mahlzeit.</p> <p>Zum Einreiben: 1x täglich 5-10 Tropfen am Ort der Erkrankung oder in die Ellenbeugen einreiben. Nach 8 Wochen Therapiedauer sollte eine mehrmonatige Therapiepause eingelegt werden.</p>
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Bovisan D6 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.
Gegenanzeigen:	Wegen nicht ausreichend vorliegender Untersuchungen bei Kindern soll dieses Arzneimittel bei Kindern unter 12 Jahren und in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.
Unerwünschte Reaktionen:	

---

Wechselwirkungen: Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel oder Therapien können die Wirksamkeit von Bovisan® D6 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

---

Vorsichtsmaßnahmen: Keine bekannt.

---

Dauer der Behandlung:

---

Handelsform: 5 ml Tropfflasche, 10x 5 ml Bündelpackung.

---

Stand vom: 607