

GLUE AREA ZONE

Background limit (overflow 3mm)

Cut

Text limit

**Qualität ohne Kompromisse**

Novalac stellt höchste Qualitätsansprüche an die Herkunft der Inhaltsstoffe sowie deren Verarbeitung. Im Zentrum der Novalac Forschung stehen mit einer jahrzehnte langen Erfahrung und Kompetenz in der pädiatrischen Ernährungswissenschaft, die Entwicklung und das optimale Wachstum von Babys. **Novalac BK** ist Teil eines individuellen Sortiments von Säuglingsmilchnahrungen, die auf den gesamten Ernährungsbedarf von Säuglingen in den verschiedenen Entwicklungsphasen und deren besonderen Anforderungen abgestimmt sind.

**ANWENDUNG**

**Novalac BK** ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zur diätetischen Behandlung von Blähungen und Koliken im Säuglingsalter, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird. **Novalac BK** hilft auf natürliche Weise – durch einen reduzierten Lactosegehalt – wenn ein Säugling zu Darmgasen (Blähungen und Koliken) neigt.

**DOSIERUNG**

Alter (Monate)	0-1	1-2
Säuglingsgewicht (kg)	4	5
Anzahl Fläschchen pro Tag	6-7	5
Anzahl Messlöffel	3-4	4
Abgekochtes Wasser (ml)	90-120	120

2-3	3-4	4-5	5-6	>6
6	6,5	7	7,5	>7,5
5	5	4	4	3*
4-5	6	6-7	6-7	7
120-150	180	180-210	180-210	210

\*bei zusätzlicher Nahrungsaufnahme

Standardauflösung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. 1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g **Novalac BK**.

Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt sollen Mengen und Anzahl aller Tagesmahlzeiten auf die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Bitte halten Sie die Dosierungsempfehlungen genau ein.

**WICHTIGE HINWEISE**

Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby! **Novalac BK** ist geeignet zur ausschließlichen Ernährung von Säuglingen bis zum 6. Lebensmonat und enthält alle wichtigen Nährstoffe, die Ihr Baby für eine gesunde Entwicklung und optimales Wachstum benötigt. Ab dem 6. Monat sollte **Novalac BK** in Absprache mit dem Kinderarzt mit Breimahlzeiten kombiniert werden. **Novalac BK** sollte aus der Ernährung von Säuglingen ohne Blähungen ausgeschlossen werden. Im Fall einer Kuhmilch-Eiweißallergie, niedrigem Geburtsgewicht oder bei Säuglingen mit geschwächtem Immunsystem, wenden Sie sich bitte an Ihren Kinderarzt. **Novalac BK** nur unter medizinischer Kontrolle verwenden.

**SICHERHEITSHINWEISE**

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck. Nach Öffnung der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen und kühl und trocken aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschenahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.

**Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zur diätetischen Behandlung von lactose-bedingten Koliken und Blähungen.**

Ein Produkt von **UP Euronord SA**  
ICC, Route de Pré-Bois 20, Case Postale 1876  
1215 Genf – Schweiz

Vertrieb durch **careforce pharma GmbH**  
Horbeller Straße 11, D-50858 Köln  
www.novalac.de

**e 800 g**



Unter Schutzatmosphäre verpackt

# Novalac BK

Blähungen und Koliken



**800 g**

Spezialnahrung für Babys mit Blähungen und Koliken

0-12 Monate

**ZUSAMMENSETZUNG**

im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung	100kcal
<b>Energie</b>	kcal 506,3	65,8	100
	kJ 2119,9	275,6	418,7
<b>Fett</b> davon	g 25,5	3,3	5
- gesättigt	g 12,4	1,6	2,4
- einfach ungesättigt	g 6,5	0,8	1,3
- mehrfach ungesättigt	g 5,3	0,7	1
<b>Kohlenhydrate</b> davon	g 58,2	7,6	11,5
- Lactose	g 23,1	3	4,6
<b>Eiweiß</b>	g 11	1,4	2,2
<b>Natrium</b>	g/mg 0,375/150	0,05/19,5	0,07/29,6

**Mineralstoffe**

Kalium	mg 450	58,5	88,9
Chlorid	mg 300	39	59,3
Calcium	mg 350	45,5	69,1
Phosphor	mg 230	29,9	45,4
Magnesium	mg 45	5,9	8,9
Eisen	mg 6	0,8	1,2
Zink	mg 4,5	0,6	0,9
Jod	µg 65	8,5	12,8
Kupfer	µg 400	52	79
Mangan	µg 35	4,6	6,9
Selen	µg 10	1,3	2
Fluorid	µg <500	<65	<99

**Vitamine**

A	µg RE 450	58,5	88,9
B1	µg 400	52	79
B2	µg 800	104	158
B6	µg 300	39	59,3
B12	µg 1,5	0,2	0,3
C	mg 60	7,8	11,9
D3	µg 7,5	1	1,5
E	mg α-TE 12,8	1,7	2,5
K1	µg 30	3,9	5,9
Niacin	mg 4,5	0,6	0,9
Pantothensäure	mg 2,4	0,3	0,5
Folsäure	µg 60	7,8	11,9
Biotin	µg 15	2	3
Cholin	mg 60	7,8	11,9
Inositol	mg 25	3,3	4,9
Taurin	mg 44	5,7	8,7
L-Carnitin	mg 8	1	1,6

Beratungshotline 0800-6682522 (kostenlos)  
www.novalac.de

**ZUTATEN**

Magermilchpulver, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palm-, Soja- und Kokosussöl), Lactose (Milch), Molkeprotein\* (Milch), Calciumchlorid, Kaliumhydroxid, Emulgator (Sojalecithin), Vitamine (A, B1, B2, B6, C, D3, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure), Natriumchlorid, Dikaliumphosphat, Taurin, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Cholinbitartrat, Zinksulfat, Inositol, L-Carnitin, Antioxidationsmittel (Tocopherole), Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit.

\* Die Proteinquelle in **Novalac BK** ist Kuhmilch.

**ZUBEREITUNG**

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten.

**1** Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen. Oder kohlenstoffarmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.

**2** Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufte – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.

**3** Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.

**4** Temperatur (37°C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.

Tin size : 127x153

Offset Label specification 800g : 412,7x143,5