

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Iris-cyl[®] L

Ho-Len-Complex[®] Augen-Complex

Zusammensetzung:

10 g (entsprechend 10,8 ml) Mischung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

| | | |
|------------|---------|-------|
| Aconitum | Dil. D7 | 2,5 g |
| Apis | Dil. D4 | 2,5 g |
| Euphrasia | Dil. D3 | 2,5 g |
| Pulsatilla | Dil. D6 | 2,5 g |

1 g entspricht 23 Tropfen

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackung mit 30 ml / 50 ml / 100 ml Mischung

Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei Augenerkrankungen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharma Liebermann GmbH

Hauptstr. 27

D- 89423 Gundelfingen/Donau

Telefon: (09073) 95893-0

Telefax: (09073) 95893-55

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Begleittherapie bei akuten Entzündungen der Augen wie z.B. Augenlidrandentzündung, Bindehautentzündung.

Hinweis:

Bei starken Schmerzen im Bereich der Augen oder einem plötzlichen Nachlassen des Sehvermögens ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeige

Wann dürfen Sie Iris-cyl[®] L Ho-Len-Complex Augen-Complex[®] nicht anwenden?

Nicht anwenden bei Alkoholkranken und bei Bienengiftüberempfindlichkeit.

Wann dürfen Sie Iris-cyl[®] L Ho-Len-Complex Augen-Complex[®] erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Iris-cyl[®] L Ho-Len-Complex Augen-Complex[®] nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Bei Leberkranken ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen sollte Iris-cyl[®] L Ho-Len-Complex Augen-Complex[®] in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Warnhinweis:

Iris-cyl[®] L Ho-Len-Complex Augen-Complex[®] enthält 55,8 Vol.% Alkohol !

Wechselwirkungen

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Iris-cyl[®] L Ho-Len-Complex Augen-Complex[®] nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da sonst Iris-cyl[®] L Ho-Len-Complex Augen-Complex[®] nicht richtig wirken kann!

Wieviel und wie oft sollten Sie Iris-cyl[®] L Ho-Len-Complex Augen-Complex[®] anwenden?

Soweit nicht anders verordnet:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Wie und wann sollten Sie Iris-cyl[®] L Ho-Len-Complex Augen-Complex[®] anwenden?

Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser einnehmen und einige Zeit im Mund belassen.

Wie lange sollten Sie Iris-cyl[®] L Ho-Len-Complex Augen-Complex[®] anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Iris-cyl[®] L Ho-Len-Complex Augen-Complex[®] auftreten?

Bisher sind keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Etikett sowie auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information:

Januar 2007

Zul.-Nr. 6657148.00.00