

# Sanum

## Sanukehl® Salm D6 Flüssige Verdünnung



Darreichungsform:	Tropfen zum Einnehmen und Einreiben
Präparatgruppe:	Bakterienpräparate
Wirkstoff:	Salmonella enteritidis e volumine cellulae D6
Zusammensetzung:	10 ml enthalten: 10 ml Salmonella enteritidis e volumine cellulae D6 Dil. (HAB, Vorschrift 5a, mit gereinigtem Wasser).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	<p>Zum Einnehmen: Bei akuten Krankheitszuständen werden vor einer Mahlzeit 5-10 Tropfen alle 12-24 Stunden eingenommen. Bei chronischen Verlaufsformen werden 10 Tropfen alle 2 Tage eingenommen.</p> <p>Zum Einreiben in die Haut: Alle 1-2 Tage werden 5-10 Tropfen in die Ellenbeuge eingerieben. Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis. Nach längstens 8 Wochen Therapiedauer sollte eine mehrmonatige Therapiepause eingelegt werden.</p>
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Sanukehl® Salm D6 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.
Gegenanzeigen:	Keine bekannt.
Unerwünschte Reaktionen:	

---

**Wechselwirkungen:** Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel oder Therapien können die Wirksamkeit von Sanukehl® Salm D6 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

---

**Vorsichtsmaßnahmen:** Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft nicht und in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 6 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden.

---

**Dauer der Behandlung:**

---

**Handelsform:** 10 ml Tropfflasche  
10x 10 ml Bündelpackung.