



Streukügelchen für Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Indikationsgruppe**

Homöopathisches Arzneimittel bei Störungen der Verdauungsorgane.

**Anwendungsgebiete**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden (leichte krampfartige Magen-Darm-Beschwerden wie Völlegefühl, Blähungen).

**Gegenanzeigen**

Flatulini darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen *Matricaria recutita* (Kamille), einen der weiteren Wirkstoffe oder die sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind. Flatulini soll bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Korbblütler nicht angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Bei Verfärbung des Stuhls oder Blut im Stuhl sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln in der Schwangerschaft und Stillzeit Ihren Arzt um Rat.

Dieses Arzneimittel enthält Saccharose. Bitte nehmen Sie Flatulini erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind bisher nicht bekannt geworden. Bei Einhaltung der empfohlenen Dosierung ist kein Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen zu erwarten.

**Wechselwirkungen**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

**Dauer der Behandlung**

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Dosierung und Art der Anwendung.** Soweit nicht anders verordnet:

**Akutdosierung:**

Alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich

**Säuglinge** je 1–2 Globuli  
bis zum 1. Lebensjahr (maximal 10 Globuli/Tag)  
nach Rücksprache mit einem Arzt

**Kleinkinder** je 2–3 Globuli  
bis zum 6. Lebensjahr (maximal 15 Globuli/Tag)  
nach Rücksprache mit einem Arzt

**Kinder** je 3–4 Globuli  
zwischen dem 6. und 12. (maximal 20 Globuli/Tag)  
Lebensjahr

**Jugendliche** je 5 Globuli  
ab 12 Jahren und (maximal 30 Globuli/Tag)  
**Erwachsene**

**Hinweise für die Anwendung**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**Nebenwirkungen**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweise zu Verfallsdatum und Aufbewahrung**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch ist das Arzneimittel noch 6 Monate haltbar.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

**Zusammensetzung**

In 10 g Streukügelchen sind verarbeitet:

Wirkstoffe:

Artemisia absinthium	Dil. D 3	25 mg
Gentiana lutea	Dil. D 3	25 mg
Juniperus communis	Dil. D 3	25 mg
Matricaria recutita	Dil. D 2	25 mg

Sonstiger Bestandteil: Saccharose

**Packungsgröße**

2,0 g

**Dosierung bei länger andauernden Verlaufsformen:**

1–3mal täglich

**Säuglinge** je 1–2 Globuli  
bis zum 1. Lebensjahr (maximal 5 Globuli/Tag)  
nach Rücksprache mit einem Arzt

**Kleinkinder** je 2–3 Globuli  
bis zum 6. Lebensjahr (maximal 8 Globuli/Tag)  
nach Rücksprache mit einem Arzt

**Kinder** je 3–4 Globuli  
zwischen dem 6. und 12. (maximal 10 Globuli/Tag)  
Lebensjahr

**Jugendliche** je 5 Globuli  
ab 12 Jahren und (maximal 15 Globuli/Tag)  
**Erwachsene**

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren. Bei Fragen zur Klärung der Anwendung befragen Sie bitte einen Arzt oder Apotheker. Für die Akutdosierung gilt: Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen. Dieses Arzneimittel sollte mit zeitlichem Abstand zu den Mahlzeiten eingenommen werden.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden  
Telefon: 07221 501-00, Telefax: 07221 501-210  
E-Mail: [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

Stand der Information: Februar 2022



## Liebe Eltern,

Sie haben für Ihr Kind das Arzneimittel Flatulini gekauft. Flatulini ist ein homöopathisch hergestelltes Arzneimittel.

### Wie entstehen Verdauungsbeschwerden?

Bauchschmerzen im Rahmen von Verdauungsstörungen gehören zu den häufigsten Beschwerden im Kindesalter und können vielfältige Ursachen haben. Neben organischen Ursachen wie Entzündungen der Magen- oder Darmschleimhaut oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten können auch rein funktionelle Störungen der Verdauung den Kindern zu schaffen machen. Typische Symptome sind Völlegefühl, Blähungen, Aufstoßen und Übelkeit, eventuell mit Erbrechen. Auch krampfartige Bauchschmerzen können schon im Säuglingsalter auf eine Störung der Verdauungsfunktionen hinweisen.

Bauchschmerzen im Säuglings- und Kleinkindalter sollten ärztlich abgeklärt werden. Auch bei älteren Kindern ist bei anhaltenden Beschwerden oder Fieber über 38 °C ein Arztbesuch erforderlich.

### Wie kann Flatulini Ihrem Kind helfen?

Flatulini lindert Verdauungsstörungen wie Blähungen, schon im Säuglings- und Kleinkindalter.



### So funktioniert der Dosierspender

Spender zum Drücken immer senkrecht halten. Zur vollständigen Entleerung den Spender gegebenenfalls kurz schütteln.

**Heel wünscht Ihrem Kind gute Besserung!**