

#### Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

**Dobensana® Junior 1,2 mg/ 0,6 mg Lutschtabletten**  
Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren

2,4-Dichlorbenzylalkohol und Amylmetacresol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.  
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.  
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.  
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.  
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist **Dobensana Junior** und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von **Dobensana Junior** beachten?
3. Wie ist **Dobensana Junior** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Dobensana Junior** aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

#### 1. Was ist **Dobensana Junior** und wofür wird es angewendet?

**Dobensana Junior** ist ein Hals- und Rachentherapeutikum.

**Dobensana Junior** wird angewendet zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.

#### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von **Dobensana Junior** beachten?

**Dobensana Junior darf nicht angewendet werden**, wenn Sie allergisch gegen 2,4- Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie **Dobensana Junior** anwenden:

Grundsätzlich ist bei durch Bakterien verursachten Infektionen die Notwendigkeit einer gezielten antibiotischen Behandlung abzuklären.

Bei Verdacht auf eine Pilzinfektion ist die Behandlung mit einem geeigneten Antimykotikum (Medikament für die gezielte Behandlung von Pilzinfektionen) erforderlich.

#### Kinder

**Dobensana Junior** wird für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen.

#### Bei Einnahme von **Dobensana Junior** mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

#### Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aufgrund fehlender Erfahrung sollten Sie **Dobensana Junior** während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden.

#### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von **Dobensana Junior**:

Dieses Arzneimittel enthält Maltitol und Isomalt. Bitte nehmen Sie **Dobensana Junior** erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

1 Lutschtablette enthält 0,458 g Maltitol und 1,830 g Isomalt entsprechend ca. 0,19 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Der Kalorienwert beträgt 2,3 kcal/g Maltitol/Isomalt. Maltitol/Isomalt kann eine leicht abführende Wirkung haben.

Dieses Arzneimittel enthält 7,30 mg Propylenglycol\* pro Lutschtablette entsprechend 2,92 mg/kg/Tag.

Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit Benzylalkohol. Benzylalkohol kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1mmol Natrium (23 mg) pro Lutschtablette, d.h., es ist nahezu „natriumfrei“.

#### 3. Wie ist **Dobensana Junior** anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### Dosierung:

Die niedrigste wirksame Dosis sollte über den kürzesten Zeitraum, der für die Erreichung der Beschwerdefreiheit notwendig ist, angewendet werden.

#### Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:

Alle 2 bis 3 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen lassen.

#### Kinder unter 6 Jahren:

**Dobensana Junior** wird für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen.

#### Ältere Patienten:

Eine Dosisanpassung bei älteren Personen ist nicht erforderlich.

Die Tagesdosis sollte 8 Lutschtabletten nicht überschreiten.

#### Art der Anwendung:

Zur Anwendung im Mund – und Rachenraum. Um eine Reizung der Mundschleimhaut zu vermeiden, sollten Sie **Dobensana Junior** - wie alle Lutschtabletten - während des Auflösens im Mund bewegen.

Sprechen Sie bitte mit einem Arzt,

- wenn Sie unter schweren Halsentzündungen oder Halsschmerzen, die mit hohem Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen einhergehen leiden.
- wenn sich Ihre Beschwerden innerhalb von 3 Tagen nicht bessern oder gar verschlechtern.

#### Wenn Sie eine größere Menge **Dobensana Junior** angewendet haben, als Sie sollten:

Nach versehentlicher Aufnahme einer Vielzahl von **Dobensana Junior** benachrichtigen Sie bitte sofort Ihren Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann **auch dieses Arzneimittel** Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

#### Gelegentlich (1 bis 10 Behandelte von 1.000)

Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag, allergische, schmerzhaftige Schwellung von Haut und Schleimhaut v.a. im Gesichtsbereich, Nesselsucht, Atemnot durch Verengung der Atemwege und Bluthochdruck mit kurzzeitiger Bewusstlosigkeit können auftreten.

Überempfindlichkeitsreaktionen klingen nach Absetzen des Medikamentes in der Regel rasch wieder ab. Bei Auftreten dieser Erscheinungen, die schon bei Erstanwendung vorkommen können, ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich.

**Sehr selten (weniger als 1 Behandler von 10.000)** Magen-Darm-Beschwerden wie Verdauungsstörungen (Dyspepsie), Übelkeit.

#### Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Magen-Darm-Beschwerden und ein unangenehmes Gefühl im Mund welches sich als Irritationen im Rachenbereich, orale Missempfindung (Kribbeln oder „Taubheit“) der Haut, Mundödem und Zungenbrennen äußern kann.

Benzylalkohol kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. Wie ist **Dobensana Junior** aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25°C lagern.

#### 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

##### Was **Dobensana Junior** enthält:

Die Wirkstoffe sind: 2,4- Dichlorbenzylalkohol und Amylmetacresol.  
1 Lutschtablette enthält 1,2 mg 2,4- Dichlorbenzylalkohol und 0,6 mg Amylmetacresol.

Die sonstigen Bestandteile sind: Erdbeeraroma (enthält Propylenglycol), Saccharin-Natrium, Weinsäure (Ph.Eur.), Maltitol, Isomalt (Ph.Eur.), Anthocyane (E 163).

##### Wie **Dobensana Junior** aussieht und Inhalt der Packung:

**Dobensana Junior** sind rosafarbene, runde Lutschtabletten und in Packungen zu 8, 16, 24, 36 und 48 Lutschtabletten erhältlich. Möglicherweise werden nicht alle Packungsgrößen vermarktet.

##### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller Pharmazeutischer Unternehmer:

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH  
Darwinstrasse 2-4  
69115 Heidelberg  
Tel.: (06221) 9982-333

##### Hersteller:

RB NL Brands B.V.  
Schiphol Boulevard 207,  
1118 BH Schiphol,  
Niederlande

##### Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2020.

## RB Artwork and Print Specification

Trident Reference No:	RB480033
ZEN Ref:	<b>TR2229776</b>
Action:	<b>B</b>
Brand:	Strepsils
Category:	Throatcare
Segment Group:	Junior
Segment:	24
Pack Size:	24Pack
Market/Country:	Germany
Date:	13/07/21

RBH Contact: Fabian Dohmen

#### Artwork Type: **BW Commercial**



Component Code (2D if applicable):	<b>3193799</b>
2 <sup>nd</sup> Component Code (if applicable):	<b>N/A</b>
Parent Technical Packaging Specification:	D0070055
Finished Goods Code:	<b>3061605</b>
Supply Point:	RB Nottingham
3rd Party Code:	N/A
Pharmacode No/NE:	011011101Q(1465)
Edgemark Position:	N/A

CAD Cam Ref:	S-Lit-FB-210x148mm
Printer:	Multi Packaging Solutions (Tewkesbury, UK)
Substrate:	Paper White

#### Technical & Non Printing Items

 Cutter	 Cutter 2 (if applicable)
 Guides	 Guides 2 (if applicable)

#### Colours (Leaflet)

 Process Black	 LTH
---	---

## BARCODE INFO

Barcode Type:	N/A
Barcode Number:	N/A
Magnification:	N/A
Truncated By:	N/A
Full Height:	N/A
Bar Height (Smallest Bar):	N/A
BWR:	N/A
Encoded Data:	N/A



HEALTH > HYGIENE > HOME



Connaught House, Connaught Road,  
Kingswood Business Park, Hull, HU7 3AP, England.  
T: +44 (0) 1482 828100

Please note that any low resolution paper Canon colour copies associated with this job should be referred to for content, layout and colour separation only.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THIS ARTWORK BE ALTERED WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM TRIDENT.

**STUDIO USE ONLY** Jagan Chandrasekar **v2.0**  
Sm•Art check results: G=2; O=0; R=0; - JC - 13/07/21 11:48:02

**CUSTOMER INFO:**  
Minimum Point Size = 9.00pt

3193799

mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

# RB Artwork and Print Specification

Trident Reference No: RB480033  
ZEN Ref: **TR2229776**  
Action: **B**  
Brand: Strepisils  
Category: Throatcare  
Segment Group: Junior  
Segment: 24  
Pack Size: 24Pack  
Market/Country: Germany  
Date: 13/07/21

RBH Contact: Fabian Dohmen

## Artwork Type: **BW Commercial**


Component Code (2D if applicable): **3193799**  
2<sup>nd</sup> Component Code (if applicable): **N/A**  
Parent Technical Packaging Specification: D0070055  
Finished Goods Code: **3061605**  
Supply Point: RB Nottingham  
3rd Party Code: N/A  
Pharmacode No/NE: 0110111010(1465)  
Edgemark Position: N/A

CAD Cam Ref: S-Lit-FB-210x148mm  
Printer: Multi Packaging Solutions (Tewkesbury, UK)  
Substrate: Paper White

### Technical & Non Printing Items

 Cutter  Cutter 2 (if applicable)  
 Guides  Guides 2 (if applicable)

### Colours (Leaflet)



## BARCODE INFO

Barcode Type: N/A  
Barcode Number: N/A  
Magnification: N/A  
Truncated By: N/A  
Full Height: N/A  
Bar Height (Smallest Bar): N/A  
BWR: N/A  
Encoded Data: N/A



HEALTH > HYGIENE > HOME



Connaught House, Connaught Road,  
Kingswood Business Park, Hull, HU7 3AP, England.  
T: +44 (0) 1482 828100

Please note that any low resolution paper Canon colour copies associated with this job should be referred to for content, layout and colour separation only.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THIS ARTWORK BE ALTERED WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM TRIDENT.

**STUDIO USE ONLY** Jagan Chandrasekar **v2.0**  
Sm•Art check results: G=2; O=0; R=0; - JC - 13/07/21 11:48:02

