

# Gebrauchsinformation

Homöopathisches Arzneimittel

## VETOKEHL® Muc D5 Flüssige Verdünnung

Für Tiere

Pferd, Rind, Schwein, Ziege, Schaf, Hund, Katze, Geflügel, Heimtiere  
(z.B. kleine Nagetiere, Ziervögel)



**Wirkstoff:** Mucor racemosus e volumine mycelii (lyophil., steril.) D5 Dil.

**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

**Gegenanzeigen:**

Keine bekannt.

**Wechselwirkungen:** Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn **VETOKEHL® Muc D5** gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

**Zieltierarten:** Pferd, Rind, Schwein, Ziege, Schaf, Hund, Katze, Geflügel, Heimtiere (z.B. kleine Nagetiere, Ziervögel)

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet:

Zum Einreiben: 5 - 10 Tropfen am Ort der Erkrankung.

Zum Eingeben:

bei Pferden und Rindern:

1 x täglich 20 Tropfen;

bei Fohlen, Kälbern, Schweinen, Ziegen und Schafen:

1 x täglich 10 Tropfen;

bei Hunden, Katzen, Ferkeln, kleinen Nagetieren  
und Ziervögeln:

1 x täglich 5 Tropfen;

bei Geflügel:

10 ml täglich in das  
Trinkwasser für 500 Tiere.

Die Dosierung soll dem Befund angepasst werden.

Die Anwendung des Präparates sollte beendet werden, wenn die für das Arzneimittelbild relevanten Symptome nicht mehr auftreten.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die richtige Anwendung:** Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.





**Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation oder der Legeperiode:** Zur Verträglichkeit von **VETOKEHL® Muc D5** bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt.

**Hinweis:** Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

**Wartezeit:**

Pferd, Rind, Kalb, Schwein, Ziege, Schaf, Geflügel  
Essbares Gewebe: 0 Tage  
Milch: 0 Tage  
Eier: 0 Tage

**Besondere Lagerhinweise:**

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Bitte lagern Sie das Arzneimittel nicht über 25° C!

Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und auf der äußeren Umhüllung aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Das Arzneimittel darf nach Öffnung der Flasche höchstens noch 8 Wochen verwendet werden. - Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels. Falls die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe oder flockig aussieht, soll das Arzneimittel auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden. Im Behältnis verbleibende Reste des Arzneimittels nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nach Anbruch sind zu verwerfen.

**Zusammensetzung:**

10 ml enthalten:

Wirkstoff: 10 ml Mucor racemosus e volumine mycelii (lyophil., steril.) D5 Dil. (HAB, Vorschrift 5a mit gereinigtem Wasser).

**Darreichungsform und Inhalt:**

10 ml / 10 x 10 ml flüssige Verdünnung zum Eingeben und Einreiben.



**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

**SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG**

Hasseler Steinweg 9 · D-27318 Hoya

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 18287.00.02

**Stand der Gebrauchsinformation: 03 / 2020**



Trennung an der abstehenden Lasche anfassen und rundherum abziehen.



Weiße Schutzkappe mit Daumen und Zeigefinger kräftig anfassen und zur Seite abknicken.



Tropfenweise Entnahme durch vorsichtiges Zusammen-drücken der Gummipipette mit Daumen und Zeigefinger.



Nach Gebrauch Schutzkappe fest aufdrücken bis sie hörbar einrastet. Hierdurch dichter Verschluss der Tropfflasche.

**Hinweis:** Zur weiteren Anwendung stehen Ihnen **VETOKEHL® Muc** Flüssige Verdünnung zur Injektion und Tabletten zur Verfügung.