



Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

SANUKEHL® Trich D6 Flüssige Verdünnung Homöopathisches Arzneimittel



Wirkstoff: Trichophyton verrucosum extractum cellulae (lyophil., steril.) Dil. D6

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis an den Anwender: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Trichophytonarten. Nicht anwenden bei Kindern unter 12 Jahren. Siehe unter Vorsichtsmaßnahmen, Warnhinweise.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von SANUKEHL® Trich D6?

Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel oder Therapien können die Wirksamkeit von **SANUKEHL® Trich D6** beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da das Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!


Wieviel und wie oft sollten Sie SANUKEHL® Trich D6 anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, werden von Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren bei akuten Krankheitszuständen vor einer Mahlzeit 5-10 Tropfen alle 12 bis 24 Stunden eingenommen. Bei chronischen Verlaufsformen werden 10 Tropfen alle 2 Tage eingenommen.

SANUKEHL® Trich D6 kann auch in die Haut eingerieben werden; bei dieser Art der Anwendung werden von Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren alle 1-2 Tage 5-10 Tropfen am Ort der Erkrankung oder in die Ellenbeugen eingerieben.

Wie lange sollten Sie SANUKEHL® Trich D6 anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte eine mehrmonatige



Therapiepause eingelegt werden. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren. Ein Milliliter **SANUKEHL® Trich D6** enthält 22 Tropfen.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **SANUKEHL® Trich D6** auftreten? Aufgrund des Gehaltes von **SANUKEHL® Trich D6** an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

In diesem Fall sollten Sie die Anwendung unterbrechen und einen Arzt aufsuchen.

Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Das Arzneimittel darf nach Öffnung der Flasche höchstens noch 2 Monate verwendet werden. Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels. Falls die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe oder flockig aussieht, soll das Arzneimittel auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

Zusammensetzung:

10 ml flüssige Verdünnung enthalten: Wirkstoff:

10 ml **Trichophyton verrucosum extractum cellulae (lyophil., steril.) Dil. D6** (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser).

Darreichungsform und Inhalt:

10 ml / 10 x 10 ml flüssige Verdünnung zum Einnehmen und Einreiben.



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-Kehlbeck
GmbH & Co. KG

Postfach 1355 · D-27316 Hoya
Tel.: + 49 (0)42 51 - 9352-0
Fax: + 49 (0)42 51 - 93 52 -291
E-Mail: info@sanum.com

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Reg.-Nr.: 33256.00.00

Apothekenpflichtig

Stand der Gebrauchsinformation: 11 / 2017



Trennung
an der abstehenden
Lasche
anfassen
und runderum
abziehen.



Weißer Schutzkappe
mit Daumen und
Zeigefinger
kräftig anfassen
und zur Seite
abknicken.



Tropfenweise Ent-
nahme durch vor-
sichtiges Zusammen-
drücken der Gummii-
Pipette mit Daumen
und Zeigefinger



Nach Gebrauch
Schutzkappe fest auf-
drücken bis sie hörbar
einrastet. Hierdurch
dichter Verschluss der
Tropfflasche.