

Liebe Patientin, lieber Patient !

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation**Muco-cyl® L****Ho-Len-Complex®
Schleimhaut-Complex**

10 g (entsprechend 10,5 ml) Mischung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Ammonium chloratum	Dil. D3	1,70 g
Cepa	Dil. D6	1,65 g
Cinnabaris	Dil. D8	1,65 g
Kalium bichromicum	Dil. D4	1,65 g
Natrium chloratum	Dil. D8	1,70 g
Thuja	Dil. D6	1,65 g

1 g entspricht 23 Tropfen

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackung mit 30 ml / 50 ml / 100 ml Mischung

Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemwege.



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharma Liebermann GmbH

Hauptstr. 27

D- 89423 Gundelfingen/Donau

Telefon: (09073)95893-0

Telefax: (09073)95893-55

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Schnupfen.

Hinweis:

Bei Fieber, Kopfschmerzen oder eitrigem Schnupfen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Muco-cyl® L Ho-Len-Complex® Schleimhaut-Complex nicht anwenden?

Nicht anwenden bei Chromüberempfindlichkeit sowie bei Alkoholkranken.

Wann dürfen Sie Muco-cyl® L Ho-Len-Complex® Schleimhaut-Complex erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Muco-cyl® L Ho-Len-Complex® Schleimhaut-Complex nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Bei Leberkranken ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Warnhinweis:

Muco-cyl® L Ho-Len-Complex® Schleimhaut-Complex enthält 38 Vol.% Alkohol!

Wechselwirkungen:

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Muco-cyl® L Ho-Len-Complex® Schleimhaut-Complex nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da sonst Muco-cyl® L Ho-Len-Complex® Schleimhaut-Complex nicht richtig wirken kann!

Wieviel und wie oft sollten Sie Muco-cyl® L Ho-Len-Complex® Schleimhaut-Complex anwenden?

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Die Einnahme sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Wie und wann sollten Sie Muco-cyl® L Ho-Len-Complex® Schleimhaut-Complex anwenden?

Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser einnehmen und einige Zeit im Mund belassen.

Wie lange sollten Sie Muco-cyl® L Ho-Len-Complex® Schleimhaut-Complex anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Muco-cyl® L Ho-Len-Complex® Schleimhaut-Complex auftreten?

In Einzelfällen können Hautreaktionen sowie verstärkter Speichelfluss auftreten; das Arzneimittel ist dann abzusetzen.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Etikett sowie auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: Juni 2007

Zul.-Nr.: 6658142.00.00