

Background limit (overflow 3mm)

Cut

Text limit

ACHTUNG ! ACHTUNG ! ACHTUNG ! ACHTUNG ! ACHTUNG !
Kein Size Fehler -> --%
Hellfeld Fehler -> -/-
Qualität im Proof -> OF
Dekodierbar!
No Size Error -> --%
White Area Error -> -/-
Quality on Proof -> OF
Readable!
ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION !

ANWENDUNG

Novalac PRE ist eine Säuglingsmilchnahrung von besonders ausgesuchter Qualität und eignet sich für die besondere Ernährung von Neugeborenen und Säuglingen von Geburt an, als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern zur Muttermilch. **Novalac PRE** enthält nur natürlichen Milchzucker (Lactose) und kann wie Muttermilch nach Bedarf gegeben werden. **Novalac PRE** enthält nach dem Vorbild der Muttermilch, wertvolle mehrfach, ungesättigte Fettsäuren (LCP) sowie Prebiotika (Galacto-Oligosaccharide).

DOSIERUNG

Alter (Monate)	0-1	1-2
Säuglingsgewicht (kg)	4	5
Anzahl Fläschchen pro Tag	6-7	5
Anzahl Messlöffel	3-4	4
Abgekochtes Wasser (ml)	90-120	120

2-3	3-4	4-5	5-6
6	6,5	7	7,5
5	5	4	4
4-5	6	6-7	6-7
120-150	180	180-210	180-210

Standardauflösung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
 1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g **Novalac PRE**.

WICHTIGE HINWEISE

Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby! Wenn Sie eine Säuglingsmilchnahrung verwenden wollen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt. Verwenden Sie für Ihr Baby nach Rücksprache mit Ihrem Kinderarzt bei Kuhmilch-Eiweißallergie, bei einer Frühgeburt oder geschwächtem Immunsystem nur geeignete Spezialnahrungen.
Novalac PRE kann vom 1. Fläschchen bis zum 6. Monat als alleinige Nahrung gegeben werden, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird.

SICHERHEITSHINWEISE

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck.
- Nach Öffnung der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen und kühl und trocken aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verworfen.

Beratungshotline 0800-6682522 (kostenlos) www.novalac.de

Ein Produkt von **Laboratoires Novalac SA**
 ICC, Route de Pré-Bois 20, Case Postale 1876
 1215 Genf - Schweiz

Vertrieb durch **careforce pharma GmbH**
 Horbeller Straße 11, D-50858 Köln - www.novalac.de

e 400 g

1533F08B



PZN - 11076325

Unter Schutzatmosphäre verpackt.

Novalac

Säuglingsmilchnahrung

- ✓ GOS *
- ✓ LCP (DHA) **
- ✓ Nukleotide
- ✓ Nur Lactose

PRE



0-6 Monate

400g

ZUSAMMENSETZUNG

im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung	100kcal
Energie	2152,1 kcal	279,8 kcal	418,3 kcal
Fett davon	514,4 g	66,9 g	100 g
- gesättigt	27 g	3,5 g	5,2 g
- einfach ungesättigt	11,3 g	1,5 g	2,2 g
- mehrfach ungesättigt davon	11,4 g	1,5 g	2,2 g
- Linolensäure (ω-6)	4,3 g	0,6 g	0,8 g
- α-Linolensäure (ω-3) davon	3,4 g	0,4 g	0,7 g
-ARA (C20:4 ω-6)	480 mg	62,4 mg	93,3 mg
-DHA (C22:6 ω-3)	86 mg	11,2 mg	16,7 mg
Kohlenhydrate davon	81 mg	10,5 mg	15,7 mg
- Lactose	56,4 g	7,3 g	11 g
GOS	54 g	7 g	10,5 g
Ballaststoffe	1,9 g	0,2 g	0,4 g
Eiweiß	1,3 g	0,2 g	0,3 g
Natrium	10,6 g	1,4 g	2,1 g
Mineralstoffe	g/mg	0,388/155	0,05/20,2
Kalium	mg	500	65
Chlorid	mg	320	41,6
Calcium	mg	385	50,1
Phosphor	mg	230	29,9
Magnesium	mg	46	6
Eisen	mg	6	0,8
Zink	mg	4,6	0,6
Jod	µg	77	10
Kupfer	µg	385	50,1
Mangan	µg	130	16,9
Selen	µg	19	2,5
Fluorid	µg	19	2,5
Vitamine	µg RE	540	70,2
A	µg	450	58,5
B1	µg	700	91
B2	µg	300	39
B6	µg	1,2	0,2
B12	µg	90	11,7
C	mg	9,3	1,2
D3	µg	6,7	0,9
E	mg α-TE	39	5,1
K1	µg	3,6	0,5
Niacin	mg	2,5	0,3
Pantothensäure	µg	80	10,4
Folsäure	µg	11	1,4
Biotin	µg		2,1

im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung	100kcal
Nukleotide	mg	24,8	3,2
AMP	mg	3,7	0,5
CMP	mg	1,2	1,6
GMP	mg	2,3	0,3
UMP	mg	5,1	0,7
IMP	mg	1,7	0,2
Cholin	mg	85	11,1
Inositol	mg	30	3,9
Taurin	mg	46	6
L-Carnitin	mg	10	1,3

* GOS: Galacto-Oligosaccharide, prebiotische Ballaststoffe
 ** LCP (DHA): Langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren

ZUTATEN

Magermilchpulver, entmineralisiertes Molkepulver (aus Milch)* pflanzliche Öle (Palm-, Raps-, Palmkern- und Sonnenblumenöl), Lactose (aus Milch), Galacto-Oligosaccharide (aus Milch), Kaliumcitrat, Fischöl, Calciumcarbonat, Einzelleröl, Magnesiumchlorid, Vitamine (A, B1, B6, C, D, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure), Natriumcitrat, Calciumphosphat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Taurin, Cholinbitartrat, Eisensulfat, Nukleotide (Natriumsalze von Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Guanosin-, Inosin-5-monophosphaten), Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, Tocopherole), Kaliumjodid, Natriumselenit, Kupfersulfat, Mangansulfat.

* Die Proteinquelle in **Novalac PRE** ist Kuhmilch

ZUBEREITUNG

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten.

- 1 Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen. Oder kohlenstoffarmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.
- 2 Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufte – Messlöffel, **Novalac** hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.
- 3 Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.
- 4 Temperatur (37°C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.

115,75 mm

13 mm Klebelasche

323,8 mm

PMS 2727 C

PMS 288 C

M Y

Litho: 3008300
 Operator: MM