

Produktinformationen		Vivatlac Baby (10 Portionsbeutel)	
Datum	01.01.2025		
Dateiname	PZN 17195462 Vivatlac Baby 10 PB Vivatrex 2025 01 01 LMIV.doc		
PZN	17195462		
Produktbezeichnung	Vivatlac Baby (Nahrungsergänzungsmittel)		
Hersteller	Vivatrex GmbH Empeler Str. 118 46459 Rees Deutschland		
Verzeichnis der Zutaten	Nährstoff - Fructooligosaccharid, Füllstoff - Maisstärke, gefriergetrocknete Bakterien: <i>Lactobacillus acidophilus La-14</i> , <i>Lacticaseibacillus casei R0215</i> , <i>Lacticaseibacillus paracasei Lpc-37</i> , <i>Lactiplantibacillus plantarum Lp-115</i> , <i>Lacticaseibacillus rhamnosus GG</i> , <i>Ligilactobacillus salivarius Ls-33</i> , <i>Bifidobacterium bifidum R0071</i> , <i>Bifidobacterium lactis BI-04</i> , <i>Bifidobacterium longum R0175</i> .		
Zutaten, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können (gem. Anhang II <i>Lebensmittelinformationsverordnung EU (VO) 1169/2011</i>)	Kann Spuren von Milch und Soja enthalten.		
Nährwertdeklaration (gem. <i>Lebensmittelinformationsverordnung EU (VO) 1169/2011</i>)	Durchschnittliche Nährwertangabe	Pro 100 g	Pro 1 Portionsbeutel tägliche Verzehrempfehlung
	Brennwert	953 kJ/234 kcal	14,3 kJ/3,5 kcal
	Fett	0 g	0 g
	- davon gesättigte Fettsäuren	0 g	0 g
	Kohlenhydrate	15 g	0,23 g
	- davon Zucker	4,8 g	0,1 g
	Ballaststoffe	85,7 g	1,3 g
	Eiweiß	0,4 g	0,01 g
	Salz	0,4 g	0,01 g
Zutaten mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung	Zutaten		Inhalt 1 Portionsbeutel tägliche Verzehr- empfehlung
	Fructooligosaccharid (FOS)		1,43 g
	Lebende gefriergetrocknete Bakterien von 9 ausgewählten Bakterienstämmen		1 Milliarde vermehrungsfähige Bakterien (1,0 x 10 ⁹ KBE*)
	<i>Lactobacillus acidophilus La-14</i>		1,11 x 10 ⁸ KBE*
	<i>Lacticaseibacillus casei R0215</i>		1,11 x 10 ⁸ KBE*
	<i>Lacticaseibacillus paracasei Lpc-37</i>		1,11 x 10 ⁸ KBE*
	<i>Lactiplantibacillus plantarum Lp-115</i>		1,11 x 10 ⁸ KBE*
	<i>Lacticaseibacillus rhamnosus GG</i>		1,11 x 10 ⁸ KBE*
	<i>Ligilactobacillus salivarius Ls-33</i>		1,11 x 10 ⁸ KBE*
	<i>Bifidobacterium bifidum R0071</i>		1,11 x 10 ⁸ KBE*
	<i>Bifidobacterium lactis BI-04</i>		1,11 x 10 ⁸ KBE*
<i>Bifidobacterium longum Ro175</i>		1,11 x 10 ⁸ KBE*	
*KBE = Kolonien bildende Einheiten			

Nettofüllmenge	15 g (10 Portionsbeutel, jeweils 1,5 g)
Empfohlene maximale tägliche Verzehrmenge	1 Portionsbeutel
Allgemeine Warnhinweise	<p>Vivatlac Baby darf nicht eingenommen werden, wenn eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber einem der in Vivatlac Baby enthaltenen Stoffe (siehe Zutaten) besteht. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge (1 Portionsbeutel) darf nicht überschritten werden.</p> <p>Vivatlac Baby kann nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise dienen.</p> <p>Vivatlac Baby unterhalb von 25° C an einem trockenen Ort, für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor Licht schützen.</p>
Spezielle Warnhinweise	<p>Vivatlac Baby kann Spuren von Milch und Soja enthalten und darf daher nicht von Personen angewendet werden, die gegen Milch und Soja oder Bestandteile von Milch und Soja allergisch sind</p>
Einnahmeempfehlung	<p>1 Portionsbeutel pro Tag.</p> <p>Vivatlac Baby kann ab 0 Jahren angewendet werden.</p> <p>Erstes Lebensjahr: Inhalt des Portionsbeutels mit Flüssigkeit (lauwarmes Wasser, Milch, Tee oder Saft) mischen und mit einem Plastiklöffel geben oder vor dem Füttern ins Fläschchen geben.</p> <p>Ab dem zweiten Lebensjahr: Inhalt des Portionsbeutels entweder direkt oder gemischt mit Flüssigkeit (lauwarmes Wasser, Milch, Tee oder Saft) oder Joghurt einnehmen.</p> <p>Bei der begleitenden Anwendung mit einem Antibiotikum sollten die Einnahme von Vivatlac Baby und des Antibiotikums gleichzeitig begonnen werden. Vivatlac Baby mit einem zeitlichen Abstand von etwa 2 Stunden zum Antibiotikum einnehmen. Vivatlac Baby nach dem Ende der Antibiotikatherapie noch einige Tage weiter einnehmen.</p> <p>Bei der begleitenden Anwendung auf Reisen sollte mit der Einnahme von Vivatlac Baby schon 1-2 Tage vor Reisebeginn begonnen werden. Es empfiehlt sich den gesamten Inhalt einer Packung (reicht für 10 Tage) einzunehmen.</p> <p>Bei der Anwendung bei Schreikindern (Infantile Kolik) sollte Vivatlac Baby für 30 Tage angewendet werden^{1,2}.</p> <p>Vivatlac Baby kann sicher über längere Zeiträume eingenommen werden.</p>

Ausgewählte wissenschaftliche
Publikationen zu **Vivatlac Baby**

1. Piątek J, Bernatek M, Krauss H, Wojciechowska M, Chęcińska-Maciejewska Z, Kaczmarek P, Sommermeyer H. Effects of a Nine Strain Bacterial Synbiotic compared to Simethicone in Colicky Babies – An Open-label Randomized Study. *Beneficial Microbes* 2021; 12(3): 249-57 <https://www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/BM2020.0160>
2. Bernatek M, Piątek J, Pszczola M, Krauss H, Antczak J, Maciukajc P, Sommermeyer H. Nine Strain Bacterial Synbiotic Improves Crying and Lowers Fecal Calprotectin in colicky Babies – An Open-label Randomized Study. *Microorganisms* 2022; 10: 430. <https://www.mdpi.com/2076-2607/10/2/430/pdf>