

GEBRAUCHSINFORMATION: Information für den Anwender

Alpha-Lipon STADA® 600 mg *Filmtabletten*

Wirkstoff: DL-alpha-Liponsäure

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Alpha-Lipon STADA® jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind oder wenn Sie Erfahrungen mit einer der aufgeführten Nebenwirkungen gemacht haben, die schwerwiegend sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Alpha-Lipon STADA® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Alpha-Lipon STADA® beachten?
3. Wie ist Alpha-Lipon STADA® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Alpha-Lipon STADA® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Alpha-Lipon STADA® und wofür wird es angewendet?

Alpha-Liponsäure, der Wirkstoff in Alpha-Lipon STADA®, ist eine bei höheren Lebewesen im körpereigenen Stoffwechsel gebildete Substanz, die bestimmte Stoffwechselleistungen des Körpers beeinflusst. Darüber hinaus besitzt alpha-Liponsäure die Nervenzelle vor reaktiven Abbauprodukten schützende (antioxidative) Eigenschaften.

Alpha-Lipon STADA® wird angewendet bei

- Misempfindungen bei diabetischer Nervenschädigung (Polyneuropathie).

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Alpha-Lipon STADA® beachten?

Alpha-Lipon STADA® darf NICHT eingenommen werden – wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen alpha-Liponsäure, Gelborange S (E 110) oder einen der sonstigen Bestandteile von Alpha-Lipon STADA® sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Alpha-Lipon STADA® ist erforderlich

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Kinder: Kinder und Jugendliche sollten nicht mit Alpha-Lipon STADA® behandelt werden, da keine Erfahrungen für diese Altersgruppe vorliegen.

Bei Anwendung von Alpha-Lipon STADA® mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Es ist nicht auszuschließen, dass die gleichzeitige Anwendung von Alpha-Lipon STADA® zum Wirkungsverlust von Cisplatin (einem Krebsmittel) führt.

Alpha-Liponsäure, der Wirkstoff in Alpha-Lipon STADA®, geht leicht chemische Verbindungen mit Metallen ein (Metallchelator) und sollte daher aus grundsätzlichen Überle-

gungen nicht gleichzeitig mit Metallverbindungen (z. B. Eisenpräparate, Magnesiumpräparate, Milchprodukte aufgrund des Calciumgehaltes) gegeben werden, da es zu Wirkverlusten kommen kann. Bei Einnahme der gesamten Tagesdosis von Alpha-Lipon STADA® etwa 30 Minuten vor dem Frühstück können Eisen- und Magnesiumpräparate mittags oder abends eingenommen werden.

Die Wirkung von Mitteln gegen Zuckerkrankheit (Insulin, andere blutzuckersenkende Mittel, die eingenommen werden) kann verstärkt werden. Daher ist insbesondere zu Beginn der Therapie mit Alpha-Lipon STADA® eine engmaschige Blutzuckerkontrolle angezeigt. In Einzelfällen kann es zur Vermeidung von Unterzuckerungserscheinungen erforderlich werden, die Insulindosis bzw. die Dosis des Mittels gegen Zuckerkrankheit gemäß den Anweisungen des behandelnden Arztes zu reduzieren.

Bei Anwendung von Alpha-Lipon STADA® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Der regelmäßige Genuss von Alkohol stellt einen bedeutenden Risikofaktor für die Entstehung und das Fortschreiten von Krankheiten, die mit Schädigungen der Nerven einhergehen, dar und kann dadurch auch den Erfolg einer Behandlung mit Alpha-Lipon STADA® beeinträchtigen. Daher wird Patienten mit diabetischer Nervenschädigung (Polyneuropathie) grundsätzlich empfohlen, den Genuss von Alkohol weitestgehend zu vermeiden. Dies gilt auch für die Zeit in der Sie Alpha-Lipon STADA® nicht einnehmen.

Schwangerschaft

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte eine Behandlung mit alpha-Liponsäure nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch den Arzt erfolgen, da bisher keine Erfahrungen mit alpha-Liponsäure vorliegen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Alpha-Lipon STADA®

Gelborange S (E110) kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Alpha-Lipon STADA® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Alpha-Lipon STADA® einzunehmen?

Nehmen Sie Alpha-Lipon STADA® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen