

## ARTROSTAR COMPACT II

Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) mit Süßungsmitteln

### Inhalt:

30 Beutel mit Pulver je 15g

30 \* 2 Kapseln je 2,09 g

## ARTROSTAR COMPACT II

### Pulver (15 g)

Nährstoffe	Nährstoffe pro 100 g	Nährstoffe pro Pulverbeutel
Glucosaminhydrochlorid	7,33 g	1.100 mg
Kollagenhydrolysat	66,6 g	10 g
Nährwerte	pro 100 g	pro Portion**
physiologischer Brennwert	1486 kJ 354 kcal	223 kJ 53 kcal
Eiweiß	62,3 g	9,3 g
Kohlenhydrate	21,2 g	3,2 g
Fett	0,3 g	0,04 g

\* enthält eine Phenylalaninquelle; \*\* 15 g + 250 ml Wasser

### Zutaten:

Kollagenhydrolysat, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Glucosaminhydrochlorid (aus **Krebstieren**), Grapefruit Fruchtpulver, Aroma: Orange, Süßungsmittel Aspartam\*, Süßungsmittel Acesulfam K, Rote Bete Pulver, Farbstoff: Beta Carotin

**ARTROSTAR COMPACT II**  
**Kapseln (2x 1.045 mg)**

Nährstoffe	Nährstoffe pro 100 g	Nährstoffe pro 2 Kapseln
Vitamin C***	8,426 g	180 mg
Vitamin E (α-TE)***	2,341 g	50 mg
Vitamin A (RE)	18,725 mg	400 µg
Vitamin B6***	234 mg	5,0 mg
Vitamin D3***	468 µg	10,0 µg
Folsäure***	18,725 mg	400 µg
Biotin***	7,022 mg	150 µg
Vitamin B12***	234 µg	5,0 µg
Magnesium	9,362 g	200 mg
Zink***	468 mg	10,0 mg
Kupfer***	46.814 µg	1,0 mg
Mangan***	93,6 mg	2,0 mg
Selen	2,34 mg	50,0 µg
Molybdän***	2,34 mg	50,0 µg
Chondroitinsulfat	41,19 g	880 mg
Hyaluronsäure	2,34 g	50 mg
Nährwerte	pro 100 g	pro 2 Kapseln
physiologischer Brennwert	493 kJ 117 kcal	10,3 kJ 2,5 kcal
Eiweiß	9,9 g	0,2 g
Kohlehydrate	12,0 g	0,3 g
Fett	0,5 g	0,01 g

**Zutaten:**

Chondroitinsulfat, Magnesiumhydroxid, Kapselhülle: Gelatine, Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat , Inulin, Hyaluronsäure- Natriumsalz, Zinkcitrat, demineralisiertes Wasser, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren und Tricalciumphosphat, Kupfer-(II)-gluconat, Mangan-(II)-sulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Folsäure, Natriummolybdat, Natriumselenat, Biotin, Cyanocobalamin, Cholecalciferol, Farbstoff E171

**Wie wende ich ARTROSTR® COMPACT II an?**

ARTROSTAR® COMPACT II ist zwei Mal täglich einzunehmen:

- Morgens den Inhalt des Beutels der Morgenportion in ein Glas geben und in 200 –250 ml stillem Wasser oder Fruchtsaft auflösen. Zu oder nach dem Frühstück einnehmen.
- Abends die zwei Kapseln des Beutels für die Abendportion mit reichlich Flüssigkeit zu oder nach der Mahlzeit einnehmen.

**Was muss ich bei der Anwendung von ARTROSTAR® COMPACT II beachten?**

Wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Schalentiere sind, sollten Sie mit der Anwendung von ARTROSTAR® COMPACT II vorsichtig sein, da das darin enthaltene Glucosamin aus Schalentieren gewonnen wird.

ORMED GmbH ▪ Merzhauser Str. 112 ▪ 79100 Freiburg ▪ Deutschland  
Fax 0180 1 100 818 ▪ E-Mail: [artrostar@DJOglobal.com](mailto:artrostar@DJOglobal.com) ▪ [www.DJOglobal.de](http://www.DJOglobal.de)