

Zutaten pro Kapsel:
PMA-Zeolith® 410 mg.
Kapsel: Cellulose.

100854-03

HERGESTELLT IN ÖSTERREICH

Nettofüllmenge: **50 g e**

Anwendung:

Nehmen Sie 2 – 3 mal täglich je 3 Kapseln zu den Mahlzeiten mit einem Glas (mind. 100 ml) Wasser ein.
Die Einnahmedauer sollte mindestens 12 Wochen betragen bzw. solange die wiederkehrenden physischen Belastungen gegeben sind.

MED DARM REPAIR

Bei Leaky-Gut und Reizdarm



100 Kapseln

PANACEO



**Zur Behandlung einer eingeschränkten
Barrierefunktion der Darmwand (Leaky-Gut)
und assoziierter entzündlicher Prozesse.**

Natur-Medizinprodukt

PANACEO MED DARM-REPAIR ist ein natürliches Medizinprodukt, das sanierend auf die Magen-Darm-Wand wirkt und zudem im Magen-Darm-Trakt Schadstoffe (Blei, Cadmium, Arsen, Chrom, Nickel und Ammonium) bindet. Wissenschaftlich anerkannt ist, dass unterschiedliche, insbesondere wiederkehrende, Belastungen (physischer und psychischer Stress, Krankheiten und medikamentöse Therapien) zu einer Störung der Darmwandintegrität (Leaky-Gut) führen können. Mögliche Begleiterscheinungen von Leaky-Gut sind u.a. Magen-Darm-Beschwerden, erhöhte Leberwerte, Immunschwäche oder Erschöpfung. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder Apotheker.
(Weitere Informationen und Sicherheitshinweise siehe Innenseite.)

www.panaceo.com

Chargennummer & Ablaufdatum siehe Dosenboden



PANACEO International GmbH
Finkensteiner Straße 5
A-9585 Gödersdorf, Villach, Austria

€0477
Hier öffnen ➤

Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass der PMA-Zeolith® in der Lage ist, die Darmwandintegrität signifikant positiv zu beeinflussen – messbar über eine signifikant verringerte Konzentration des „tight junction modulators“ Zonulin bzw. des Entzündungsparameters Alpha-1 Antitrypsin.

Die Einnahme ist für Erwachsene ab 18 Jahren empfohlen.

Gebrauchsanweisung gültig ab: 2020-12-04

Sicherheitshinweise

Außer gelegentlich auftretender Obstipation (Verstopfung) sind keine Nebenwirkungen bekannt. Dies ist insbesondere bei Vorliegen von chronischer Verstopfung zu beachten.

Beenden Sie die Einnahme, wenn Sie einen unerwarteten Effekt bemerken.

Um unerwünschte Wechselwirkungen mit Medikamenten zu vermeiden, empfehlen wir eine um 2 Stunden zeitversetzte Einnahme von PANACEO MED DARM-REPAIR mit Medikamenten, wobei Medikamente, falls nicht anders verordnet, vor dem Zeolith eingenommen werden sollten.

Informieren Sie bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten Ihren Arzt, da PANACEO MED DARM-REPAIR als Nebeneffekt die körpereigene Immunaktivität erhöhen kann.

Da noch keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen (unter 18 Jahren) sowie Schwangeren und Stillenden nicht empfohlen werden.

Überschreiten Sie nicht die angegebene Tagesdosis ohne Absprache mit Ihrem Arzt. Nicht inhalieren. Außer Reichweite von Kindern unter 6 Jahren aufbewahren. Die Dose nach der Verwendung immer schließen.



Ständige Kontrollen garantieren die hohe Qualität und Wirksamkeit als Medizinprodukt gemäß der europäischen Richtlinie 93/42/EWG.