Gebrauchsinformation: Information für Anwender

NUROFEN®

400 mg Weichkapseln

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 40 kg Körpergewicht (12 Jahre und älter)

Ibuprofen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser fühlen oder wenn Sie sich nach 3 Tagen bei Kindern und Jugendlichen.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Nurofen beachten?
- allergisch gegen Ibuprofen, Ponceau 4R (E124) oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile von Nurofen sind.
- Nasenschleimhautschwellungen, Schwellungen oder Nesselsucht nach der Einnahme von Acetylsalicylsäure oder anderen NSAR reagiert haben.
- an bestehenden oder in der Vergangenheit wiederholt aufgetretenen Magen/Zwölffingerdarm-Geschwüren (peptische Ulcera) oder Blutungen leiden.
- an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa leiden.
- an einer schweren Herzschwäche leiden.
- an ungeklärten Blutbildungsstörungen leiden.
- an einer schweren Nierenfunktionsstörung oder schwerer Herzinsuffizienz leiden.
- sich in den letzten drei Monaten der Schwangerschaft befinden (s. Abschnitt „Schwangerschaft und Stillzeit").
- stark dehydriert sind (hervorgerufen z.B. durch Erbrechen, Durchfall oder unzureichende Flüssigkeitszufuhr).
- Nurofen darf nicht zusammen mit anderen Präparaten eingenommen werden, die Ibuprofen enthalten. Lesen Sie dazu auch die Packungsbeilage auf weiteren Medikamenten, die Sie einnehmen.

Nurofen darf nicht angewendet werden,
- wenn Sie eine Infektion haben – siehe „Sie haben eine Infektion" unter „Weitere Informationen".
- bei bestimmten angeborenen Blutbildungsstörungen (z.B. akute intermittierende Porphyrie).
- bei eingeschränkter Leberfunktion.
- bei eingeschränkter Nierenfunktion.
- wenn Sie an Asthma oder allergischen Erkrankungen leiden oder gelitten haben, da es zu Kurzatmigkeit kommen kann.
- bei Patienten, die an Heuschnupfen, Nasenpolypen oder chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen leiden, da bei Ihnen ein erhöhtes Risiko für das Auftreten allergischer Reaktionen besteht. Diese können sich als Asthmaanfälle, Quinckeödem oder Nesselsucht äußern.
- wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die das Risiko für Geschwüre oder Blutungen erhöhen können, wie z.B. orale Kortikosteroide, Blutgerinnungshemmende Mittel (wie z.B. Warfarin), selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder andere zur Behandlung von depressiven Verstimmungen eingesetzt werden, oder
- wenn Sie an Asthma oder allergischen Erkrankungen leiden oder gelitten haben, da es zu Kurzatmigkeit kommen kann.
- bei Patienten, die an Heuschnupfen, Nasenpolypen oder chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen leiden, da bei Ihnen ein erhöhtes Risiko für das Auftreten allergischer Reaktionen besteht. Diese können sich als Asthmaanfälle, Quinckeödem oder Nesselsucht äußern.
- wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die das Risiko für Geschwüre oder Blutungen erhöhen können, wie z.B. orale Kortikosteroide, blutgerinnungshemmende Mittel (wie z.B. Warfarin), selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder andere zur Behandlung von depressiven Verstimmungen eingesetzt werden, oder
- wenn Sie an Asthma leiden, da dies Ihr Risiko für Geschwüre oder Blutungen erhöhen kann.
- wenn Sie eine Infektion haben – siehe „Sie haben eine Infektion" unter „Weitere Informationen".