

Sanum

Bovisan® D5 Zäpfchen



Darreichungsform:	Zäpfchen zur rektalen Anwendung
Präparatgruppe:	Bakterienpräparate
Wirkstoff:	Mycobacterium bovis (BCG) e muribus cellulae (lyophil., steril.) Trit. D5
Zusammensetzung:	1 Zäpfchen enthält: Mycobacterium bovis (BCG) e muribus cellulae (lyophil., steril.) Trit. D5 0,2 g (HAB, Vorschrift 6). Sonstige Bestandteile: Hartfett.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	1-3x wöchentlich 1 Zäpfchen vor dem Schlafengehen in den After einführen. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Bovisan® D5 abgesetzt werden.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Bovisan® D5 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Mycobacterium bovis ausgelöst werden.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei: ● Autoimmunerkrankungen ● Kindern unter 12 Jahren ● Schwangeren und Stillenden ● bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Mycobacterium bovis.
Unerwünschte Reaktionen:	

Wechselwirkungen:	Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Bovisan® D5 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.
Vorsichtsmaßnahmen:	Keine bekannt.
Hinweis:	Enthält Lactose.
Dauer der Behandlung:	
Handelsform:	Packung mit 10 Zäpfchen, Bündelpackung 10x 10 Zäpfchen.
Stand vom:	106
