

Homöopathisches Arzneimittel

Zeel[®]
ad us. vet.

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Für Tiere
Pferd, Hund, Katze, Kleinnager

Zusammensetzung:

1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält: Wirkstoffe: Cartilago suis Dil. D6 (HAB, Vorschrift 42a) 5 mg, Funiculus umbilicalis suis Dil. D6 (HAB, Vorschrift 42a) 5 mg, Embryo totalis suis Dil. D6 (HAB, Vorschrift 42a) 5 mg, Placenta totalis suis Dil. D6 (HAB, Vorschrift 42a) 5 mg, Solanum dulcamara Dil. D3 25 mg, Symphytum officinale Dil. D6 25 mg, Nadidum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a) 5 mg, Coenzym A Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a) 5 mg, Sanguinaria canadensis Dil. D4 7,5 mg, Arnica montana Dil. D3 50 mg, Sulfur Dil. D6 9 mg, Natrium diethyloxalaceticum Dil. D8 aquos. (HAB, Vorschrift 8b) 5 mg, Acidum thiocticum Dil. D8 aquos. (HAB, Vorschrift 8b) 5 mg, Rhus toxicodendron Dil. D2 25 mg. Die Wirkstoffe 1 bis 11 werden über die letzten 2 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40 a gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Telefon: 07221 501-00
Telefax: 07221 501-210
E-Mail: info@heel.de

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Wechselwirkungen:

Keine bekannt. Wenn Zeel ad us. vet. gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie Ihren Tierarzt.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten:

Pferd, Hund, Katze, Kleinnager

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, Zeel ad us. vet. subkutan injizieren. Entsprechend der Tierart beträgt die Einzeldosis:

- Pferd: 5 ml
- Großer Hund: 3-4 ml
- Mittlerer Hund: 2 ml
- Kleiner Hund: 1-2 ml
- Katze: 1-2 ml
- Kleinnager: 0,25-0,5 ml.

Bei chronischen Erkrankungen kann zur Langzeitbehandlung die Einzeldosis jeweils im Abstand von 4 Tagen wiederholt werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die richtige Anwendung:

Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. Bei Überempfindlichkeit gegen Korbblütler sollte Zeel ad us. vet. mit Vorsicht eingesetzt werden. Eine Injektion

dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen.

Wartezeit:

- Pferd: Essbare Gewebe: 0 Tage
- Milch: 0 Tage

Besondere Lagerungshinweise:

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich. Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

Packungsgrößen:


Flüssige Verdünnung zur Injektion. 5 und 50 Ampullen zu 5 ml

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr. 17807.00.00


Stand der Information:

Juni 2014



Farbiger Punkt nach oben!

Im Ampullenspieß befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen lassen.



Farbiger Punkt nach oben!

Ampullenspieß nach hinten ziehend abbrechen.

Ampulle vorsichtig öffnen! Bitte befolgen Sie die Anweisungen.

