

Zutaten pro 100 g Pulver:  
PMA-Zeolith® 100 g.

101198-01

Nettofüllmenge: **200 g e**

**HERGESTELLT IN ÖSTERREICH**

**Anwendung:**

Nehmen Sie 2 – 3 mal täglich je einen gestrichenen Portionslöffel zu den Mahlzeiten aufgerührt in einem Glas (mind. 100 ml) Wasser ein.

Die Einnahmedauer sollte mindestens 12 Wochen betragen bzw. solange die wiederkehrenden physischen Belastungen gegeben sind.



**PANACEO** International GmbH  
Finkensteiner Straße 5  
A-9585 Gödersdorf, Villach, Austria

# MED DARM REPAIR

Bei Leaky-Gut und Reizdarm



200 g Pulver

**PANACEO**



**Zur Behandlung einer eingeschränkten Barrierefunktion der Darmwand (Leaky-Gut) und assoziierter entzündlicher Prozesse.**

**Natur-Medizinprodukt**

PANACEO MED DARM-REPAIR ist ein natürliches Medizinprodukt, das sanierend auf die Magen-Darm-Wand wirkt und zudem im Magen-Darm-Trakt Schadstoffe (Blei, Cadmium, Arsen, Chrom, Nickel und Ammonium) bindet. Wissenschaftlich anerkannt ist, dass unterschiedliche, insbesondere wiederkehrende, Belastungen (physischer und psychischer Stress, Krankheiten und medikamentöse Therapien) zu einer Störung der Darmwandintegrität (Leaky-Gut) führen können. Mögliche Begleiterscheinungen von Leaky-Gut sind u. a. Magen-Darm-Beschwerden, erhöhte Leberwerte, Immunschwäche oder Erschöpfung. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder Apotheker.

(Weitere Informationen und Sicherheitshinweise siehe Innenseite).

**[www.panaceo.com](http://www.panaceo.com)**

Chargennummer & Ablaufdatum siehe Dosenboden



**CE 0477**  
Hier öffnen ▶

Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass der PMA-Zeolith® in der Lage ist, die Darmwandintegrität signifikant positiv zu beeinflussen – messbar über eine signifikant verringerte Konzentration des „tight junction modulators“ Zonulin bzw. des Entzündungsparameters Alpha-1 Antitrypsin.

Die Einnahme ist für Erwachsene ab 18 Jahren empfohlen.

Gebrauchsanweisung gültig ab 2021-02

## Sicherheitshinweise

Außer gelegentlich auftretender Obstipation (Verstopfung) sind keine Nebenwirkungen bekannt. Dies ist insbesondere bei Vorliegen von chronischer Verstopfung zu beachten.

Beenden Sie die Einnahme, wenn Sie einen unerwarteten Effekt bemerken.

Um unerwünschte Wechselwirkungen mit Medikamenten zu vermeiden, empfehlen wir eine um 2 Stunden zeitversetzte Einnahme von PANACEO MED DARM-REPAIR mit Medikamenten, wobei Medikamente, falls nicht anders verordnet, vor dem Zeolith eingenommen werden sollten.

Informieren Sie bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten Ihren Arzt, da PANACEO MED DARM-REPAIR als Nebeneffekt die körpereigene Immunaktivität erhöhen kann.

Da noch keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei

Kindern und Jugendlichen (unter 18 Jahren) sowie Schwangeren und Stillenden nicht empfohlen werden.

Überschreiten Sie nicht die angegebene Tagesdosis ohne Absprache mit Ihrem Arzt. Nicht inhalieren. Außer Reichweite von Kindern unter 6 Jahren aufbewahren. Die Dose nach der Verwendung immer schließen.



Ständige Kontrollen garantieren die hohe Qualität und Wirksamkeit als Medizinprodukt gemäß der europäischen Richtlinie 93/42/EWG.