

Liebe Patientin, lieber Patient !

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation**Fuco-cyl® L****Ho-Len-Complex®****Zusammensetzung:**

10 g (entsprechend 11 ml) Mischung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Apocynum	Dil. D1	0,125 g
Fucus vesiculosus (HAB 34)	Dil. D2	1,25 g
[HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)		
Graphites	Dil. D8	1,25 g
Hydrastis canadensis	Dil. D4	1,25 g
Natrium chloratum	Dil. D6	1,25 g
Phosphorus	Dil. D6	1,25 g
Plumbum metallicum	Dil. D8	1,25 g
Taraxacum	Dil. D2	1,25 g

Sonstiger Bestandteil:

Ethanol 62% (m/m)

1 ml entspricht 21 Tropfen

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackung mit 30 ml / 50 ml / 100 ml Mischung

Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharma Liebermann GmbH

Hauptstr. 27

D- 89423 Gundelfingen/Donau

Telefon: (09073)95893-0

Telefax: (09073)95893-55

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Fuco-cyl® L Ho-Len-Complex® nicht anwenden?

Fuco-cyl® L Ho-Len-Complex® ist bei bekannter Überempfindlichkeit gegen „Taraxacum“ (Löwenzahn) oder andere Korbblütler nicht anzuwenden. Nicht anwenden bei Jodüberempfindlichkeit sowie bei Alkoholkranken.

Wann dürfen Sie Fuco-cyl® L Ho-Len-Complex® erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Fuco-cyl® L Ho-Len-Complex® nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Bei Leberkranken ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Warnhinweis:

Fuco-cyl® L Ho-Len-Complex® enthält 60 Vol.% Alkohol!

Wechselwirkungen:

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Fuco-cyl® L Ho-Len-Complex® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da sonst Fuco-cyl® L Ho-Len-Complex® nicht richtig wirken kann !

Wieviel und wie oft sollten Sie Fuco-cyl® L Ho-Len-Complex® anwenden?

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Die Einnahme sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Wie und wann sollten Sie Fuco-cyl® L Ho-Len-Complex® anwenden?

Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser einnehmen und einige Zeit im Mund belassen.

Wie lange sollten Sie Fuco-cyl® L Ho-Len-Complex® anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Fuco-cyl® L Ho-Len-Complex® auftreten?

Eine Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden. In sehr seltenen Fällen kann es zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfällen, Schwindel, Blutdruckerhöhung oder Schwankungen des Blutzuckerspiegels kommen. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Etikett sowie auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: Juni 2007

Reg.-Nr.: 2522777.00.00