



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342  
<http://www.reckeweg.de>

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Multo-Gastreu® R 12 jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Multo-Gastreu® R 12 und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Multo-Gastreu® R 12 beachten?
3. Wie ist Multo-Gastreu® R 12 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Multo-Gastreu® R 12 aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## Multo-Gastreu® R 12

Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen

### 1. WAS IST MULTO-GASTREU® R 12 UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Multo-Gastreu® R 12 ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON MULTO-GASTREU® R 12 BEACHTEN?

**Multo-Gastreu® R 12 darf nicht angewendet werden:**

bei bekannter Überempfindlichkeit gegen „Arnica montana“ (Arnika) oder andere Korbblütler.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Multo-Gastreu® R 12 ist erforderlich:**

- bei Kindern:

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

- in Schwangerschaft und Stillzeit:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Bei Anwendung von Multo-Gastreu® R 12 mit anderen Arzneimitteln:**

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Anwendung von Multo-Gastreu® R 12 zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wichtige Warnhinweise über bestimmte sonstige Bestandteile von Multo-Gastreu® R 12:**

Dieses Arzneimittel enthält 50 Vol.-% Alkohol.

### 3. WIE IST MULTO-GASTREU® R 12 ANZUWENDEN?

Nehmen Sie Multo-Gastreu® R 12 immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: Erwachsene und Heranwachsende ab dem 12. Lebensjahr nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen ein. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

#### **Dauer der Anwendung:**

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bisher sind für Multo-Gastreu® R 12 keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. WIE IST MULTO-GASTREU® R 12 AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### **Aufbewahrungsbedingungen :**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

### 6. WEITERE INFORMATIONEN

#### **Das Arzneimittel Multo-Gastreu® R 12 enthält:**

10 g (entsprechend 10,8 ml) enthalten: Wirkstoffe: Barium chloratum Dil. D4 1g, Conium Dil. D5 1g, Glonoinum Dil. D6 1g, Arnica Dil. D3 1g, Phosphorus Dil. D5 1g. Die Wirkstoffe 1 bis 3 werden über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert. Sonstiger Bestandteil: Ethanol 30% (m/m)  
1 ml entspricht 19 Tropfen.

#### **Darreichungsform und Packungsgrößen:**

Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen in Flaschen mit 22 ml und 50 ml.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim

Tel.: 06251/1097-0 · Fax: 06251/3342 · [www.reckeweg.de](http://www.reckeweg.de)

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2013.**

---

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2522786.00.00

Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.