



PURALID
PURALID
PURALID
PURALID
PURALID
PURALID

Anwendungshinweise

Puralid® Lipogel zur Behandlung von Symptomen bei Blepharitis oder Blepharokonjunktivitis

Was ist Puralid® Lipogel?

Puralid® Lipogel ist ein ophthalmisches Präparat, das die Augenlider und die Augenkontur beruhigt, reinigt und lindert. Es enthält Liposome, Teebaumöl, Vitamin A, Xanthangummi, Ferulasäure, Vitamin E TPGS und Alpha- Bisabolol.

Liposome bestehen aus einer Phospholipid-Doppelschicht. Sie sind bekannt für ihre beruhigende und lindernde Wirkung sowie für ihre Fähigkeit, die Wirkstoffe effizient abzugeben.

Teebaumöl, gewonnen aus *Melaleuca alternifolia*, ist bekannt für seine antimikrobielle Wirkung.

Vitamin A stärkt und pflegt die Haut durch Regulierung der Epithelfunktion. Zudem schützt dieses Antioxidans zusammen mit

Xanthangummi, **Ferulasäure** und **Vitamin E TPGS** die Lidoberfläche in Synergie mit Liposomen vor der oxidativen Wirkung freier Radikale und UV-Strahlen.

Alpha-Bisabolol ist der Hauptinhaltsstoff von ätherischem Kamillenöl. Es wirkt beruhigend und mildert Rötungen und Entzündungen selbst bei sehr empfindlicher Haut. Es zeichnet sich durch eine hohe Hautverträglichkeit aus.

In welchen Fällen wird Puralid® Lipogel angewendet?

Puralid® Lipogel wird zum Aufweichen und Entfernen von Verkrustungen auf den Augenlidern bei entzündlichen Erkrankungen wie Blepharitis (Lidrandentzündung) oder Blepharokonjunktivitis angewendet.

Wie oft sollte ich Puralid® Lipogel anwenden?

Das Produkt zweimal täglich anwenden oder nach Anweisung des Arztes.

Wie wende ich Puralid® Lipogel an?

Halten Sie die Flasche vor dem ersten Gebrauch aufrecht und drücken Sie die Pumpe dreimal bis fünfmal fest, um das Dosiersystem zu beladen, bis das Gel abgegeben wird.


1. Die Hände gründlich waschen.




2. Eine kleine Menge Puralid® Lipogel auf die Fingerspitzen geben.



3. Sanft mit kreisenden Bewegungen auf den Augenlidern verteilen.



4. Einige Minuten einwirken lassen. Rückstände mit einem sauberen Tuch oder Wattepad abwischen.



Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt anwenden.

Die Packungsbeilage aufbewahren; möglicherweise müssen Sie diese später noch einmal einsehen.

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen

FALLS SIE NEBENWIRKUNGEN FESTSTELLEN SOLLTEN, INFORMIEREN SIE BITTE IHREN ARZT ODER APOTHEKER.

Aufbewahrungshinweise für Puralid® Lipogel

- Nicht über 25 °C lagern
- Nicht einfrieren
- Vor Hitze, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren

Zusammensetzung:

Phospholipide S80 (NIOLip), Bisabolol, Teebaumöl, Vitamin A Palmitat, Vitamin E TPGS, Ferulasäure, Xanthangummi, EDTA-Dinatrium-Dihydrat, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Natrium-Hydroxymethylglycinat, Zitronensäure-Monohydrat, Tri-Kaliumcitrat-Monohydrat, Destilliertes Wasser.

Warnhinweise

- Nur für die äußerliche Anwendung
- Bei hypersensiblen Reaktionen die Anwendung sofort einstellen
- Das Produkt nicht nach dem auf der Packung verzeichneten Verfallsdatum anwenden
- Bei Beschädigung der Verpackung vor der ersten Anwendung nicht mehr verwenden
- **Für 15ml Flasche:** Das Produkt innerhalb von 8 Wochen nach der ersten Anwendung verwenden
- **Für 1ml Einzeldosisbehältnis:** Das Produkt innerhalb von 24 Stunden nach der ersten Anwendung verwenden

Verfügbare Packungsgröße:

Verkaufsverpackung: 1 x 15 ml Flasche
Musterpackung: Streifen mit fünf 1ml Einzeldosisbehältnissen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihr Santen-Büro: www.santen.eu

Vertrieb:

Santen GmbH
Erika-Mann-Straße 21
80636 München
Deutschland
www.santen.de

Santen

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2020.



OFFHEALTH SpA, Via G. Paisiello 10, 50144 Florenz, Italien

Medizinprodukte-Hersteller	Herstellungsdatum	Lotnummer	Verwendbar bis	Siehe Gebrauchsanweisung	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist	Vor Feuchtigkeit schützen	Nicht über 25 °C lagern	Vor Sonnenlicht schützen



PURALID
PURALID
PURALID
PURALID
PURALID
PURALID

Kullanım Talimatları

Blefarit ya da Blefarokonjunktivit semptomlarının yatıştırılmasında kullanım için **Puralid® Lipogel**

Puralid® Lipogel nedir?

Puralid® Lipogel, göz kapaklarını ve perioküler bölgeyi yatıştıran ve temizleyen oftalmik bir üründür. Lipozomlar, Çay Ağacı Yağı, A Vitamini, Ksantan sakızı, Ferulik asit, E Vitamini TPGS ve Alfa Bisabolol içerir.

Lipozomlar, bir çift fosfolipit katmanından oluşur ve yatıştırıcı ve yumuşatıcı özelliklerinin yanı sıra etkin maddenin iletiminde etkili olmalarıyla bilinir.

Çay Ağacı Yağı, Melaleuca alternifolia'dan ekstrakt edilir ve antimikrobiyal özellikleri ile bilinir.

A Vitamini epitelyal fonksiyonu düzenleyerek cildi güçlendirir ve korur. Ayrıca bir antioksidandır ve **Ksantan Sakızı**, **Ferulik asit** ve **E Vitamini TPGS** ile birlikte, lipozomlarla sinerji içinde hareket ederek göz kapağı yüzeyini serbest radikallerin ve UV ışınlarının oksitleyici etkisinden korur.

Alfa Bisabolol papatya yağının ana bileşenidir. Yatıştırıcı özelliklere sahiptir ve özellikle hassas ciltlerde bile kızamıklığı ve inflamasyonu azaltır. İyi cilt tolere edilebilirliği ile karakterize edilir.

Puralid® Lipogel ne için kullanılır?

Puralid® Lipogel, blefarit ya da blefarokonjunktivit gibi inflamatuvar olaylarda göz kapağı üzerinde oluşan çapakları yumuşatmak ve temizlemek için kullanılır.

Puralid® Lipogel ne sıklıkta kullanılmalıdır?

Ürünü günde iki kez ya da doktorunuz öneriyorsa daha fazla kullanın.

Puralid® Lipogel'in Kullanımı

İlk kullanımdan önce şişeyi dik tutun ve jeli verene kadar dağıtım sistemi pompasını 3-5 kez sıkın.


1. Ellerinizi dikkatle yıkayın.



2. Az miktarda Puralid® Lipogel'i parmak uçlarınıza sıkın.



3. Göz kapaklarının üzerine dairesel hareketlerle nazikçe yayın.



4. Birkaç dakika bırakın. Çapak varsa temiz bir bezle ya da pamuk ped ile alın.



Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kitapçığı dikkatle okuyun.

Bu kitapçığı saklayın; yeniden okumanız gerekebilir.

Başka bir sorunuz varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışın.

Olası yan etkileri nelerdir?

BU KİTAPÇIKTA LİSTELENMEYEN BİR YAN ETKİ GÖRDÜĞÜNÜZDE LÜTFEN DOKTORUNUZU YA DA ECZACINIZI BİLGİLENDİRİN.

Puralid® Lipogel'in saklanması

- 25 ° C'nin üzerinde saklamayın
- Dondurmayın
- Isı, nem ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun
- Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutun

Kompozisyon:

Fosfolipitler S80 (NIOlip), Bisabolol, Çay Ağacı Yağı, A Vitamini Palmitat, E Vitamini TPGS, Ferulik Asit, Ksantan sakızı, EDTA disodyum dihidrat, Potasyum Sorbat, Sodyum Benzoat, Sodyum Hidroksimetilglicinat, Sitrik asit monohidrat, Potasyum Sitrat Tribazik Monohidrat, Saf su.

Uyarılar

- Yalnızca harici kullanımlı
- Herhangi bir içeriğe karşı aşırı hassasiyet görürseniz ürünü kullanmayın
- Paket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayın
- Ambalajı hasarlıysa ürünü kullanmayın
- Ürünü açtıktan sonra 8 hafta içinde kullanın (15 ml şişe)
- Ürünü açtıktan sonra 24 saat içinde kullanın (1 ml mini kap)

Dağıtım:

Santen GmbH
Erika-Mann-Straße 21
80636 Münih
Almanya

Sunumlar:

Ticari - 15 ml şişe
Numune - 1 ml'lik 5 mini kap şeridi
Diğer bilgiler için lütfen doktorunuz ya da www.santen.eu adresinden yerel Santen Ofisi ile görüşün

Santen

Bu kitapçık Aralık 2020'de valide edilmiştir.



OFFHEALTH SpA, Via G. Paisiello 10,
50144 Floransa, İtalya

Tıbbi Cihaz Üreticisi	Üretim tarihi	Lot numarası	Son kullanma tarihi	Kullanım talimatlarına bakın	Ambalaj hasarlıysa kullanmayın	Nemden koruyun	25 ° C'nin üzerinde saklamayın	Güneş ışığından koruyun