

Softa-Man®

Langjährig bewährte Händedesinfektion

der Klassiker

EIGENSCHAFTEN

- Pflegendes Händedesinfektionsmittel
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Angereichert mit hochwertigen Pflegesubstanzen wie Panthenol, Bisabolol und Allantoin
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze
- Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren)
- Farbstofffrei
- Allergenarm parfümiert
- Dermatologisch getestet

DGHM-/VAH-, RKI-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste



WIRKSPEKTRUM / EINWIRKZEITEN (EZ)

EINSATZGEBIET	NORM	EZ	LIEFERFORM	VE	Art.-Nr.	PZN
hygienische Händedesinfektion	EN 1500	30 Sek.*	100 ml-Flasche	20	3865150	08504958
chirurgische Händedesinfektion	EN 12791	60 Sek.	500 ml-Spenderflasche	20	3865088	08504964
bakterizid	EN 13727	15 Sek.	1000 ml-Spenderflasche	10	3865096	08504970
MRSA	EN 13727	15 Sek.	5 Liter-Kanister	1	3865290	02744302
levurozid	EN 13624	15 Sek.	Dosierpumpe für 500 ml-Spenderflasche	1	3908380	05486622
tuberkulozid**	EN 14348	15 Sek.	Dosierpumpe für 1000 ml-Spenderflasche	1	3908381	05486651
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	DVV/RKI	15 Sek.	Wandspender plus ELS für 500 ml-Spenderflasche	1	1418894	04706872
begrenzt viruzid PLUS	DVV/RKI	30 Sek.	Wandspender plus TLS für 1000 ml-Spenderflasche	1	1418895	04706889
Influenza A-Viren	DVV/RKI	15 Sek.				
Herpes simplex	DVV/RKI	15 Sek.				
Rotaviren	DVV/RKI	15 Sek.				
Noroviren ***	DVV/RKI	30 Sek.				
Adenoviren	DVV/RKI	30 Sek.				

* Gem. EN 1500 wird eine Wirksamkeit bereits innerhalb von 15 Sek. erreicht. Auf Grund derzeitiger Empfehlungen soll jedoch eine Einwirkzeit für die hygienische Händedesinfektion von 30 Sek. eingehalten werden.

** Nach Vorgabe des RKI soll bei der Kontamination mit Mykobakterien die hygienische Händedesinfektion 2-mal durchgeführt werden.

*** Surrogatvirus MNV

Softa-Man®

Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g
Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Diisopropyladipat, Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat (Ph.Eur.), Dexpantenol, (+/-)alpha-Bisabolol, Geruchsstoffe (enthalten Limonen und Linalool), Allantoin.

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile.

Nebenwirkungen: Kontaktallergie. Hautirritationen wie Rötung und Brennen insbesondere bei häufiger Anwendung.

Warnhinweise: Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung.

21-22°C Flammpunkt nach DIN 51 755

Stand der Information: 02/2012

Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen