

60 Kapseln
Nahrungsergänzungsmittel

Arthroblock™ Forte

SLOGAN: EINWANDFREIE FUNKTION DER GELENKE

Description

Nahrungsergänzungsmittel in Kapseln mit Ingwer-Extrakt, Boswellia serrata Extrakt, Nahrungsergänzungsmittel Nahrungsergänzungsmittel Glucosamin, Chondroitin, Hyaluronsäure, Vitamin C und Mangan. Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Knochen und Knorpel bei. Mangan trägt zur Erhaltung normaler Knochen und zu einer normalen Bindegewebsbildung bei.

Composition

Nutritional information	1 Kapsel	2 Kapseln
Glucosaminsulfat 2KCl davon Glucosaminsulfat	500 mg 375 mg	1000 mg 750 mg
Chondroitinsulfat	100 mg	200 mg
Hyaluronsäure	25 mg	50 mg
<i>Boswellia serrata</i> Extrakt 50 (60% Boswelliasäuren)	50 mg	100 mg
Ingwer-Extrakt (5% Gingerol)	50 mg	100 mg
Vitamin C	30 mg (37,5%*)	60 mg (75%*)
Mangan (aus Aminosäurechelate Albion™)	1 mg (50%*)	2 mg (100%*)

* NRV – Nährstoffbezugswert nach LMIV.

Ingredients: Glucosaminsulfat 2KCl (aus Krebstieren), Chondroitinsulfat, Harzextrakt von *Boswellia serrata* (*Boswellia serrata* Roxb. ex Colebr.), Ingwer-Rhizom-Extrakt (*Zingiber officinale* Roscoe), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Natriumhyaluronat, Mangan-Bisglycinat, Füllstoff Cellulose; Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Kapsel (Gelatine, Farbstoff E 171).

Use

Intended use: Das Produkt wird besonders körperlich aktiven und erwachsenen Menschen empfohlen.

Dosage

Recommended daily dose: 1-2 Mal täglich eine Kapsel zu einer Mahlzeit oder die vom Arzt empfohlene Dosis zu sich nehmen. Es wird empfohlen, dass Produkte in 2-3 Monatskuren mit einer darauf folgenden Pause von 1-2 Monaten einzunehmen.

Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden.

Warning: Hinweis: für Kinder, Jugendliche und schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet. Bei Diabetes und Asthma, bei Personen mit einer gestörten Glukosetoleranz, mit einem Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie auch bei der Einnahme von antithrombotischen Mitteln, ist es ratsam, den Arzt zu konsultieren. Bei Überempfindlichkeit gegen einen Bestandteil des Mittels sollte es nicht eingenommen werden.

Storage conditions: Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.