

**Liebe Patientin, lieber Patient !**

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt oder Apotheker.

**Gebrauchsinformation****H&S® Durchfalltee****Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Pflanzliches Arzneimittel bei Durchfall.

**Anwendungsgebiete:**

Unspezifische, akute Durchfallerkrankungen.

**Gegenanzeigen:**

Wann dürfen Sie H&S® Durchfalltee nicht anwenden ?

Keine bekannt.

**Hinweis:**

Bei Durchfällen, die länger als 2 Tage andauern oder mit Blutbeimengungen oder Temperaturerhöhungen einhergehen, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Durchfallerkrankungen bei Säuglingen und Kleinkindern erfordern grundsätzlich die Rücksprache mit einem Arzt.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden ?

Bei Durchfallerkrankungen muß auf Ersatz von Flüssigkeit und Salzen (Elektrolyten) als wichtigste therapeutische Maßnahme geachtet werden. Aus der verbreiteten Anwendung von Brombeerblättern als Arzneimittel oder in Lebensmitteln haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken ergeben. Zur Anwendung von Brombeerblättern in Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jahren liegen jedoch keine ausreichenden Untersuchungen vor. Die Anwendung von Brombeerblättern wird daher nicht empfohlen.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von H&S® Durchfalltee ?

Keine bekannt.

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt H&S® Durchfalltee nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da H&S® Durchfalltee sonst nicht richtig wirken kann !

Wieviel und wie oft sollten Sie H&S® Durchfalltee einnehmen ?

3 mal täglich 1 Glas/Tasse frisch bereitetem Tee zwischen den Mahlzeiten trinken.

Wie und wann sollten Sie H&S® Durchfalltee einnehmen ?

**1 Filterbeutel für 1 Glas/Tasse. Mit kochendem Wasser übergießen und bedeckt etwa 10 Minuten ziehen lassen. Filterbeutel herausnehmen und schwach ausdrücken. Bei Durchfallerkrankungen den frisch zubereiteten Tee zwischen den Mahlzeiten trinken.**

Sollten Sie Fragen zur Dosierung oder Anwendung haben, befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**Nebenwirkungen:**

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von H&S® Durchfalltee auftreten ?

Bisher keine bekannt.

**Meldung von Nebenwirkungen:**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Zusammensetzung:** 100 g Tee enthalten

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Brombeerblätter	Rubi fruticosi folium	100 g
-----------------	-----------------------	-------

**Darreichungsform und Inhalt:** Originalpackung mit:

20 Filterbeutel à 1,5 g Arzneitee zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.

**Stand der Information:** 11.2014**H&S® Durchfalltee**

**Zul.-Nr.:** 1449.99.99

**OP:** 20 Filterbeutel à 1,5 g, Gesamt-Füllgewicht 30 g

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

H&S Tee-Gesellschaft mbH & Co. · Im Haidach 1 · D-88079 Kressbronn/Bodensee · [www.Arzneitee.de](http://www.Arzneitee.de)

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum dieser Packung ist rechts unten aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum !

**Aufbewahrungshinweise:**

In der Originalpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen. Nicht über 25°C aufbewahren.

Arzneimittel – Für Kinder unzugänglich aufbewahren.