

# Sanum

## Exmykehl® D3 Zäpfchen



Darreichungsform:	Zäpfchen zur rektalen Anwendung
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Candida albicans e volumine mycelii D3, Candida parapsilosis e volumine mycelii D3, Penicillium roquefortii e volumine mycelii D3
Zusammensetzung:	1 Zäpfchen enthält: 0,067 g Candida albicans e volumine mycelii (lyophil., steril) Trit. D3 (HAB, Vorschrift 6). 0,067 g Candida parapsilosis e volumine mycelii (lyophil., steril) Trit. D3 (HAB, Vorschrift 6). 0,067 g Penicillium roquefortii e volumine mycelii (lyophil., steril) Trit. D3 (HAB, Vorschrift 6). Sonstige Bestandteile: Hartfett
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren führen einmal täglich 1 Zäpfchen vor dem Schlafengehen in den After ein.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Exmykehl® D3 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen die Bestandteile Candida albicans, Candida parapsilosis und Penicillium roquefortii ausgelöst werden.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei &#9679; bekannter Überempfindlichkeit gegenüber

Schimmelpilzen (Candida albicans, Candida parapsilosis und Penicillium roquefortii)

• Autoimmunerkrankungen

• Kindern unter 12 Jahren

• Schwangeren und Stillenden

---

Unerwünschte Reaktionen:

---

Wechselwirkungen:

Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Exmykehl® D3 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

---

Vorsichtsmaßnahmen:

Keine bekannt.

---

Hinweis:

Enthält Lactose.

---

Dauer der Behandlung:

---

Handelsform:

Packung mit 10 Zäpfchen  
Bündelpackung mit 10x 10 Zäpfchen.

---

Stand vom:

905