

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

- Lenalidomid HEXAL 2,5 mg Hartkapseln**
- Lenalidomid HEXAL 5 mg Hartkapseln**
- Lenalidomid HEXAL 7,5 mg Hartkapseln**
- Lenalidomid HEXAL 10 mg Hartkapseln**
- Lenalidomid HEXAL 15 mg Hartkapseln**
- Lenalidomid HEXAL 20 mg Hartkapseln**
- Lenalidomid HEXAL 25 mg Hartkapseln**

Lenalidomid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Wenn Sie Fragen zum Packungsbeilage haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt. Vielleicht möchten Sie dies später nochmals lesen.
• Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
• Dieses Arzneimittel enthält einen Wirkstoff, der verschluckt werden kann, wenn Sie nicht auf die Waage achten. Es kann anderen Menschen schaden, wenn Sie dieses Arzneimittel an andere weitergeben.
• Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. (Siehe Abschnitt 4.)

Was in dieser Packungsbeilage steht

- 1. Was ist Lenalidomid HEXAL und wofür wird es angewendet?
- 2. Was sollte Sie vor der Einnahme von Lenalidomid HEXAL beachten?
- 3. Wie wird Lenalidomid HEXAL eingenommen?
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- 5. Wie ist Lenalidomid HEXAL aufzubewahren?
- 6. Was ist in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist Lenalidomid HEXAL und wofür wird es angewendet?

Was ist Lenalidomid HEXAL?
Lenalidomid HEXAL enthält den Wirkstoff lenalidomid. Dieses Arzneimittel gehört zur Klasse der Immunmodulatoren, die die Funktionsweise des Immunsystems beeinflussen.

Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?

- Lenalidomid HEXAL wird angewendet bei Erwachsenen mit:
 - Myelodysplastischen Syndrom
 - Myelofibrose
 - Polypolämyelom

Polypolämyelom

Ein multiples Myelom ist eine Krebsart, die bestimmte weiße Blutkörperchen (Antikörper) überproduziert. Diese Antikörper sammeln sich im Knochenmark an und töteln sich gegenseitig ab. Dadurch können die Knochen und Nieren geschädigt werden.

Das multiple Myelom kann im Allgemeinen nicht geheilt werden. Allerdings können die Anzeichen und Symptome stark abgeschwächt werden oder eine Zeit lang sogar ganz verschwinden. Dies kann durch eine Behandlung mit einem Arzneimittel wie Lenalidomid erreicht werden.

Neu diagnostiziertes multiples Myelom – bei Patienten nach einer Knochenmarkstrahlentherapie

Lenalidomid HEXAL wird allein als Erhaltungstherapie nach einer Bestrahlung der Patienten mit Transplantat angewendet.

Neu diagnostiziertes multiples Myelom – bei Patienten bei denen eine Knochenmarkstrahlentherapie durchgeführt wurde

Lenalidomid HEXAL wird zusammen mit anderen Arzneimitteln bei der Behandlung von Patienten mit neu diagnostiziertem multiples Myelom angewendet. Diese anderen Arzneimittel sind:

- mit dem Chemotherapeutikum „Bortezomib“
- mit einem entzündungshemmenden Arzneimittel („Corticosteroid“)
- mit „Melphalan“, einem Chemotherapeutikum, und
- mit einem weiteren entzündungshemmenden Arzneimittel („Corticosteroid“).

Zu Ihrer Behandlung nehmen Sie diese anderen Arzneimittel zusammen mit Lenalidomid HEXAL ein, später nehmen Sie nur noch Lenalidomid HEXAL ein.

Wenn Sie 75 Jahre oder älter sind oder wenn Ihre Nierenfunktion nicht stark genug ist, werden Ihnen weitere Informationen über die Behandlung mit Lenalidomid HEXAL von Ihrem Arzt zur Verfügung gestellt.

Multiples Myelom – bei Patienten, die zuvor bereits eine Bestrahlung erhalten haben

Lenalidomid HEXAL wird in Kombination mit dem entzündungshemmenden Arzneimittel „Dexamethason“ eingenommen.

Lenalidomid HEXAL kann die Verschärfung der Anzeichen und Symptome des multiples Myeloms verhindern. Dies wird außerdem gesichert, dass Lenalidomid HEXAL das Wiederkehren des multiples Myeloms nach erfolgter Behandlung verzögert.

Myelodysplastische Syndrome (MDS)

Unter MDS wird eine Gruppe von verschiedenen Erkrankungen des Knochenmarks und Knochenmarkszellen, die zu Blutzellen entwickeln sich abnorm und können ihre Funktion nicht richtig erfüllen. Die betroffenen Patienten können ihre Anzeichen und Symptome durch eine Behandlung mit einer niedrigen Zahl oder Blutzellen einleiten, sie benötigen Bluttransfusionen und haben ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Lenalidomid HEXAL wird allein angewendet zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit diagnostiziertem MDS, wenn die Knochenmarkszellen im Knochenmark zu wenig sind. Sie benötigen regelmäßige Bluttransfusionen zur Behandlung von Eisenmangel.

• Sie haben eine Anämie der Knochenmarkszellen, die als „Eisenmangel“ bezeichnet wird, was bedeutet, dass Ihr Körper nicht genügend rote Blutkörperchen produzieren kann.

• Andere Behandlungen, die Sie erhalten haben, waren ungenügend oder nicht ausreichend wirksam.

Lenalidomid HEXAL kann die Anzahl von gesunden roten Blutkörperchen im Knochenmark erhöhen, indem es die Anzahl der abnormen Zellen verringert.

• Das kann die Anzahl der benötigten Bluttransfusionen senken und die Anzahl der benötigten Erythrozytentransfusionen senken.

Lenalidomid HEXAL allein wird zur Behandlung von erwachsenen Patienten angewendet, die mit anderen Arzneimitteln zusammen mit vorheriger Bestrahlung eingenommen.

Follikuläres Lymphom (FL)

Das FL ist eine langsam wachsende Krebsart der B-Lymphozyten. Diese Zellen gehören zu den weißen Blutzellen, die für die Immunabwehr des Körpers verantwortlich sind. Wenn Sie ein FL haben, können sich die weißen Blutzellen im Knochenmark, im Lymphknoten und im Lymphknoten und in der Milz ansammeln.

Lenalidomid HEXAL wird zusammen mit einem anderen Arzneimittel namens „Rituximab“ zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit vorbestehendem Follikuläres Lymphom angewendet.

Was wirkt Lenalidomid HEXAL?

Lenalidomid HEXAL wirkt durch Beeinträchtigung des Immunsystems. Dies führt zu einer Abnahme der Immunantwort. Es wirkt auf verschiedene Weise:

- Es unterdrückt die Wachstumsfaktoren.
- Es unterbindet das Verschmelzen von Blutzellen im Knochenmark.
- Es regt einen Teil des Immunsystems dazu an, die Krebszellen zu zerstören.

Was sollte Sie vor der Einnahme von Lenalidomid HEXAL beachten?

Vor dem Beginn der Behandlung mit Lenalidomid HEXAL müssen Sie die Gebrauchsinformationen von allen Arzneimitteln lesen, die Sie einnehmen, in Kombination mit Lenalidomid HEXAL anzuwenden sind.

Lenalidomid HEXAL darf nicht eingenommen werden, wenn:

- Sie schwanger sind, vermuten, schwanger zu sein, oder eine Schwangerschaft planen, **da es erwartet ist, dass Lenalidomid HEXAL dem ungeborenen Kind schaden** (siehe Abschnitt 3. Schwangerschaft, Stillzeit und Empfängnisverhütung – Informationen für Frauen und Männer)

• wenn Sie schwanger werden können, so es dem, Sie bei der Einnahme dieses Arzneimittels beachten, wenn Sie schwanger werden (siehe Abschnitt 2. Schwangerschaft, Stillzeit und Empfängnisverhütung – Informationen für Frauen und Männer)

• wenn Sie ein Frauen sind, die schwanger werden können, wenn Ihr Arzt bei jeder Verschreibung festhalten, dass Sie schwanger werden können, wenn Sie schwanger sind, und Ihnen dies bestätigen.

• wenn Sie allergisch gegen Lenalidomid oder einen der anderen Bestandteile dieses Arzneimittels sind. Diese Arzneimittel sind: Wenn Sie vermuten, allergisch zu sein, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Wenn Ihnen irgendeine dieser Punkte auf Sie zutrifft, sollten Sie Lenalidomid HEXAL nicht einnehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bleien sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder anderen Gesundheitsfachpersonal, bevor Sie Lenalidomid HEXAL einnehmen, wenn:

- Sie eine Infektion hatten oder Sie schon einmal eine Blutzellen hatten, oder wenn Sie rauchen, hohen Blutdruck oder hohe Cholesterinwerte haben.

• wenn Sie eine Infektion hatten oder Sie schon einmal einen Blutzellen hatten, oder wenn Sie rauchen, hohen Blutdruck oder hohe Cholesterinwerte haben.

• wenn Sie eine Infektion hatten oder Sie schon einmal einen Blutzellen hatten, oder wenn Sie rauchen, hohen Blutdruck oder hohe Cholesterinwerte haben.

• wenn Sie eine Infektion hatten oder Sie schon einmal einen Blutzellen hatten, oder wenn Sie rauchen, hohen Blutdruck oder hohe Cholesterinwerte haben.

haben, Sie dürfen während der Behandlung und für mindestens 7 Tage nach Ende der Behandlung keinen Samen spenden.

Verkehrsmittel und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Wenn Sie nach der Einnahme dieses Arzneimittels müde sind, wenn Sie sich benommen, müde, schläfrig oder schwindlig fühlen oder bemerken, dass Sie sich verschlimmern sehen, sollten Sie Lenalidomid HEXAL nicht einnehmen.

Lenalidomid HEXAL enthält Lactose und Natrium

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg pro Kapsel, d. h. es ist nahezu „natriumfrei“).

3. Wie ist Lenalidomid HEXAL einzunehmen?

Die Behandlung mit Lenalidomid HEXAL muss unter der Aufsicht von Ärzten erfolgen, die Erfahrung in der Behandlung von Patienten mit MDS, Polypolämyelom oder MDS haben.

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, bei denen keine Knochenmarkstrahlentherapie durchgeführt werden kann, oder die zuvor Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten nach einer Knochenmarkstrahlentherapie oder zur Behandlung von Patienten mit neu diagnostiziertem multiples Myelom.

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln namens „Rituximab“ eingenommen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wenn Sie Lenalidomid HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen, werden Sie weitere Informationen über deren Anwendung und Wirkungen bei den jeweiligen Arzneimitteln erhalten.

Behandlungssykli

Lenalidomid HEXAL wird in bestimmten Tagen eines Zeitraums von 3 Wochen (21 Tage) eingenommen.

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, bei denen keine Knochenmarkstrahlentherapie durchgeführt werden kann, oder die zuvor Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten nach einer Knochenmarkstrahlentherapie oder zur Behandlung von Patienten mit neu diagnostiziertem multiples Myelom.

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Bei Anwendung von Lenalidomid HEXAL zur Behandlung des multiples Myeloms bei Patienten, die zuvor eine andere Art der Bestrahlung erhalten haben, wird es zusammen mit anderen Arzneimitteln eingenommen (siehe Abschnitt 1. Wofür wird Lenalidomid HEXAL angewendet?).

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

• Kurzatmigkeit

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

100 mg
Free
Text
Area

- Kapselhülle: Gelatine, Titandioxid und Eisen(II)-hydroxid-oxid x H₂O
- Druckrinne: Schellack (gelblich, entwachert), Propylenlycol, konzentrierte Ammoniak-Lösung, Kaliumhydroxid und Eisen(II)-III-oxid

Lenalidomid HEXAL 10 mg Hartkapseln

- Der Wirkstoff ist Lenalidomid. Jede Kapsel enthält 10 mg Lenalidomid.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
 - Kapselhülle: Lactose, mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium und Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]
 - Kapselhülle: Gelatine, Titandioxid, Indigocarmin und Eisen(II)-hydroxid-oxid x H₂O
 - Druckrinne: Schellack (gelblich, entwachert), Propylenlycol, konzentrierte Ammoniak-Lösung, Kaliumhydroxid und Eisen(II)-III-oxid

Lenalidomid HEXAL 15 mg Hartkapseln

- Der Wirkstoff ist Lenalidomid. Jede Kapsel enthält 15 mg Lenalidomid.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
 - Kapselhülle: Lactose, mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium und Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]
 - Kapselhülle: Gelatine, Titandioxid, Indigocarmin
 - Druckrinne: Schellack (gelblich, entwachert), Propylenlycol, konzentrierte Ammoniak-Lösung, Kaliumhydroxid und Eisen(II)-III-oxid

Lenalidomid HEXAL 20 mg Hartkapseln

- Der Wirkstoff ist Lenalidomid. Jede Kapsel enthält 20 mg Lenalidomid.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
 - Kapselhülle: Lactose, mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium und Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]
 - Kapselhülle: Gelatine und Titandioxid, Indigocarmin und Eisen(II)-hydroxid-oxid x H₂O
 - Druckrinne: Schellack (gelblich, entwachert), Propylenlycol, konzentrierte Ammoniak-Lösung, Kaliumhydroxid und Eisen(II)-III-oxid

Lenalidomid HEXAL 25 mg Hartkapseln

- Der Wirkstoff ist Lenalidomid. Jede Kapsel enthält 25 mg Lenalidomid.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
 - Kapselhülle: Lactose, mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium und Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]
 - Kapselhülle: Gelatine und Titandioxid
 - Druckrinne: Schellack (gelblich, entwachert), Propylenlycol, konzentrierte Ammoniak-Lösung, Kaliumhydroxid und Eisen(II)-III-oxid

Wie Lenalidomid HEXAL aussieht und Inhalt der Packung

Lenalidomid HEXAL 2,5 mg Hartkapseln
 Unlurchsichtiges weißes Lintar- und undurchsichtiges grünes bis hellgrünes Oberteil, mit einer Länge von ungefähr 14,3 mm, mit den Aufdrucken „L9NL“ und „2,5“.

Lenalidomid HEXAL 5 mg Hartkapseln
 Unlurchsichtiges weißes Lintar- und undurchsichtiges weißes Oberteil, mit einer Länge von ungefähr 16,0 mm, mit den Aufdrucken „L9NL“ und „5“.

Lenalidomid HEXAL 7,5 mg Hartkapseln
 Unlurchsichtiges weißes Lintar- und undurchsichtiges gelbes Oberteil, mit einer Länge von ungefähr 16,0 mm, mit den Aufdrucken „L9NL“ und „7,5“.

Lenalidomid HEXAL 10 mg Hartkapseln
 Unlurchsichtiges gelbes Lintar- und undurchsichtiges grünes bis hellgrünes Oberteil, mit einer Länge von ungefähr 21,7 mm, mit den Aufdrucken „L9NL“ und „10“.

Lenalidomid HEXAL 15 mg Hartkapseln
 Unlurchsichtiges weißes Lintar- und undurchsichtiges blaues bis hellblaues Oberteil, mit einer Länge von ungefähr 21,7 mm, mit den Aufdrucken „L9NL“ und „15“.

Lenalidomid HEXAL 20 mg Hartkapseln
 Unlurchsichtiges blaues bis hellblaues Lintar- und undurchsichtiges grünes bis hellgrünes Oberteil, mit einer Länge von ungefähr 21,7 mm, mit den Aufdrucken „L9NL“ und „20“.

Lenalidomid HEXAL 25 mg Hartkapseln
 Unlurchsichtiges weißes Lintar- und undurchsichtiges weißes Oberteil, mit einer Länge von ungefähr 21,7 mm, mit den Aufdrucken „L9NL“ und „25“.

OPAL/Aluminium/PVC/Aluminium Blisterpackungen.

OPAL/Aluminium/PVC/Aluminium Kalender-Blisterpackungen.

Perforierte OPAL/Aluminium/PVC/Aluminium Blisterpackungen zur Abgabe von Einzeldosen.

Perforierte OPAL/Aluminium/PVC/Aluminium Kalender-Blisterpackungen zur Abgabe von Einzeldosen.

Packungsgrößen

OPAL/PVC/Al Blisterpackungen: Packungen mit 7, 14, 21, 28 und 42 Hartkapseln.

OPAL/Al/PVC/Al Kalender-Blisterpackungen: Packungen mit 7, 14, 21, 28 und 42 Hartkapseln in 1, 2, 3, 4 bzw. 6 Blisterpackungen à 7 Hartkapseln.

Perforierte OPAL/Al/PVC/Al Blisterpackungen zur Abgabe von Einzeldosen: Packungen mit 7x1, 14x1, 21x1 und 28x1 Hartkapsel.

Perforierte OPAL/Al/PVC/Al Kalender-Blisterpackungen zur Abgabe von Einzeldosen: Packungen mit 7x1, 14x1, 21x1 und 28x1 Hartkapsel.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkauf gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Hausl AG
 Industriestrasse 25
 83607 Holzkirchen
 Telefon: (08204) 908-0
 Telefax: (08204) 908-1290
 E-Mail: service@hexal.com

Hersteller

Salutas Pharma GmbH
 Otto-von-Guericke-Allee 1
 39179 Barleben

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und im Vereinigten Königreich (Nordirland) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen

- Belgien: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg - Hartkapseln
 Lenalidomid Sandoz 5 mg - Hartkapseln
 Lenalidomid Sandoz 7,5 mg - Hartkapseln
 Lenalidomid Sandoz 10 mg - Hartkapseln
 Lenalidomid Sandoz 15 mg - Hartkapseln
 Lenalidomid Sandoz 20 mg - Hartkapseln
 Lenalidomid Sandoz 25 mg - Hartkapseln
- Bulgarien: Lenalidomide Sandoz 2,5 mg hard capsules
 Lenalidomide Sandoz 5 mg hard capsules
 Lenalidomide Sandoz 7,5 mg hard capsules
 Lenalidomide Sandoz 10 mg hard capsules
 Lenalidomide Sandoz 15 mg hard capsules
 Lenalidomide Sandoz 20 mg hard capsules
 Lenalidomide Sandoz 25 mg hard capsules
- Kroatien: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg tvrdi kapsuli
 Lenalidomid Sandoz 5 mg tvrdi kapsule
 Lenalidomid Sandoz 7,5 mg tvrdi kapsule
 Lenalidomid Sandoz 10 mg tvrdi kapsule
 Lenalidomid Sandoz 15 mg tvrdi kapsule
 Lenalidomid Sandoz 20 mg tvrdi kapsule
 Lenalidomid Sandoz 25 mg tvrdi kapsule
- Tschechische Republik: Lenalidomid Sandoz
 Lenalidomide "Sandoz"
 Lenalidomide Sandoz 2,5 mg tvrdé kapsule
 Lenalidomide Sandoz 5 mg tvrdé kapsule
 Lenalidomide Sandoz 7,5 mg tvrdé kapsule
 Lenalidomide Sandoz 10 mg tvrdé kapsule
 Lenalidomide Sandoz 15 mg tvrdé kapsule
 Lenalidomide Sandoz 20 mg tvrdé kapsule
 Lenalidomide Sandoz 25 mg tvrdé kapsule
- Dänemark: Lenalidomid Sandoz
 Lenalidomide Sandoz 2,5 mg tvrdé kapsel
 Lenalidomide Sandoz 5 mg tvrdé kapsel
 Lenalidomide Sandoz 7,5 mg tvrdé kapsel
 Lenalidomide Sandoz 10 mg tvrdé kapsel
 Lenalidomide Sandoz 15 mg tvrdé kapsel
 Lenalidomide Sandoz 20 mg tvrdé kapsel
 Lenalidomide Sandoz 25 mg tvrdé kapsel
- Deutschland: Lenalidomid HEXAL 2,5 mg Hartkapseln
 Lenalidomid HEXAL 5 mg Hartkapseln
 Lenalidomid HEXAL 7,5 mg Hartkapseln
 Lenalidomid HEXAL 10 mg Hartkapseln
 Lenalidomid HEXAL 15 mg Hartkapseln
 Lenalidomid HEXAL 20 mg Hartkapseln
 Lenalidomid HEXAL 25 mg Hartkapseln
- Griechenland: Lenalidomide Sandoz 2,5 mg oklirpó kapsídes
 Lenalidomide Sandoz 5 mg oklirpó kapsídes
 Lenalidomide Sandoz 7,5 mg oklirpó kapsídes
 Lenalidomide Sandoz 10 mg oklirpó kapsídes
 Lenalidomide Sandoz 15 mg oklirpó kapsídes
 Lenalidomide Sandoz 20 mg oklirpó kapsídes
 Lenalidomide Sandoz 25 mg oklirpó kapsídes
- Ungarn: Lenalidomide Sandoz 10 mg kemény kapszula
 Lenalidomide Sandoz 25 mg kemény kapszula
- Island: Lenalidomide Sandoz 2,5 mg hörð hlyki
 Lenalidomide Sandoz 5 mg hörð hlyki
 Lenalidomide Sandoz 7,5 mg hörð hlyki
 Lenalidomide Sandoz 10 mg hörð hlyki
 Lenalidomide Sandoz 15 mg hörð hlyki
 Lenalidomide Sandoz 20 mg hörð hlyki
 Lenalidomide Sandoz 25 mg hörð hlyki
- Italien: Lenalidomide Rowex 2,5 mg hard capsules
 Lenalidomide Rowex 5 mg hard capsules
 Lenalidomide Rowex 7,5 mg hard capsules
 Lenalidomide Rowex 10 mg hard capsules
 Lenalidomide Rowex 15 mg hard capsules
 Lenalidomide Rowex 20 mg hard capsules
 Lenalidomide Rowex 25 mg hard capsules
- Italien: Lenalidomide Sandoz
- Niederlande: Lenalidomide Sandoz 2,5 mg, harde capsules
 Lenalidomide Sandoz 5 mg, harde capsules
 Lenalidomide Sandoz 7,5 mg, harde capsules
 Lenalidomide Sandoz 10 mg, harde capsules
 Lenalidomide Sandoz 15 mg, harde capsules
 Lenalidomide Sandoz 20 mg, harde capsules
 Lenalidomide Sandoz 25 mg, harde capsules
- Norwegen: Lenalidomide Sandoz 2,5 mg harde kapsler
 Lenalidomide Sandoz 5 mg harde kapsler
 Lenalidomide Sandoz 7,5 mg harde kapsler
 Lenalidomide Sandoz 10 mg harde kapsler
 Lenalidomide Sandoz 15 mg harde kapsler
 Lenalidomide Sandoz 20 mg harde kapsler
 Lenalidomide Sandoz 25 mg harde kapsler
- Polen: Lenalidomid Sandoz
- Portugal: Lenalidomide Sandoz
 Lenalidomide Sandoz 2,5 mg capsula
 Lenalidomide Sandoz 5 mg capsula
 Lenalidomide Sandoz 7,5 mg capsula
 Lenalidomide Sandoz 10 mg capsula
 Lenalidomide Sandoz 15 mg capsula
 Lenalidomide Sandoz 20 mg capsula
 Lenalidomide Sandoz 25 mg capsula
- Slowakei: Lenalidomid Sandoz 10 mg
 Lenalidomid Sandoz 15 mg
 Lenalidomid Sandoz 20 mg
 Lenalidomid Sandoz 25 mg
 Lenalidomid Sandoz 30 mg
- Slowenien: Lenalidomid Sandoz 2,5 mg trde kapsule
 Lenalidomid Sandoz 5 mg trde kapsule
 Lenalidomid Sandoz 7,5 mg trde kapsule
 Lenalidomid Sandoz 10 mg trde kapsule
 Lenalidomid Sandoz 15 mg trde kapsule
 Lenalidomid Sandoz 20 mg trde kapsule
 Lenalidomid Sandoz 25 mg trde kapsule
- Spanien: Lenalidomide Sandoz 2,5 mg cápsulas duras EFG
 Lenalidomide Sandoz 5 mg cápsulas duras EFG
 Lenalidomide Sandoz 10 mg cápsulas duras EFG
 Lenalidomide Sandoz 15 mg cápsulas duras EFG
 Lenalidomide Sandoz 20 mg cápsulas duras EFG
 Lenalidomide Sandoz 25 mg cápsulas duras EFG
- Schweden: Lenalidomide Sandoz 2,5 mg kapsel, hård
 Lenalidomide Sandoz 5 mg kapsel, hård
 Lenalidomide Sandoz 7,5 mg kapsel, hård
 Lenalidomide Sandoz 10 mg kapsel, hård
 Lenalidomide Sandoz 15 mg kapsel, hård
 Lenalidomide Sandoz 20 mg kapsel, hård
 Lenalidomide Sandoz 25 mg kapsel, hård
- Vereinigtes Königreich (Nordirland): Lenalidomide Sandoz 2,5 mg hard capsules
 Lenalidomide Sandoz 5 mg hard capsules
 Lenalidomide Sandoz 7,5 mg hard capsules
 Lenalidomide Sandoz 10 mg hard capsules
 Lenalidomide Sandoz 15 mg hard capsules
 Lenalidomide Sandoz 20 mg hard capsules
 Lenalidomide Sandoz 25 mg hard capsules

Belgien:	Lenalidomid Sandoz 2,5 mg hard capsules Lenalidomide Sandoz 5 mg hard capsules Lenalidomide Sandoz 7,5 mg hard capsules Lenalidomide Sandoz 10 mg hard capsules Lenalidomide Sandoz 15 mg hard capsules Lenalidomide Sandoz 20 mg hard capsules Lenalidomide Sandoz 25 mg hard capsules
Bulgarien:	Lenalidomide Sandoz 2,5 mg tvrdi kapsuli Lenalidomide Sandoz 5 mg tvrdi kapsule Lenalidomide Sandoz 7,5 mg tvrdi kapsule Lenalidomide Sandoz 10 mg tvrdi kapsule Lenalidomide Sandoz 15 mg tvrdi kapsule Lenalidomide Sandoz 20 mg tvrdi kapsule Lenalidomide Sandoz 25 mg tvrdi kapsule
Kroatien:	Lenalidomid Sandoz 2,5 mg tvrdi kapsuli Lenalidomid Sandoz 5 mg tvrdi kapsule Lenalidomid Sandoz 7,5 mg tvrdi kapsule Lenalidomid Sandoz 10 mg tvrdi kapsule Lenalidomid Sandoz 15 mg tvrdi kapsule Lenalidomid Sandoz 20 mg tvrdi kapsule Lenalidomid Sandoz 25 mg tvrdi kapsule
Tschechische Republik:	Lenalidomid Sandoz Lenalidomide "Sandoz" Lenalidomide Sandoz 2,5 mg tvrdé kapsule Lenalidomide Sandoz 5 mg tvrdé kapsule Lenalidomide Sandoz 7,5 mg tvrdé kapsule Lenalidomide Sandoz 10 mg tvrdé kapsule Lenalidomide Sandoz 15 mg tvrdé kapsule Lenalidomide Sandoz 20 mg tvrdé kapsule Lenalidomide Sandoz 25 mg tvrdé kapsule
Dänemark:	Lenalidomid Sandoz Lenalidomide Sandoz 2,5 mg tvrdé kapsel Lenalidomide Sandoz 5 mg tvrdé kapsel Lenalidomide Sandoz 7,5 mg tvrdé kapsel Lenalidomide Sandoz 10 mg tvrdé kapsel Lenalidomide Sandoz 15 mg tvrdé kapsel Lenalidomide Sandoz 20 mg tvrdé kapsel Lenalidomide Sandoz 25 mg tvrdé kapsel
Deutschland:	Lenalidomid HEXAL 2,5 mg Hartkapseln Lenalidomid HEXAL 5 mg Hartkapseln Lenalidomid HEXAL 7,5 mg Hartkapseln Lenalidomid HEXAL 10 mg Hartkapseln Lenalidomid HEXAL 15 mg Hartkapseln Lenalidomid HEXAL 20 mg Hartkapseln Lenalidomid HEXAL 25 mg Hartkapseln
Griechenland:	Lenalidomide Sandoz 2,5 mg oklirpó kapsídes Lenalidomide Sandoz 5 mg oklirpó kapsídes Lenalidomide Sandoz 7,5 mg oklirpó kapsídes Lenalidomide Sandoz 10 mg oklirpó kapsídes Lenalidomide Sandoz 15 mg oklirpó kapsídes Lenalidomide Sandoz 20 mg oklirpó kapsídes Lenalidomide Sandoz 25 mg oklirpó kapsídes
Ungarn:	Lenalidomide Sandoz 10 mg kemény kapszula Lenalidomide Sandoz 25 mg kemény kapszula
Island:	Lenalidomide Sandoz 2,5 mg hörð hlyki Lenalidomide Sandoz 5 mg hörð hlyki Lenalidomide Sandoz 7,5 mg hörð hlyki Lenalidomide Sandoz 10 mg hörð hlyki Lenalidomide Sandoz 15 mg hörð hlyki Lenalidomide Sandoz 20 mg hörð hlyki Lenalidomide Sandoz 25 mg hörð hlyki
Italien:	Lenalidomide Rowex 2,5 mg hard capsules Lenalidomide Rowex 5 mg hard capsules Lenalidomide Rowex 7,5 mg hard capsules Lenalidomide Rowex 10 mg hard capsules Lenalidomide Rowex 15 mg hard capsules Lenalidomide Rowex 20 mg hard capsules Lenalidomide Rowex 25 mg hard capsules
Niederlande:	Lenalidomide Sandoz Lenalidomide Sandoz 2,5 mg, harde capsules Lenalidomide Sandoz 5 mg, harde capsules Lenalidomide Sandoz 7,5 mg, harde capsules Lenalidomide Sandoz 10 mg, harde capsules Lenalidomide Sandoz 15 mg, harde capsules Lenalidomide Sandoz 20 mg, harde capsules Lenalidomide Sandoz 25 mg, harde capsules
Norwegen:	Lenalidomide Sandoz 2,5 mg harde kapsler Lenalidomide Sandoz 5 mg harde kapsler Lenalidomide Sandoz 7,5 mg harde kapsler Lenalidomide Sandoz 10 mg harde kapsler Lenalidomide Sandoz 15 mg harde kapsler Lenalidomide Sandoz 20 mg harde kapsler Lenalidomide Sandoz 25 mg harde kapsler
Polen:	Lenalidomid Sandoz
Portugal:	Lenalidomide Sandoz Lenalidomide Sandoz 2,5 mg capsula Lenalidomide Sandoz 5 mg capsula Lenalidomide Sandoz 7,5 mg capsula Lenalidomide Sandoz 10 mg capsula Lenalidomide Sandoz 15 mg capsula Lenalidomide Sandoz 20 mg capsula Lenalidomide Sandoz 25 mg capsula
Slowakei:	Lenalidomid Sandoz 10 mg Lenalidomid Sandoz 15 mg Lenalidomid Sandoz 20 mg Lenalidomid Sandoz 25 mg Lenalidomid Sandoz 30 mg
Slowenien:	Lenalidomid Sandoz 2,5 mg trde kapsule Lenalidomid Sandoz 5 mg trde kapsule Lenalidomid Sandoz 7,5 mg trde kapsule Lenalidomid Sandoz 10 mg trde kapsule Lenalidomid Sandoz 15 mg trde kapsule Lenalidomid Sandoz 20 mg trde kapsule Lenalidomid Sandoz 25 mg trde kapsule
Spanien:	Lenalidomide Sandoz 2,5 mg cápsulas duras EFG Lenalidomide Sandoz 5 mg cápsulas duras EFG Lenalidomide Sandoz 10 mg cápsulas duras EFG Lenalidomide Sandoz 15 mg cápsulas duras EFG Lenalidomide Sandoz 20 mg cápsulas duras EFG Lenalidomide Sandoz 25 mg cápsulas duras EFG
Schweden:	Lenalidomide Sandoz 2,5 mg kapsel, hård Lenalidomide Sandoz 5 mg kapsel, hård Lenalidomide Sandoz 7,5 mg kapsel, hård Lenalidomide Sandoz 10 mg kapsel, hård Lenalidomide Sandoz 15 mg kapsel, hård Lenalidomide Sandoz 20 mg kapsel, hård Lenalidomide Sandoz 25 mg kapsel, hård
Vereinigtes Königreich (Nordirland):	Lenalidomide Sandoz 2,5 mg hard capsules Lenalidomide Sandoz 5 mg hard capsules Lenalidomide Sandoz 7,5 mg hard capsules Lenalidomide Sandoz 10 mg hard capsules Lenalidomide Sandoz 15 mg hard capsules Lenalidomide Sandoz 20 mg hard capsules Lenalidomide Sandoz 25 mg hard capsules

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2023.

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und Hexal wünschen gute Besserung!

70 mm

12 mm
Text
Free
Area

12 mm
Text
Free
Area

70 mm

12 mm
Text
Free
Area