



SanaMin **PLUS** Pulver

DEUTSCH

GEBRAUCHSINFORMATION

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Medizinproduktes beginnen.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf, vielleicht möchten Sie diese später noch einmal lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Therapeuten, Apotheker oder direkt an die FROXIMUN AG als Hersteller.
- Dieses Medizinprodukt ist rezeptfrei und frei verkäuflich.

1. Was ist SanaMin und wofür wird es angewendet?

SanaMin in Pulverform ist ein natürliches Medizinprodukt mit dem mineralischen Wirkstoff MANC®, einem natürlichen Zeolith-Klinoptilolith mit dem PLUS an Calcium- und Magnesiumcarbonat. Es dient der Stärkung der Darmwandbarriere bei wiederkehrender physischer Belastung. Der Wirkstoff MANC® durchläuft den Verdauungstrakt, entfällt dort seine physikalische Wirkung und wird nicht verstoffwechselt.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von SanaMin beachten?

- Öffnen Sie die Dose erst unmittelbar vor der Anwendung, bevor Sie das Pulver in Flüssigkeit einröhren.
- Achten Sie darauf, dass die Dose stets verschlossen ist.
- Entnehmen Sie das Pulver mit einem trockenen, sauberen Löffel.
- Wenn Sie den beigelegten Dosierlöffel verwenden, reinigen Sie ihn, bevor Sie ihn wiederverwenden.

SanaMin darf nicht eingenommen werden:

- Bei bekannter Allergie oder Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe. (siehe Punkt 6: Inhaltsstoffe und Bestandteile)
- Auf Grund sonstiger unzureichender Untersuchungen an schwangeren Frauen sowie stillenden Müttern soll auf die Einnahme von SanaMin Medizinprodukten während der Schwangerschaft sowie der Stillzeit verzichtet werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von SanaMin ist erforderlich bei:

- In seltenen Fällen kann die Einnahme von SanaMin in Pulverform zu Verstopfungen (Obstipation) oder Blähungen führen. (selten: kann bis zu 1 von 1.000 behandelten betreffen)
- Wenn Sie unter einer chronischen Verstopfung leiden, dann sollten Sie Einnahme von SanaMin in Pulverform mit besonderer Vorsicht durchführen. In solchen Fällen beraten Sie sich vor der Einnahme mit Ihrem Arzt, Therapeuten oder Apotheker.
- Achten Sie stets auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr bei der Einnahme von SanaMin in Pulverform, um obstipierenden (verstopfenden) Effekten entgegen zu wirken.
- Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen über die Einnahme von SanaMin an Kindern vor. Daher wird die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen.
- Bei einer Neigung zur Nierensteinbildung konsultieren Sie bitte vor der Einnahme einen Arzt.

Bei der Einnahme von SanaMin mit Medikamenten:

Um unerwünschte Wechselwirkungen mit Medikamenten zu vermeiden, ist ein Abstand von 2 Stunden einzuhalten, da keine systematischen Untersuchungen zu Wechselwirkungen oder Beeinflussungen von Medikamenten durch die Einnahme von SanaMin in Pulverform vorliegen. Sollten Sie Medikamente einnehmen, stimmen Sie den zeitlichen Abstand der Einnahme von SanaMin bitte mit Ihrem Arzt oder Therapeuten ab.

3. Wie ist SanaMin einzunehmen?

- Falls von Ihrem Arzt oder Therapeuten nicht anders verordnet, 1 – 2 Dosierlöffel SanaMin PLUS Pulver ca. 30 Minuten vor einer Mahlzeit in reichlich Flüssigkeit (ca. 200 ml Wasser) einröhren und unmittelbar trinken.
- Eine Tageshöchstmenge von 2 Dosierlöffeln sollte nicht überschritten werden.
- Sollten Sie von der Einnahmemenge abweichen wollen, so befragen Sie bitte zuvor Ihren Arzt oder Therapeuten.

Dauer der Anwendung

Die Dauer der Behandlung mit SanaMin sollte 30 Tage nicht überschreiten. Bei wiederholter Einnahme sollte eine Anwendungspause von mindestens einer Woche eingehalten werden.

Gegenmaßnahmen bei Anwendungsfehlern, Überdosierung und Nebenwirkungen:

Wenn Sie versehentlich eine größere Menge als die vorgesehene Dosierung eingenommen haben, können verstärkt Nebenwirkungen auftreten. In diesen Fällen wird eine Reduzierung der Einnahmемenge auf maximal 1 Dosierlöffel pro Tag empfohlen oder stoppen Sie ggf. die Anwendung. Dabei ist auf eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr zu achten. Bei anhaltenden Nebenwirkungen stellen Sie die Einnahme ein und konsultieren Sie Ihren Arzt oder Therapeuten.

4. Welche Nebenwirkungen sind bekannt?

In seltenen Fällen kann es zu Verstopfung oder Blähungen kommen (selten: kann bis zu 1 von 1.000 behandelten betreffen).

Meldungen von Nebenwirkungen

Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt, Therapeuten, Apotheker und/oder die unten aufgeführte E-Mail Adresse der FROXIMUN AG oder kontaktieren Sie uns unter der ebenfalls dort aufgeführten Service-Nummer.

Hersteller und Meldestelle: FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany

Telefon: +49 39401 632-0

Telefax: +49 39401 632-199

E-Mail Hersteller: anwender@froximun.de

E-Mail Vertrieb: info@sanacare-world.com

5. Wie ist SanaMin aufzubewahren?

- außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- trocken und zwischen 5°C - 40°C lagern
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- nicht länger verwenden als angegeben
- verwendbar bis: siehe Faltschachtel oder Prägung/Druck auf dem Dosenboden

6. Weitere Informationen

Inhaltsstoffe und sonstige Bestandteile

- Packungsinhalt: 1 Dose mit 200g Pulver, 1 Dosierlöffel, Gebrauchsinformation
- Inhaltsstoffe: MANC® (Natur-Zeolith-Klinoptilolith), Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat

Information zum MANC®:

- 100 % natürlich, glutenfrei, laktosefrei
- Bei dem Wirkstoff handelt es sich um ein modifiziertes Alumosilikat.
- koscher, halal: Wir bestätigen hiermit, dass MANC® Produkt in einem Prozess aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Das Produkt enthält keine tierischen Bestandteile, Blut oder dessen Nebenprodukte sowie Alkohol.
- Transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSE/BSE): Bei der Produktion von MANC® kommen ausschließlich Rohstoffe mineralischen Ursprungs zum Einsatz.

Information zum Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat:

- allergenfrei
- als koscher und halal anerkannt
- Transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSE/BSE): Es gelten die gleichen Bedingungen, wie beim MANC®.

7. Vertrieb

SanaCare Gesundheitsprodukte GmbH & Co.KG, Sandwiesenstr. 32, 64665 Alsbach-Hähnlein, www.sanacare-world.com, info@sanacare-world.com, Telefon: +49 6257 503300

8. Hersteller

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt, Telefon: +49 39401 632-0,

Telefax: +49 39401 632-199, EMail: info@froximun.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: 2018-06-01

GEBRAUCHSINFORMATION

Wirkstoff: MANC® (Natur-Zeolith-Klinoptilolith)

FRANÇAIS

NOTICE D'UTILISATION

200g poudre

Substance : MANC® (clinoptilolite zéolite naturelle)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de la notice, avant d'utiliser le dispositif médical.

- Veuillez conserver la notice d'utilisation. Vous pourriez avoir besoin de la relire ultérieurement.
- Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à votre médecin, thérapeute ou pharmacien ou directement à FROXIMUN AG en tant que fabricant.
- Ce dispositif médical est délivré sans ordonnance et est en vente libre.

1. Qu'est-ce que SanaMin et dans quels cas est-il utilisé ?

SanaMin sous forme de poudre est un dispositif médical naturel contenant la substance minérale MANC®, la clinoptilolite zéolite naturelle avec un plus en carbonate de calcium et de magnésium. Il sert à renforcer la barrière de la paroi intestinale en cas de contraintes physiques répétitives. La substance MANC® traverse le tractus intestinal où elle produit son effet physique. Elle ne sera pas métabolisée.

2. Que faut-il savoir avant l'usage de SanaMin ?

- La boîte ne doit être ouverte qu'immédiatement avant l'utilisation, avant de diluer la poudre dans du liquide.
- Veillez à ce que la boîte soit toujours fermée.
- Retirez la poudre à l'aide d'une cuillère propre et sèche.
- Si vous utilisez la cuillère doseuse fournie, nettoyez-la avant de la réutiliser.

SanaMin ne doit pas être utilisé :

- En cas d'allergie connue ou d'hypersensibilité à l'un ou plusieurs composants du médicament. (voir point 6 : Composants et substances)
- Il est indiqué de ne pas utiliser les dispositifs médicaux SanaMin pendant la grossesse et l'allaitement en raison d'analyses insuffisantes sur les femmes enceintes ou allaitantes.

Il faut être particulièrement prudent lors de la prise de SanaMin lorsque :

- Dans de rares cas, l'utilisation de SanaMin sous forme de poudre peut provoquer une constipation (obstipation) ou des ballonnements. (rare : peut concerner jusqu'à une personne traitée sur 1 000).
- Si vous souffrez de constipation chronique, l'utilisation de SanaMin sous forme de poudre nécessite une attention particulière. Dans ce cas-là, veuillez consulter votre médecin, thérapeute ou pharmacien avant la prise du dispositif médical.
- Veillez à boire suffisamment lors de la prise de SanaMin sous forme de poudre, afin de prévenir les effets d'obstipation (constipation).
- Il n'existe aucune donnée suffisante sur l'utilisation de SanaMin chez l'enfant. Par conséquent, il est recommandé de ne pas utiliser ce dispositif médical chez les enfants de moins de 12 ans.
- En cas de prédisposition à la formation de calculs rénaux, veuillez consulter votre médecin avant la prise de ce dispositif médical.

Lors de l'utilisation de SanaMin avec des médicaments :

Étant donné qu'il n'existe aucune étude systématique au sujet des interactions ou influences médicamenteuses suite à la prise de SanaMin sous forme de poudre, il est recommandé de respecter un intervalle de temps de 2 heures, pour éviter les interactions médicamenteuses indésirables. Si vous prenez des médicaments, déterminez l'intervalle de temps requis pour la prise de SanaMin avec votre médecin ou thérapeute.

3. Comment faut-il prendre SanaMin ?

- Sauf prescription contraire de votre médecin ou thérapeute, diluer 1 à 2 cuillères doseuses de poudre SanaMin PLUS dans suffisamment de liquide (environ 200 ml d'eau) environ 30 minutes avant le repas et boire immédiatement.
- Une quantité maximale journalière de 2 cuillères de dosage ne doit ne devrait pas être dépassée.
- Si vous souhaitez changer la prise journalière, veuillez consulter auparavant votre médecin ou thérapeute.

Durée d'utilisation

La durée du traitement avec SanaMin ne doit pas dépasser 30 jours. En cas d'utilisation répétée, il convient de respecter une pause de 7 jours avant de reprendre le traitement.

Mesures à prendre en cas d'erreurs d'utilisation, de surdose et d'effets secondaires :

Si vous avez pris une dose supérieure à celle qui était prévue, des effets secondaires accrus peuvent apparaître. Dans ce cas-là, il est recommandé de réduire la prise à une cuillère de dosage, par jour au maximum ou d'arrêter le cas échéant le traitement. En même temps, il faut veiller à une hydratation suffisante. En cas d'effets secondaires persistants, arrêtez le traitement et consultez votre médecin ou thérapeute.

4. Quels sont les effets secondaires possibles ?

Dans de rares cas, ce dispositif médical peut entraîner une constipation ou des ballonnements. (rare : peut concerner jusqu'à une personne traitée sur 1 000).

Déclarations d'effets secondaires

Si vous ressentez l'un des effets mentionnés comme grave, ou si vous présentez des effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'utilisation, veuillez en informer votre médecin, thérapeute, pharmacien et/ou l'adresse e-mail ci-dessous de FROXIMUN AG ou contactez-nous à l'aide du numéro d'assistance figurant également ci-dessous.

Fabricant: FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany

Téléphone: +49 39401 632-0

Téléfax: +49 39401 632-199

E-mail Fabricant: anwender@froximun.de

E-mail distributeur: info@sanacare-world.com

5. Où faut-il conserver SanaMin ?

- Conserver hors de la portée des enfants
- Conserver dans un endroit sec et à une température entre 5°C - 40°C
- Protéger de l'ensolaillement direct
- Ne pas utiliser au-delà de la date indiquée
- Date limite de consommation : voir la boîte ou estampage/impression sur le fond de la boîte

6. Autres informations

Composants et autres substances

- Contenu de l'emballage : 1 boîte avec 200 g de poudre, 1 cuillère de dosage, notice d'utilisation
- Composants : MANC® (clinoptilolite zéolite naturelle), carbonate de calcium, carbonate de magnésium

Information concernant MANC® :

- 100 % naturel, sans gluten, sans lactose
- Concernant la substance, il s'agit d'un aluminosilicate modifié
- Casher, halal : nous confirmons par la présente que le produit mentionné ci-dessus a été fabriqué selon un procédé avec des matières premières minérales. Le produit ne contient aucun constituant d'origine animale, du sang ou des produits dérivés du sang, ni d'alcool.
- Encéphalopathies spongiformes transmissibles (TSE/BSE) : pour la production de MANC® seules des matières premières d'origine minérale sont utilisées.

Information concernant le carbonate de calcium, carbonate de magnésium :

- Sans allergène
- Reconnu comme kascher et halal
- Encéphalopathies spongiformes transmissibles (TSE/BSE) : Les conditions identiques avec MANC® sont appliquées.

7. Distributeur

SanaCare Gesundheitsprodukte GmbH & Co.KG, Sandwiesenstr. 32, 64665 Alsbach-Hähnlein, www.sanacare-world.com, info@sanacare-world.com, Téléphone: +49 6257 503300

8. Fabricant de produits médicaux

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany

Téléphone: +49 39401 632-0, Télécopie: +49 39401 632-199

Adresse e-mail: info@froximun.de

Date de la dernière révision de la notice : 2018-06-01

200g la polvere

Principio attivo: MANC® (zeolite clinoptilolite naturale)

Leggere attentamente le istruzioni complete prima di iniziare ad assumere il dispositivo medico.

- Conservare le istruzioni per l'uso per poterle consultare in un secondo momento.
- Per eventuali domande consultare il medico, terapeuta, farmacista o direttamente la FROXIMUM AG come produttore.
- Questo dispositivo medico non è soggetto a prescrizioni e può essere venduto liberamente.

1. Cos'è SanaMin e per cosa serve?

SanaMin in polvere è un dispositivo medico naturale con il principio attivo minerale MANC®, una zeolite clinoptilolite naturale con l'aggiunta di carbonato di calcio e di magnesio. Serve a rafforzare la barriera intestinale in caso di sforzi fisici ripetuti. Il principio attivo MANC® passa nel tratto digestivo dove svolge la sua azione fisica e non viene metabolizzato.

2. Cosa bisogna considerare prima dell'assunzione di SanaMin?

- Aprire la scatola appena prima dell'assunzione, prima di versare la polvere nel liquido.
- Richiudere sempre bene il barattolo dopo l'uso.
- Prelevare la polvere con un cucchiaino asciutto e pulito.
- Se si utilizza il cucchiaino dosatore in dotazione, pulirlo prima di riutilizzarlo.

Evitare l'assunzione di SanaMin nei seguenti casi:

- allergie o ipersensibilità verso uno o più ingredienti. (vedi punto 6: ingredienti ed eccipienti)
- Per mancanza di ulteriori studi su donne in gravidanza e durante l'allattamento è opportuno evitare l'assunzione del dispositivo medico SanaMin durante la gravidanza e l'allattamento.

L'assunzione di SanaMin richiede particolare attenzione:

- in casi rari l'assunzione di SanaMin in polvere può causare costipazione o flatulenza. (raramente: può colpire da 1 a 1000 persone trattate)
- Se si soffre di costipazione cronica assumere SanaMin in polvere con particolare attenzione. In questi casi consultare il medico, il terapeuta o il farmacista prima dell'assunzione.
- Prestare sempre attenzione a una corretta idratazione durante l'assunzione di SanaMin in polvere, per evitare effetti di costipazione.
- Non esistono sufficienti dati sulla somministrazione di SanaMin ai bambini. Pertanto si consiglia l'uso ai bambini di età inferiore ai 12 anni.
- In caso di tendenza alla formazione di calcoli renali si prega di consultare un medico prima dell'assunzione.

Assunzione di SanaMin insieme a farmaci:

Per evitare interazioni indesiderate con i farmaci rispettare una pausa di 2 ore poiché non esistono studi sistematici riguardo alle interazioni o influenze da farmaci indotte dall'assunzione di SanaMin in polvere. In caso di assunzione di farmaci consultare il medico o il terapeuta per definire l'intervallo di assunzione di SanaMin.

3. Come va assunto SanaMin?

- Salvo prescrizioni diverse del medico o del terapeuta, versare 1-2 cucchiaini di polvere SanaMin PLUS ca. 30 minuti prima dei pasti in abbondante liquido (ca. 200 ml d'acqua), mescolare e bere direttamente.
- Non superare una quantità giornaliera di 2 cucchiaini.
- Se si desidera modificare la quantità da assumere, consultare il medico o il terapeuta.

Durata del trattamento

La durata del trattamento con SanaMin non deve superare i 30 giorni. In caso di assunzione ripetuta sospendere almeno una settimana prima di ripetere il ciclo.

Contromisure in caso di assunzione errata, sovradosaggio ed effetti collaterali:

Nel caso di assunzione di una quantità superiore rispetto al dosaggio previsto possono manifestarsi effetti collaterali. In questi casi si consiglia di ridurre la quantità da assumere a un massimo di un cucchiaino al giorno oppure di interrompere il trattamento e aumentare l'assunzione di liquidi. In caso di effetti collaterali persistenti interrompere l'assunzione e consultare il medico o il terapeuta.

4. Quali sono gli effetti collaterali noti?

In casi rari si possono manifestare costipazioni e flatulenze (raramente: può colpire da 1 a 1000 persone trattate).

Segnalazione di effetti collaterali

In caso di comparsa di uno degli effetti collaterali elencati o in presenza di altri effetti collaterali che non sono indicati nelle presenti istruzioni informare il medico, terapeuta, farmacista e/o l'indirizzo e-mail della FROXIMUM AG di seguito riportato o contattarci al numero di servizio indicato.

Produttore e ufficio
di registrazione:
Telefono:
Fax:
E-mail Vendite:
E-mail Produttore del
prodotto medicinale:

FROXIMUM AG, Neue Straße 2a,
38838 Schlanstedt, Germania
+49 39401 632-0
+49 39401 632-199
anwender@froximun.de
info@sanacare-world.com

5. Come va conservato SanaMin?

- tenere lontano dalla portata dei bambini
- conservare in luogo asciutto a temperatura tra 5°C e 40°C
- tenere al riparo dai raggi diretti del sole
- non usare più a lungo del tempo indicato
- scadenza: vedi scatola o stampa in rilievo/stampa sul fondo della confezione

6. Ulteriori informazioni**Ingredienti ed eccipienti**

- Contenuto della confezione: 1 scatola con 200g di polvere, 1 cucchiaino, informazioni per l'uso
- Ingredienti: MANC® (zeolite clinoptilolite naturale), carbonato di calcio e di magnesio

Informazioni su MANC®:

- naturale al 100%, senza glutine, senza lattosio
- Il principio attivo è un alluminosilicato modificato.
- kosher, halal: Confermiamo che il prodotto MANC® viene realizzato con un processo da materie prime minerali. Il prodotto non contiene ingredienti di origine animale, sangue e suoi derivati o alcol.
- Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE/BSE): per la produzione di MANC® vengono usate esclusivamente materie prime minerali.

Informazioni sul carbonato di calcio e di magnesio:

- è privo di allergeni
- riconosciuto come kosher e halal
- Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE/BSE): valgono le stesse condizioni indicate per MANC®.

7. Vendite

SanaCare Gesundheitsprodukte GmbH & Co.KG, Sandwiesenstr. 32, 64665 Alsbach-Hähnlein, www.sanacare-world.com, info@sanacare-world.com, tel.: +49 6257 503300

8. Produttore del prodotto medicinale

FROXIMUM® AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
tel.: +49 39401 632-0; fax: +49 39401 632-199

E-mail: info@froximun.de

Ultimo aggiornamento delle informazioni per l'uso: 2018-06-01

200g powder

Active substance: MANC® (natural zeolite clinoptilolite)

Read these instructions for use completely and carefully before you begin taking this medical product.

- Keep the instructions for use: you may want to read them again later.
- If you have further questions, please contact your physician, therapist, or pharmacist or contact the manufacturer FROXIMUM AG directly.
- This medical product is an over-the-counter product and does not require a prescription.

1. What is SanaMin and what is it used for?

SanaMin in powder form is a natural medical product containing the mineral substance MANC®, a natural zeolite known as clinoptilolite with the PLUS of added calcium carbonate and magnesium carbonate. It is used for strengthening the barrier of the intestinal wall in the event of recurring physical stress. The active substance MANC® moves through the digestive tract, begins working there and is not metabolized.

2. What do you need to know before taking SanaMin?

- Open the bottle immediately before you use it, i.e. before stirring the powder into liquid.
- Please ensure that the bottle is always properly closed.
- Remove the powder using a clean, dry spoon.
- If you use the enclosed dosing spoon, clean it before you re-use it.

SanaMin may not be taken:

- if you have a known allergy or intolerance to one or more of the ingredients (see item 6: Ingredients and components).
- Due to a lack of research on pregnant women and nursing mothers, SanaMin medical products should not be used during pregnancy or lactation.

Special caution must be exercised when taking SanaMin in the following cases:

- In rare cases the use of SanaMin in powder form can lead to constipation or bloating (rare: may affect up to 1 in 1,000 patients).
- If you suffer from chronic constipation, you should exercise particular caution when taking SanaMin in powder form. In such cases, please consult your physician, therapist or pharmacist before taking SanaMin.
- Ensure that you always drink plenty of liquid when taking SanaMin in powder form to prevent constipation.
- There are no adequate data on the use of SanaMin by children, so that it is not recommended for use by children below the age of 12 years.
- If you are predisposed to kidney stone formation, please consult a physician before using this product.

When taking SanaMin with medications:

To prevent adverse interactions with medications, an interval of 2 hours between taking SanaMin and any medication should be maintained, as there are no systematic studies on interactions with or influences on medications resulting from the use of SanaMin in powder form. Should you take medication, please consult your physician or therapist with regard to the intervals between taking SanaMin and medications.

3. How to take SanaMin

- Unless otherwise prescribed by your physician or therapist, stir 1 - 2 measuring spoons of SanaMin PLUS powder into plenty of liquid (approx. 200 ml of water) 30 minutes before a meal and drink immediately.
- Do not exceed a maximum daily dosage of 2 measuring spoons.
- Should you wish to change the amount you take, please consult your physician or therapist beforehand.

Duration of use

The duration of treatment with SanaMin should not exceed 30 days. If treatment is repeated, use of SanaMin should be discontinued for at least one week before beginning a new period of use.

Countermeasures in the event of errors in use, overdose and side effects:

If you inadvertently take more than the prescribed dosage, more severe side effects may occur. In these cases, a reduction of the dosage to a maximum of 1 measuring spoon per day is recommended, or if necessary discontinue use, and increase your fluid intake. In the event of persistent adverse effects, stop using SanaMin and consult your physician or therapist.

4. Known side effects

In rare cases the use of SanaMin in powder form can lead to constipation or bloating (rare: may affect up to 1 in 1,000 patients).

Reports of side effects:

If one of the listed side effects causes you considerable difficulty or you experience side effects that are not listed in these instructions for use, please inform your physician, therapist, pharmacist and/or send an e-mail to the address listed for FROXIMUM AG or contact us at one of the service phone numbers listed there.

Manufacturer and notified body: FROXIMUM AG, Neue Strasse 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
Phone: +49 39401 632-0
Fax: +49 39401 632-199
Manufacturer's e-mail: anwender@froximun.de
Sales Department e-mail: info@sanacare-world.com

5. How to store SanaMin?

- Keep out of reach of children!
- Store in a dry place at temperatures between 5°C-40°C.
- Keep out of direct sunlight.
- Do not use past the expiry date.
- Use by: See folding box or stamp/printing on the bottom of the jar.

6. Further information**Ingredients and other components:**

- Package contents: 1 jar with 200 g powder, 1 measuring spoon, Information for Use
- Contents: MANC® (natural zeolite clinoptilolite), calcium carbonate, magnesium carbonate

Information about MANC®:

- 100% natural, gluten-free, lactose-free
- The active substance is a modified aluminosilicate.
- Classified as kosher/halal: We herewith confirm that the MANC® product is manufactured from mineral raw materials. The product does not contain any alcohol, animal substances, blood or by-products thereof.
- Transmissible/bovine spongiform encephalopathies (TSE/BSE): Only raw materials of mineral origin are used in the production of MANC®.

Information on calcium carbonate, magnesium carbonate:

- Allergen-free
- Classified as kosher and halal
- Transmissible/bovine spongiform encephalopathies (TSE/BSE): The same conditions apply as for MANC®.

7. Sales

SanaCare Gesundheitsprodukte GmbH & Co.KG, Sandwiesenstr. 32, 64665 Alsbach-Hähnlein, www.sanacare-world.com, info@sanacare-world.com
Phone: +49 6257 503300

8. Manufacturer

FROXIMUM® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt, Phone: +49 39401 632-0, Fax: +49 39401 632-199, e-mail: info@froximun.de

These instructions for use were last revised on: 2018-06-01

FROXIMUN® AG Medizinprodukte für Ihre Gesundheit	Kunde / Client SanaCare Gesundheitsprodukte GmbH & Co.KG, Sandwiesenstr. 32, 64665 Alsbach-Hähnlein, www.sanacare-world.com ,	Freigabevermerk: Release note <input type="checkbox"/> Druckreif Approved <input type="checkbox"/> Neue Korrektur-vorschläge / New proof requiered
FROXIMUN AG Neue Straße 2a D-38838 Schlanstedt Tel.: 039401 632-0 Tel.: 039401 632-199 www.froximun.de	Auftr-Nr: Order-No.:	Datum / Unterschrift: Data/Signature
Produkt / Sorte: Product: SanaMin 200g Pulver / Beipackzettel		
Korrekturabzug-Nr.: Abzug 4 vom 04.06.2018	Ausdruck nicht farbverbindlich! <input checked="" type="checkbox"/> X	