

143,5 mm

Background limit (overflow 3mm)

Cut

Text limit

Qualität ohne Kompromisse

Novalac stellt höchste Qualitätsansprüche an die Herkunft der Inhaltsstoffe sowie deren Verarbeitung. Im Zentrum der Novalac Forschung stehen mit einer jahrzehnte langen Erfahrung und Kompetenz in der pädiatrischen Ernährungswissenschaft, die Entwicklung und das optimale Wachstum von Babys. **Novalac V** ist Teil eines individuellen Sortiments von Säuglingsmilchnahrungen, die auf den gesamten Ernährungsbedarf von Säuglingen in den verschiedenen Entwicklungsphasen und deren besonderen Anforderungen abgestimmt sind.

ANWENDUNG

Novalac V ist geeignet zur diätetischen Behandlung von Verstopfung im Säuglingsalter, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird. **Novalac V** fördert auf natürliche Weise – durch einen hohen Gehalt an Lactose und Magnesium – die Verdauung und die Bildung eines weichen Stuhls.

DOSIERUNG

Alter (Monate)	0-1	1-2
Säuglingsgewicht (kg)	4	5
Anzahl Fläschchen pro Tag	6-7	5
Anzahl Messlöffel	3-4	4
Abgekochtes Wasser (ml)	90-120	120

	2-3	3-4	4-5	5-6	>6
	6	6,5	7	7,5	>7,5
	5	5	4	4	3*
	4-5	6	6-7	6-7	7
	120-150	180	180-210	180-210	210

*bei zusätzlicher Nahrungsaufnahme
 Standardauflösung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
 1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g **Novalac V**.
 Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt sollen Mengen und Anzahl aller Tagesmahlzeiten auf die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Bitte halten Sie die Dosierungsempfehlungen genau ein.

WICHTIGE HINWEISE

Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby! **Novalac V** ist geeignet zur ausschließlichen Ernährung von Säuglingen bis zum 6. Lebensmonat. Ab dem 6. Monat sollte **Novalac V** in Absprache mit dem Kinderarzt mit Breimahlzeiten kombiniert werden. **Novalac V** sollte aus der Ernährung von Säuglingen ohne Verstopfung ausgeschlossen werden. Im Fall einer Kuhmilch-Eiweißallergie, niedrigem Geburtsgewicht oder bei Säuglingen mit geschwächtem Immunsystem, wenden Sie sich bitte an Ihren Kinderarzt. **Novalac V** nur unter medizinischer Kontrolle verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck. Nach Öffnung der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen und kühl und trocken aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschen-nahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zur diätetischen Behandlung von Verstopfung.

Ein Produkt von **UP Euronord SA**
 ICC, Route de Pré-Bois 20, Case Postale 1876
 1215 Genf – Schweiz

Vertrieb durch **careforce pharma GmbH**
 Horbeller Straße 11, D-50858 Köln
 www.novalac.de

e 800 g



Unter Schutzatmosphäre verpackt

Novalac



Verstopfung



800 g

Spezialnahrung für Babys mit Verstopfung

0-12 Monate

ZUSAMMENSETZUNG

im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung	100 kcal
Energie	kcal 507	65,9	100
	kJ 2122,9	276	418,7
Fett davon	g 25,5	3,3	5
- gesättigt	g 12,4	1,6	2,4
- einfach ungesättigt	g 6,5	0,8	1,3
- mehrfach ungesättigt	g 5,3	0,7	1
Kohlenhydrate davon	g 58,2	7,6	11,5
- Lactose	g 58,2	7,6	11,5
Eiweiß	g 11	1,4	2,2
Natrium	g/mg 0,375/150	0,05/19,5	0,07/29,6

Mineralstoffe

Kalium	mg	450	58,5	88,8
Chlorid	mg	310	40,3	61,1
Calcium	mg	390	50,7	76,9
Phosphor	mg	200	26	39,4
Magnesium	mg	65	8,5	12,8
Eisen	mg	6	0,8	1,2
Zink	mg	4,5	0,6	0,9
Jod	µg	65	8,5	12,8
Kupfer	µg	400	52	78,9
Mangan	µg	35	4,6	6,9
Selen	µg	10	1,3	2
Fluorid	µg	<450	<59	<89

Vitamine

A	µg RE	450	58,5	88,8
B1	µg	400	52	78,9
B2	µg	800	104	157,8
B6	µg	300	39	59,2
B12	µg	1,5	0,2	0,3
C	mg	60	7,8	11,8
D3	µg	7,5	1	1,5
E	mg α-TE	12,8	1,7	2,5
K1	µg	30	3,9	5,9
Niacin	mg	4,5	0,6	0,9
Pantothenäure	mg	2,4	0,3	0,5
Folsäure	µg	60	7,8	11,8
Biotin	µg	15	2	3
Cholin	mg	100	13	19,7
Inositol	mg	45	5,9	8,9
Taurin	mg	44	5,7	8,7
L-Carnitin	mg	8	1	1,6

Beratungshotline 0800-6682522 (kostenlos)
 www.novalac.de

ZUTATEN

Magermilchpulver, entmineralisiertes Molkepulver (Milch), pflanzliche Öle (Palm-, Soja- und Kokosnussöl), Lactose (Milch), Calciumchlorid, Emulgator (Sojalecithin), Trikaliumcitrat, Vitamine (A, B1, B2, B6, C, D3, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothenäure), Calciumcitrat, Trinatriumcitrat, Kaliumhydroxid, Magnesiumoxid, Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Tocopherole), Maltodextrin, Kupfersulfat, L-Carnitin, Inositol, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Cholinbitartrat.

ZUBEREITUNG

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten.



1 Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen. Oder kohlenstoffarmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.



2 Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufte – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.



3 Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.



4 Temperatur (37°C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.