

GEBRAUCHSINFORMATION

BIOCHEMIE PFLÜGER®

Nr. 13 Kalium arsenicosum D 6

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält: Wirkstoff:

Kalium arsenicosum Trit. D 6 (HAB, V. 6) 250,0 mg.

Sonstige Bestandteile: Calciumbehenat (DAB),
Kartoffelstärke.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose.

Bitte nehmen Sie es daher erst nach Rücksprache mit
Ihrem Arzt oder Therapeuten ein, wenn Ihnen bekannt
ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber
bestimmten Zuckern leiden.



**Kalium
arsenicosum
D 6**

13

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne
Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei Fortdauern der Krankheitssymptome während der An-
wendung soll medizinischer Rat eingeholt werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Apothekenpflichtig

Nach Anbruch bitte kühl und trocken lagern.
Das Behältnis fest verschlossen halten.

Das Arzneimittel nach Ablauf des Verfalldatums nicht
mehr anwenden!

Reg.-Nr. 57894.00.00

Inhalt: 400 Stück
Tabletten zum Einnehmen.

05.20



Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller:
Homöopathisches Laboratorium
Alexander Pflüger GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 4
D-33378 Rheda-Wiedenbrück



PFLÜGER
SCHÜBLER-SALZE



PZN -06321320

Ch.-B.:

Verwendbar bis:



Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Kindern unter 6 Monate.

Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit berücksichtigen?

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt um Rat.

Wechselwirkungen: keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

Dosierung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit das Arzneimittel nicht anders verordnet wurde:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 1 Tablette ein.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3 mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. Lassen Sie die Tablette langsam im Mund zergehen.

Kinder von 6 bis zu 12 Monaten erhalten, nach Rücksprache mit einem Arzt, ein Drittel der Erwachsenenendosis. Kinder ab 1 Jahr bis unter 6 Jahren erhalten die Hälfte und Kinder ab 6 bis unter 12 Jahren zwei Drittel der Erwachsenenendosis. Dazu wird jeweils 1 Tablette in 6 Teelöffeln Wasser aufgelöst.

Von dieser Lösung erhalten Kinder

- von 6 bis zu 12 Monaten: 2 Teelöffel,
- ab 1 Jahr bis unter 6 Jahren: 3 Teelöffel,
- ab 6 bis unter 12 Jahren: 4 Teelöffel.

Die Einnahme erfolgt bei akuten Beschwerden alle halbe bis ganze Stunde (höchstens 6 mal täglich), in chronischen Fällen 1 - 3 mal täglich.

Der Rest der Lösung ist jeweils wegzuschütten.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen: keine bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Weitere erhältlichliche Packungsgröße:
100 Tabletten.

Zusätzliche Darreichungsform:
30 ml Tropfen.

Stand der Information: Februar 2019