

Liebe Patientin, lieber Patient !

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation**H&S® Reizhustentee****Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Pflanzliches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Zur Reizlinderung bei Schleimhautentzündungen der oberen Luftwege und damit verbundenem trockenem Husten.

Hinweis:

Die Dauer der Anwendung sollte ohne ärztlichen Rat 4 bis 6 Wochen pro Jahr nicht überschreiten.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie H&S® Reizhustentee nicht anwenden ?

Durch Gallenstauung entstandene Lebererkrankungen, Leberzirrhose, Bluthochdruck, Verminderung des Kaliumgehaltes im Blut, schwere Nierenfunktionsschwäche, Schwangerschaft; Überempfindlichkeit gegen Anis und Anethol.

Warnhinweis: Zur Anwendung von H&S® Reizhustentee bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor.

Die Einnahme von H&S® Reizhustentee bei Kindern unter 12 Jahren wird daher nicht empfohlen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von H&S® Reizhustentee ?

Kaliumverluste durch andere Arzneimittel, z. B. Thiazid- und Schleifendiuretika können verstärkt werden.

Durch Kaliumverlust nimmt die Empfindlichkeit gegen Digitalisglykoside zu.

Hinweis:

Die Resorption anderer, gleichzeitig eingenommener Arzneimittel kann verzögert werden.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt H&S® Reizhustentee nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da

H&S® Reizhustentee sonst nicht richtig wirken kann !

Wieviel und wie oft sollten Sie H&S® Reizhustentee einnehmen ?

Soweit nicht anders verordnet, wird 3- bis 4 mal täglich eine Tasse des Teeaufgusses getrunken.

Wie und wann sollten Sie H&S® Reizhustentee einnehmen ?

1 Filterbeutel für 1 Glas/Tasse. Mit kochendem Wasser übergießen und bedeckt etwa 10-15 Minuten ziehen lassen. Filterbeutel herausnehmen und schwach ausdrücken.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von H&S® Reizhustentee auftreten ?

Bei längerer Anwendung und höherer Dosierung können mineralkortikoide Effekte in Form einer Natrium- und Wasserzurückhaltung, Kaliumverlust mit Bluthochdruck, Gewebewasseransammlungen, Verminderung des Kaliumgehaltes im Blut mit Muskelschwäche und in seltenen Fällen Rotfärbung des Urins durch Beimengung von Myoglobin auftreten. Gelegentlich kann es zu allergischen Reaktionen der Haut, der Atemwege und des Magen-Darm-Traktes kommen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Zusammensetzung: 100 g Tee enthalten

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Eibischblätter	Althaeae folium	35 g
Eibischwurzeln	Althaeae radix	25 g
Süßholzwurzeln	Liquiritiae radix	25 g
Anis	Anisi fructus	15 g

Darreichungsform und Inhalt: Originalpackung mit:

20 Filterbeutel a 2,5 g Arzneitee zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.

Stand der Information: 10.2015**H&S® Reizhustentee**

Zul.-Nr.: 1969.99.99

OP: 20 Filterbeutel à 2,5 g, Gesamt-Füllgewicht 50 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

H&S Tee-Gesellschaft mbH & Co. · Im Haidach 1 · D-88079 Kressbronn/Bodensee · www.Arzneitee.de

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist rechts unten aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum !

Aufbewahrungshinweise:

In der Originalpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen. Nicht über 25°C aufbewahren. Arzneimittel - Für Kinder unzugänglich aufbewahren.