

FR

GEL À FORMULE AVANCÉE POUR CICATRICES

KELO-COTE® Gel est un gel de silicone transparent pour le traitement des cicatrices excessives qui sèche automatiquement grâce à sa texture légère. **KELO-COTE® Gel** sèche rapidement pour former un film de gel de silicone souple et imperméable à l'eau qui crée une barrière protectrice contre l'invasion chimique, physique et microbienne de la cicatrice tout en contribuant à l'hydratation de la peau. Ce gel crée un environnement favorable à la maturation de la cicatrice en normalisant la synthèse du collagène et l'améliore l'apparence physiologique et esthétique de la cicatrice excessives. Il a été démontré que **KELO-COTE® Gel** aplanit, assouplit et atténue les cicatrices excessives, soulage les démangeaisons ainsi que la douleur et l'inconfort associés aux cicatrices et réduit également leur coloration.

Les gels de silicone ont une efficacité démontrée dans le traitement d'une cicatrization anormale, comme les cicatrices hypertrophiques et chéloïdes. Les recommandations cliniques internationales sur la prise en charge des cicatrices, publiées en 2014, préconisent l'utilisation de silicones comme thérapie de première intention pour le traitement des cicatrices hypertrophiques linéaires, des chéloïdes mineurs et pour la prévention des cicatrices hypertrophiques.*

Utilisation :

KELO-COTE® Gel est indiqué pour le traitement et la prévention de cicatrices hypertrophiques et chéloïdes, résultant d'interventions chirurgicales générale, de traumatismes ou de brûlures.

KELO-COTE® Gel convient pour une application sur le visage et le corps. **KELO-COTE® Gel** peut être utilisé sur les articulations, les plis de flexion, les zones poilues et les cicatrices couvrant une grande surface à la suite de brûlures ou d'un traumatisme majeur. **KELO-COTE® Gel** peut être utilisé chez l'enfant de plus de 3 mois et chez les personnes ayant la peau sensible.

Conseils d'utilisation :

S'assurer que la zone d'application est propre et sèche. Dans le cas du tube de 60 g, retirer le capuchon et l'opercule avant l'application. Pour les tubes de 6 g et 15 g, découper l'extrémité de l'embout applicateur avec des ciseaux propres avant l'application. Appliquer **KELO-COTE® Gel** deux fois par jour, avec un doigt propre en une couche très mince, puis laisser sécher à l'air. Pour un effet maximal, **KELO-COTE® Gel** doit rester en contact avec la peau pendant 24 h. Une fois sec, **KELO-COTE® Gel** peut être recouvert d'une couche d'écran solaire ou de produits cosmétiques. Revisser le capuchon après utilisation.

Si **KELO-COTE® Gel** n'est pas sec en 4 ou 5 minutes, la couche appliquée est probablement trop épaisse. Enlever délicatement l'excédent pour permettre le séchage.

La durée de traitement minimum recommandée est de 2 à 3 mois. Dans le cas de cicatrices plus étendues et plus anciennes, la durée du traitement pourra être prolongée et il est recommandé de continuer le traitement si des améliorations sont encore observées après les 3 premiers mois.

Attention :

Réservez exclusivement à un usage externe. Ne pas utiliser en cas d'allergie à un des composants de **KELO-COTE® Gel**. Éviter le contact direct avec les yeux, les muqueuses, les brûlures du troisième degré et les plaies ouvertes. **KELO-COTE® Gel** ne doit pas être utilisé sur des affections dermatologiques qui perturbent l'intégrité de la peau. En cas d'irritation, interrompre l'utilisation et consulter un médecin.

KELO-COTE® Gel peut tacher les vêtements s'il n'est pas complètement sec. Tenir à l'écart des sources d'inflammation et ne pas fumer pendant l'application et le séchage du produit.

Ce produit doit être conservé hors de la portée des enfants. Conserver à une température inférieure à 25 °C. Ne pas utiliser après la date de péremption (EXP) imprimée sur le tube.

Ingédients : Cyclopentasiloxane, Diméthicone, Silica, Diméthicone Crosspolymer

Conditionnements : 6 g, 15 g, 30 g & 60 g

Le numéro de lot et la date d'expiration du produit sont imprimés au-dessous du carton.

www.kelocote.fr

Fabricant :

 Advanced Bio-Technologies, Inc, 4830 West Kennedy Blvd, Suite 600, Tampa, Florida 33609, Etats-Unis

 Alliance Pharma S.r.l., Viale Restelli 5, 20124 Milan, Italie

Brevet US n° 5,741,509

Brevet européen n° 1439866, 1409034

*Gold MH et al. Dermatol Surg 2014;40: 825-831

EN

ADVANCED FORMULA SCAR TREATMENT

KELO-COTE® Gel is a lightweight, transparent, self-drying silicone gel for the treatment of scars. **KELO-COTE® Gel** rapidly dries to form a flexible, waterproof sheet which forms a protective barrier against chemical, physical and microbial invasion of the scar site while assisting with hydration. This creates an environment which allows the scar to mature through normalised collagen synthesis and helps improve the physiological and cosmetic appearance of the scar.

KELO-COTE® Gel has been shown to flatten, soften and smooth scars, relieve the itching, discomfort and pain of scars, as well as reduce the discolouration associated with scars.

Silicone gels have been shown to be effective in treating abnormal scarring in the form of hypertrophic scars and keloids. The 2014 International Clinical Recommendations on Scar Management supports the use of silicones as the preferred first line therapy for the treatment of linear hypertrophic scars, minor keloids and in the prevention of hypertrophic scars.*

Intended use:

KELO-COTE® Gel is for the treatment and prevention of hypertrophic and keloid scars resulting from burns, general surgical procedures and trauma wounds.

KELO-COTE® Gel is suitable for use on the face and body. **KELO-COTE® Gel** can be used on joints, flexures, hairy areas and large area scars such as those caused by burns or major trauma. **KELO-COTE® Gel** is suitable for use on children over the age of 3 months and people with sensitive skin.

Directions for use:

Ensure that the affected area is clean and dry. If using the 60g tube, remove cap and peel off foil before application. For the 6g and 15g tube, cut the tip of the nozzle with clean scissors before application. Apply **KELO-COTE® Gel** to the area using a clean finger twice daily as a very thin layer and allow to dry. For maximum effect, **KELO-COTE® Gel** should have 24 hour contact with the skin. Once dry, **KELO-COTE® Gel** can be covered with sun block or cosmetics. Replace cap after use.

If **KELO-COTE® Gel** has not dried within 4-5 minutes, you have probably used too much. Gently remove the excess and allow the drying process to continue.

Recommended minimum treatment time is 60-90 days. Larger and older scars may take longer and continued use is recommended if improvement is still seen after the initial 90 days.

Caution:

For external use only. Do not use if you are hypersensitive to any of the ingredients in **KELO-COTE® Gel**. Avoid direct contact with eyes, mucous membranes, third degree burns and open wounds. **KELO-COTE® Gel** should not be used on dermatological conditions that disrupt the integrity of the skin. If irritation occurs, discontinue use and consult your physician.

KELO-COTE® Gel may stain clothing if it is not completely dry. Keep away from sources of ignition and do not smoke while applying the product or while the product is drying.

Keep out of the reach of children. Store below 25°C. Do not use after the expiration (EXP) date printed on the tube.

Ingredients: Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Silica, Dimethicone Crosspolymer

Contents: 6g, 15g, 30g & 60g

Lot number and Expiry date are printed on the base of the carton.

www.kelo-cote.co.uk

Manufacturer:

 Advanced Bio-Technologies, Inc, 4830 West Kennedy Blvd, Suite 600, Tampa, Florida 33609, USA

 Alliance Pharma S.r.l., Viale Restelli 5, 20124 Milano, Italy

US Patent 5,741,509

Eur. Patent-Nr. 1439866, 1409034

*Gold MH et al. Dermatol Surg 2014;40: 825-831

IT

FORMULA AVANZATA PER IL TRATTAMENTO DELLE CICATRICI

KELO-COTE® Gel è un gel di silicone, trasparente e autoasciugante per il trattamento delle cicatrici. **KELO-COTE® Gel** asciuga rapidamente formando una pellicola flessibile e impermeabile all'acqua che crea una barriera protettiva verso agenti chimici, fisici e microbici e nello stesso tempo contribuisce all'idratazione della pelle. Questo gel crea un ambiente che favorisce la maturazione della cicatrice normalizzando la sintesi del collagene e migliorando l'aspetto estetico della cicatrice.

KELO-COTE® Gel riduce, attenua e rende più lisce le cicatrici, allevia il prurito, il disagio e il dolore associato alle cicatrici e ne riduce le alterazioni di colore.

I gel di silicone si sono dimostrati efficaci nel trattamento di cicatrizzazioni anomale sotto forma di cicatrici ipertrofiche e cheloidi. Le Linee Guida Cliniche Internazionali del 2014 per la gestione delle cicatrici raccomandano l'uso dei siliconi come terapia elettiva di prima linea nel trattamento delle cicatrici ipertrofiche lineari e dei cheloidi di minore entità nonché nella prevenzione delle cicatrici ipertrofiche.*

Uso previsto:

KELO-COTE® Gel è indicato per il trattamento e la prevenzione delle cicatrici ipertrofiche e cheloidi conseguenti a traumi, ferite accidentali, interventi chirurgici e ustioni.

KELO-COTE® Gel è adatto al viso e al corpo. **KELO-COTE® Gel** può essere utilizzato su articolazioni, a livello delle pieghe e sulle zone pilifere e cicatrici estese come quelle causate da ustioni o traumi importanti. **KELO-COTE® Gel** è adatto per l'uso nei bambini con più di 3 mesi di età e nelle persone con pelle sensibile.

Istruzioni per l'uso:

Assicurarsi che l'area interessata sia pulita e asciutta. Se si usa il tubetto da 60 g, rimuovere il tappo e la protezione di alluminio prima dell'uso. Per i tubetti da 6 g e da 15 g, tagliare la punta dell'applicatore con forbici pulite prima dell'applicazione. Applicare **KELO-COTE® Gel** sulla zona usando un dito pulito due volte al giorno in uno strato molto sottile e lasciare asciugare. Per ottenere il massimo dell'effetto, **KELO-COTE® Gel** deve restare in contatto con la pelle per 24 ore. Una volta asciugato, sulla zona interessata si possono applicare prodotti con protezione solare o cosmetici. Rimettere il tappo dopo l'uso.

Se **KELO-COTE® Gel** non è asciugato entro 4-5 minuti, probabilmente ne è stato usato troppo. Rimuovere delicatamente l'eccesso e lasciare proseguire il processo di asciugatura.

Il tempo minimo di trattamento raccomandato è di 60-90 giorni. Cicatrici più grandi e più vecchie possono richiedere più tempo e se il miglioramento della cicatrice è visibile, si raccomanda di prolungare l'uso del prodotto dopo i primi 90 giorni di applicazione.

Avvertenze:

Solo per uso esterno. Non usare in caso di ipersensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti di **KELO-COTE® Gel**. Evitare il contatto diretto con occhi, mucose, ustioni di terzo grado e ferite aperte. **KELO-COTE® Gel** non deve essere usato in condizioni dermatologiche che compromettono l'integrità della pelle. In caso di irritazione, interrompere l'uso e consultare il medico.

KELO-COTE® Gel può macchiare gli indumenti se non è completamente asciutto. Tenere lontano da fonti di calore e non fumare quando si applica il prodotto o mentre il prodotto asciuga. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura inferiore a 25 °C. Non utilizzare dopo la data di scadenza (SCAD) stampata sulla confezione.

Ingredienti: Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Silica, Dimethicone Crosspolymer

Confezioni: 6 g, 15 g, 30 g e 60 g

Il numero di lotto e la data di scadenza sono stampati sul fondo dell'astuccio

www.kelocote.it

Fabbricante:

 Advanced Bio-Technologies, Inc, 4830 West Kennedy Blvd, Suite 600, Tampa, Florida 33609, Stati Uniti

 Alliance Pharma S.r.l., Viale Restelli 5, 20124 Milano, Italia

Brevetto statunitense 5,741,509

Brevetto Eur. N. 1439866, 1409034

*Gold MH et al. Dermatol Surg 2014;40: 825-831

FÓRMULA AVANZADA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS CICATRICES

KELO-COTE® Gel es un gel de silicona ligero, transparente y que se seca solo, indicado para el tratamiento de las cicatrices. **KELO-COTE® Gel** se seca rápidamente formando una película flexible y resistente al agua, que constituye una barrera protectora frente a la invasión química, física y microbiana de la cicatriz, a la vez que colabora en la hidratación de esta. De esta forma se crea un entorno que permite que la cicatriz madure mediante la síntesis normal de colágeno, y mejora el aspecto fisiológico y estético de la cicatriz.

Se ha demostrado que **KELO-COTE® Gel** aplana, suaviza y alisa las cicatrices, que alivia el picor, las molestias y el dolor de estas, y que también reduce el cambio de color que se asocia a ellas.

Se ha demostrado que los geles de silicona son eficaces como tratamiento de las cicatrices anómalas, tanto de las cicatrices hipertróficas como de los queloides. Las recomendaciones clínicas internacionales de 2014 sobre el tratamiento de las cicatrices respaldan el uso de siliconas como tratamiento de primera línea para las cicatrices hipertróficas de tipo lineal, queloides menores y para prevenir las cicatrices hipertróficas.*

Uso previsto:

KELO-COTE® Gel está indicado en el tratamiento y la prevención de las cicatrices hipertróficas y de los queloides ocasionados por quemaduras, intervenciones quirúrgicas en general y heridas por traumatismo.

KELO-COTE® Gel puede usarse en la cara y en el cuerpo. **KELO-COTE® Gel** puede usarse en las articulaciones, los pliegues, las zonas con vello y las cicatrices grandes, como las causadas por quemaduras o por traumatismos importantes. **KELO-COTE® Gel** es adecuado para niños mayores de 3 meses y para personas con piel sensible.

Instrucciones de utilización:

Compruebe que la zona afectada está limpia y seca. Si utiliza el tubo de 60 g, quite el tapón y arranque la película de aluminio antes de aplicar el producto. Para los tubos de 6 g y de 15 g, corte la punta de la boquilla con unas tijeras limpias antes de aplicar el producto. Aplique una capa muy delgada de **KELO-COTE® Gel** en la zona con un dedo limpio dos veces al día, y deje que se seque. Para que el efecto sea máximo, **KELO-COTE® Gel** debe estar en contacto con la piel durante 24 horas. Una vez seco, **KELO-COTE® Gel** puede cubrirse con protector solar o con maquillaje. Vuelva a poner el tapón después de utilizarlo.

Si **KELO-COTE® Gel** no se ha secado en 4-5 minutos, probablemente haya puesto demasiado producto. Retire el sobrante con suavidad y deje que siga el proceso de secado.

La duración mínima recomendada del tratamiento es de 60 a 90 días. Las cicatrices grandes y antiguas pueden tardar más; se recomienda seguir aplicando el producto si se aprecia mejoría pasados los primeros 90 días.

Precaución:

Exclusivamente para uso externo. No debe utilizarse en caso de sensibilidad a cualquiera de los componentes de **KELO-COTE® Gel**. Evite el contacto directo con los ojos, las mucosas, las quemaduras de tercer grado y las heridas abiertas. **KELO-COTE® Gel** no debe utilizarse en caso de problemas dermatológicos que alteren la integridad de la piel. En caso de irritación, deje de utilizarlo y consulte a su médico.

KELO-COTE® Gel puede manchar la ropa si no se ha aplicado del todo. Mantenga el producto alejado de fuentes de ignición y no fume mientras aplica el producto ni mientras se está secando. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese a temperatura inferior a 25 °C. No utilizar después de la fecha de caducidad (EXP) que consta en el tubo.

Componentes: Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Silica, Dimethicone Crosspolymer

Cantidad: 6 g, 15 g, 30 g y 60 g

El número de lote y la fecha de caducidad vienen indicados en la base del cartón.

www.kelo-cote.es

Fabricante:

 Advanced Bio-Technologies, Inc, 4830 West Kennedy Blvd, Suite 600, Tampa, Florida 33609, EE. UU.

 Alliance Pharma S.r.l., Viale Restelli 5, 20124 Milán, Italia

US Patent 5,741,509

Eur. Patent-Nr. 1439866, 1409034

*Gold MH et al. Dermatol Surg 2014;40: 825-831

FÓRMULA AVANÇADA PARA TRATAMENTO DE CICATRIZES

KELO-COTE® Gel é um gel de silicone transparente, leve e autosecante para o tratamento de cicatrizes. **KELO-COTE® Gel** seca rapidamente e forma uma película flexível, à prova de água, contra a invasão química, física e microbiana do local da cicatriz, ajudando em simultâneo com a hidratação. Isto cria um ambiente que permite a maturação da cicatriz através da síntese de colágeno normalizada e ajuda a melhorar a aparência fisiológica e estética da cicatriz.

Foi demonstrado que **KELO-COTE® GEL** alisa, amolece e suaviza as cicatrizes, aliviando o prurido, o desconforto e a dor das cicatrizes, reduzindo igualmente a descoloração associada a cicatrizes. Foi demonstrando que os géis de silicone são eficazes no tratamento de cicatrizes anormais na forma de cicatrizes hipertróficas e queloides. As Recomendações Clínicas Internacionais de 2014 sobre o Tratamento da Cicatriz apoiam a utilização de silicones como terapia de primeira linha preferencial para o tratamento de cicatrizes hipertróficas lineares, queloides menores e na prevenção de cicatrizes hipertróficas.*

Aplicação:

KELO-COTE® Gel está indicado no tratamento e na prevenção de cicatrizes hipertróficas e de queloides resultantes de queimaduras, procedimentos cirúrgicos gerais e feridas por traumatismo.

KELO-COTE® Gel é adequado para utilização no rosto e no corpo. **KELO-COTE® Gel** pode ser utilizado em cicatrizes em articulações, zonas de flexão, áreas pilosas e de grande dimensão, como as causadas por queimaduras ou traumatismo maior. **KELO-COTE® Gel** é adequado para utilização em crianças com mais de 3 meses de idade e em pessoas com pele sensível.

Instruções de utilização:

Certifique-se de que a área afetada está limpa e seca. Em caso de utilização do tubo de 60 g, retire a tampa e remova a película metalizada antes da aplicação. No caso do tubo de 6 g e 15 g, corte a ponta do bocal com uma tesoura limpa antes da aplicação. Aplique **KELO-COTE® Gel** na área em camada muito fina duas vezes por dia, com as mãos limpas, e deixe secar. Para efeito máximo, **KELO-COTE® Gel** deve estar em contacto com a pele 24 horas. Depois de seco, **KELO-COTE® Gel** pode ser coberto com protetores solares ou produtos cosméticos. Volte a colocar a tampa após a utilização.

Se **KELO-COTE® Gel** não tiver secado dentro de 4-5 minutos, provavelmente usou demasiado produto. Retire o excesso com cuidado e deixe o processo de secagem continuar.

O tempo de tratamento mínimo recomendado é de 60-90 dias. As cicatrizes maiores e mais antigas podem demorar mais tempo, sendo recomendada a continuação da utilização caso ainda se observe melhoria após os 90 dias iniciais.

Cuidado:

Apenas para uso externo. Não utilize em caso de hipersensibilidade a algum dos ingredientes de **KELO-COTE® Gel**. Evite o contacto direto com os olhos, as membranas mucosas, queimaduras de terceiro grau e feridas abertas. **KELO-COTE® Gel** não deve ser utilizado em doenças dermatológicas que comprometam a integridade da pele. Em caso de irritação, deixe de utilizar e consulte o seu médico.

KELO-COTE® Gel pode manchar a roupa se não estiver totalmente seco. Manter afastado de fontes de ignição e não fumar enquanto aplicar o produto ou enquanto o produto estiver a secar.

Manter fora do alcance das crianças. Armazenar a temperatura inferior a 25 °C. Não utilizar após o prazo de validade (EXP) impresso no tubo.

Ingredientes: Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Silica, Dimethicone Crosspolymer

Conteúdo: 6 g, 15 g, 30 g e 60 g

O número do lote e a data de validade encontram-se impressos na base da caixa

www.kelocote.pt

Fabricante:

 Advanced Bio-Technologies, Inc, 4830 West Kennedy Blvd, Suite 600, Tampa, Florida 33609, EUA

 Alliance Pharma S.r.l., Viale Restelli 5, 20124 Milão, Itália

US Patent 5,741,509

Eur. Patent-Nr 1439866, 1409034

*Gold MH et al. Dermatol Surg 2014;40: 825-831

 ALLIANCE

SILIKONGEL ZUR NARBENBEHANDLUNG

KELO-COTE® Gel ist ein transparentes, selbsttrocknendes Silikongel zur Behandlung und Prävention von Narben. **KELO-COTE® Gel** trocknet sehr schnell und bildet auf dem Narbengewebe einen flexiblen und wasserfesten Schutzfilm (Okklusionsfilm), der die Narbe gegen chemische, physikalische und mikrobielle Einflüsse schützt.

Gleichzeitig wird das Narbengewebe hydratisiert. Dadurch wird ein Umfeld geschaffen, in welchem sich die Narbe durch eine normalisierte Kollagensynthese regenerieren kann. Das physiologische und kosmetische Erscheinungsbild der Narbe wird verbessert.

KELO-COTE® Gel flacht Narben nachweislich ab und macht sie weicher und geschmeidiger. Der Juckreiz sowie andere durch Narben verursachte Beschwerden werden gelindert, Hautrötungen werden reduziert.

Silikongele sind nachweislich bei der Behandlung abnormer Narbenbildung in Form von hypertrophen Narben und Keloiden wirksam. In den internationalen klinischen Leitlinien zur Therapie von pathologischen Narben aus dem Jahr 2014 wird Silikon als bevorzugte First-Line-Therapie bei der Behandlung von hypertrophen Narben und kleinen Keloiden sowie zur Prävention hypertropher Narben unterstützt.*

Verwendungszweck:

KELO-COTE® Gel ist zur Behandlung und Prävention hypertropher Narben und Keloiden nach Verbrennungen, chirurgischen Eingriffen und Verletzungen bestimmt.

KELO-COTE® Gel eignet sich zur Anwendung im Gesicht und auf dem Körper. **KELO-COTE® Gel** kann auf Gelenken, in Beugen, auf behaarten Stellen und auf großflächigen Narben, die durch Verbrennungen oder schweren Verletzungen verursacht wurden, aufgetragen werden.

KELO-COTE® Gel ist auch für Kinder ab 3 Monaten und zur Anwendung auf empfindlicher Haut geeignet.

Anwendung:

Beginnen Sie mit der Anwendung sobald die Wunde vollständig geschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnde Hautpartie sauber und trocken ist. Entfernen Sie vor der Anwendung bei der 60g-Tube die Verschlusskappe und Abziehfolie. Bei der Tube mit 6g und 15g schneiden Sie die Spitze mit einer sauberen Scherer ab. Tragen Sie **KELO-COTE® Gel** mit einem sauberen Finger zweimal täglich hauchdünn auf den betroffenen Bereich auf und lassen Sie es trocknen. **KELO-COTE® Gel** sollte 24 Stunden auf der Haut bleiben, um einen maximalen Effekt zu erzielen. Nachdem **KELO-COTE® Gel** getrocknet ist, können mineralischer Sonnenschutz oder Kosmetika aufgetragen werden. Setzen Sie die Verschlusskappe nach der Anwendung wieder auf. Wenn **KELO-COTE® Gel** nicht innerhalb von 4-5 Minuten getrocknet ist, haben Sie wahrscheinlich zu viel Gel aufgetragen. Entfernen Sie vorsichtig das überschüssige Gel und lassen Sie es weiter trocknen. Die empfohlene Behandlungsdauer beträgt mindestens 60-90 Tage. Bei größeren und älteren Narben kann eine längere Anwendung notwendig sein und wird empfohlen, wenn eine Verbesserung nach den ersten 90 Tagen nicht zu beobachten ist.

Wichtige Hinweise:

Nur zur äußeren Anwendung. Wenden Sie **KELO-COTE® Gel** nicht an, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den Augen, Schleimhäuten, Verbrennungen dritten Grades und offenen Wunden. **KELO-COTE® Gel** darf nur auf die unversehrte Haut aufgetragen werden. Brechen Sie die Anwendung ab, wenn Hautirritationen auftreten, und konsultieren Sie Ihren Arzt.

KELO-COTE® Gel kann zur Verfärbung der Kleidung führen, wenn es nicht vollständig getrocknet ist. Von Zündquellen fernhalten und nicht rauchen, während das Produkt aufgetragen wird oder während es trocknet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Unter 25 °C lagern. Nicht nach dem auf der Tube aufgedruckten Verfalldatum (EXP) verwenden.

Inhaltsstoffe: Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Silica, Dimethicone Crosspolymer

Packungsgrößen: 6g, 15g, 30g und 60g

LOT und Verfalldatum: Siehe Bodenlasche

www.kelo-cote.de

Hersteller:

 Advanced Bio-Technologies, Inc, 4830 West Kennedy Blvd, Suite 600, Tampa, Florida 33609, USA

 Alliance Pharma S.r.l., Viale Restelli 5, 20124 Milano, Italien

US Patent 5,741,509

Eur. Patent-Nr. 1439866, 1409034

*Gold MH et al. Dermatol Surg 2014;40: 825-831

00000
TR1960448
Rev 10/2019