

## NeyFoc® Nr. 69 D7

### Wirkstoff:

[Extractum lyophilisatum ex diencephal. lysat. bovis fetal. (10 %) et cerebellum lysat. bovis fetal. (5 %) et cort. cerebri lysat. bovis fetal. (5 %) et cerebrum lysat. bovis fetal. (5 %) et medull. spinal. lysat. bovis fetal. (5 %) et hepar lysat. bovis fetal. et juv. (1:1) (10 %) et pancreas lysat. bovis juv. (10 %) et lien lysat. bovis fetal. (5 %) et gland. thyreoid. lysat. suis juv. (5 %) et thym. lysat. suis juv. (15 %) et placenta lysat. bovis tot. (fet. et mat. 1:1) (20 %) et mucosa vesic. urin. lysat. bovis fetal (1,25 %) et mucosa vesic. fellea lysat. bovis juv. (1,25 %) et mucosa nasalis lysat. bovis fetal (1,25 %) et mucosa int. crassi et tenuis lysat. bovis fetal (1:1) (1,25 %)] Dil. D7 aquos.

Homöopathisches Arzneimittel

### Zusammensetzung:

1 Amp. (2 ml) enthält:

### Arzneilich wirksamer Bestandteil:

[Extractum lyophilisatum ex diencephal. lysat. bovis fetal. (10 %) et cerebellum lysat. bovis fetal. (5 %) et cort. cerebri lysat. bovis fetal. (5 %) et cerebrum lysat. bovis fetal. (5 %) et medull. spinal. lysat. bovis fetal. (5 %) et hepar lysat. bovis fetal. et juv. (1:1) (10 %) et pancreas lysat. bovis juv. (10 %) et lien lysat. bovis fetal. (5 %) et gland. thyreoid. lysat. suis juv. (5 %) et thym. lysat. suis juv. (15 %) et placenta lysat. bovis tot. (fet. et mat. 1:1) (20 %) et mucosa vesic. urin. lysat. bovis fetal (1,25 %) et mucosa vesic. fellea lysat. bovis juv. (1,25 %) et mucosa nasalis lysat. bovis fetal (1,25 %) et mucosa int. crassi et tenuis lysat. bovis fetal (1:1) (1,25 %)] Dil. D7 aquos. (HAB, V. 5b) 20 mg.

**Sonstige Bestandteile:** Natriumchlorid 18,10 mg, Wasser für Injektionszwecke 1961,90 mg.

### Darreichungsformen und Packungsgrößen:

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Originalpackung: 5 OPC-Ampullen zu je 2 ml

Klinikpackung: 50 OPC-Ampullen zu je 2 ml

### Pharmazeutischer Unternehmer:

vitOrgan Arzneimittel GmbH, Postfach 4240, 73745 Ostfildern

Tel. (0711) 44812-0, Fax (0711) 44812-41, E-Mail: info@vitOrgan.de

### Hersteller:

Solpharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH

Industriestraße 3, 34212 Melsungen

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

**Gegenanzeigen:**

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Eiweißbestandteile vom Rind und/oder Schwein.

Bei Kinderwunsch oder Schwangerschaft und in der Stillzeit darf NeyFoc® Nr. 69 D7 nicht angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

NeyFoc® Nr. 69 D7 sollte bei Infekten und Entzündungsprozessen nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Wechselwirkungen:**

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, wird 2- bis 3-mal pro Woche 1 Ampulle NeyFoc® Nr. 69 D7 i. c., s. c., i. m. appliziert.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat angewandt werden.

**Nebenwirkungen:**

In Ausnahmefällen kann es bei allergisch disponierten oder vorsensibilisierten Patienten unter der vorgeschlagenen Dosierung zu Übelkeit, Pulsbeschleunigung, Beklemmungsgefühl oder Exanthem kommen. Diese sind durch Antiallergika (Antihistaminika), gegebenenfalls Glucocorticoide, beherrschbar. Bei lokalen Reizerscheinungen sind entzündungshemmende Externa anzuwenden.

Hinweis:

Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldungen von Nebenwirkungen:**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Nicht über 25° C aufbewahren.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Datum der Fassung der Packungsbeilage: 10/2018

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren**

Apothekenpflichtig  
Reg.-Nr.: 2521396.00.00