

# Verbraucherinformation

## KaRazym® Tabletten

**Nahrungsergänzungsmittel** mit Papain, Bromelain, Pankreatin und Rutin

Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung dar. Eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.

Enzyme sind Eiweißverbindungen, die an allen Vorgängen im lebenden Organismus beteiligt sind. Enzyme werden daher auch „Biokatalysatoren“ genannt.

Bei den in **KaRazym®** enthaltenen Enzymen handelt es sich um eiweißspaltende Enzyme (Proteasen) aus Pflanzen (Papayas, Ananas) und Tieren (Schweinen).

**KaRazym®** Tabletten sind mit einem magensaftresistenten Überzug versehen, um die Enzyme und deren Aktivität vor dem Angriff der Magensäure zu schützen. Die Tabletten werden im Dünndarm aufgelöst und die Enzyme freigesetzt.

In der Herstellung von **KaRazym®** werden Enzyme mit hoher Aktivität verwendet, die Aktivität pro Tablette ist für die Bewertung der Qualität ausschlaggebend.

Eine Tablette **KaRazym®** (magensaftresistent) enthält:

Papain	120 mg
Bromelain	90 mg
Pankreatin	50 mg (enthält Trypsin, Chymotrypsin, Lipase und Amylase)
Rutin	50 mg

Proteolytische Gesamtaktivität: mind. 1.800 FIP pro Tablette

### Inhaltsstoffe bezogen auf Tagesdosis:

Tagesdosis 4 Tabletten		Tagesdosis 6 Tabletten	
Papain	480 mg	Papain	720 mg
Bromelain	360 mg	Bromelain	540 mg
Pankreatin*)	200 mg	Pankreatin*)	300 mg
Rutin	200 mg	Rutin	300 mg

\*) enthält Trypsin, Chymotrypsin, Lipase und Amylase

### Zutaten:

Papain, Bromelain, Pankreatin, Rutin, Inulin, Trennmittel: mikrokristalline Cellulose, Speisefettsäuren und Siliciumdioxid; Füllstoff: vernetzte Carboxymethylcellulose; Verdickungsmittel: Hydroxypropylcellulose und Hydroxypropylmethylcellulose; gereinigtes Wasser, Überzugsmittel: Talkum; Säureregulator: Natriumhydroxid; Aroma (Vanille).

**Laktosefrei, glutenfrei, zuckerfrei, farbstofffrei**

**Empfohlene Tagesdosis:**

Die ersten drei Tage: 2 x 3 Tabletten (6 Tabletten) pro Tag,  
in weiterer Folge: 2 x 2 Tabletten (4 Tabletten) pro Tag

Die Tabletten am besten 1 Stunde vor oder 2 Stunden nach der Mahlzeit mit reichlich Flüssigkeit einnehmen. Die angegebene empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Unter zusätzlicher Einnahme von **KaRazym**<sup>®</sup> kann es zu einer Wirkungsverstärkung von blutverdünnenden Mitteln (z.B. Marcoumar<sup>®</sup>) kommen. Sie sollten daher **KaRazym**<sup>®</sup> nicht verwenden, wenn Sie Medikamente zur Blutverdünnung einnehmen.

Falls bei Ihnen Unverträglichkeiten gegen Inhaltsstoffe der Papaya oder der Ananas bekannt sind, sollten Sie **KaRazym**<sup>®</sup> ebenfalls nicht einnehmen.

Das **Mindesthaltbarkeitsdatum** auf der Außenverpackung und am Tablettenblister beachten. Nach Ablauf nicht mehr anwenden.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken und bei Raumtemperatur lagern.

**Verfügbare Packungsgrößen:**

**KaRazym**<sup>®</sup> Tabletten zu: 100 Stk. (PZN D: 2512129 / PZN Ö: 3573363)  
200 Stk. (PZN D: 2512141 / PZN Ö: 3573386)  
400 Stk. (PZN D: 7360078 / PZN Ö: 3269197)

In Apotheken und online unter [www.volopharm.com](http://www.volopharm.com) erhältlich.

**Weitere Auskünfte zu KaRazym<sup>®</sup> Tabletten erhalten Sie:**

Tel. Nr. Deutschland: +49 (0) 8654 / 608 730  
E-Mail: [office@volopharm.com](mailto:office@volopharm.com)  
Home: <http://www.volopharm.com/de>

Tel. Nr. Österreich: +43 (0) 732 / 23 73 74  
E-Mail: [office@volopharm.com](mailto:office@volopharm.com)  
Home: <http://www.volopharm.com>

VOLOPHARM GmbH Deutschland  
Münchener Straße 67  
D-83395 Freilassing

**Stand der Verbraucherinformation: Juni 2023**