

## **Spenglersan® Kolloid Dx Mischung**

zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren

Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsinformation, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Spenglersan® Kolloid Dx** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern, müssen Sie einen Arzt aufsuchen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Was ist **Spenglersan® Kolloid Dx** und wofür wird es angewendet?

1. Was müssen Sie vor der Anwendung von **Spenglersan® Kolloid Dx** beachten?
2. Wie ist **Spenglersan® Kolloid Dx** anzuwenden?
3. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
4. Wie ist **Spenglersan® Kolloid Dx** aufzubewahren?
5. Weitere Informationen

### **1. Was ist Spenglersan® Kolloid Dx und wofür wird es angewendet?**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

*Hinweis:* Bei einer Selbstbehandlung sollte darauf geachtet werden, dass bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden ein Arzt aufgesucht werden sollte. Es könnte sich um Erkrankungen handeln, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Spenglersan® Kolloid Dx beachten?**

**2.1 Spenglersan® Kolloid Dx darf nicht angewendet werden**, wenn Sie überempfindlich sind gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Bei Patienten mit hochgradigen Rhythmusstörungen oder Stenokardien und während der Schwangerschaft sollte **Spenglersan® Kolloid Dx** nicht angewendet werden.

**Spenglersan® Kolloid Dx** nicht anwenden bei Kindern unter 12 Jahren.

**2.2 Besondere Vorsicht** bei der Anwendung von **Spenglersan® Kolloid Dx** ist erforderlich in der Schwangerschaft und

Stillzeit: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte **Spenglersan® Kolloid Dx** in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich bei der Anwendung des Arzneimittels bei älteren Menschen und für die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

### **2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:**

Damit **Spenglersan® Kolloid Dx** wirken kann, sollten Sie mindestens 12 Stunden vor der Einreibung keine schmerzstillenden oder beruhigenden Medikamente anwenden. Metallgegenstände an Händen und Armen sollten während der Anwendung abgelegt werden.

*Hinweis:* Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### **3. Wie ist Spenglersan® Kolloid Dx anzuwenden?**

Wenden Sie **Spenglersan® Kolloid Dx** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

**3.1 Die Dosierung sollte nur nach Rücksprache** mit einem Arzt oder einem homöopathischen Therapeuten festgelegt werden.

**3.2 Art der Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren:** Sprühen Sie die verordnete Anzahl Sprühstöße in die Ellenbeuge und reiben Sie das Arzneimittel mit dem Daumenballen in die Haut ein. Es ist möglich, die verordnete Menge portionsweise aufzusprühen und einzureiben.

*Hinweis:* Halten Sie beim Sprühen die Flasche senkrecht und betätigen Sie vor dem erstmaligen Benutzen mehrfach den Sprühmechanismus bis zum Austritt eines feinen Nebels.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Therapeuten, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **Spenglersan® Kolloid Dx** zu stark oder zu schwach ist.

**3.3 Wenn Sie eine größere Menge von Spenglersan® Kolloid Dx angewendet haben** als Sie sollten, ist nicht mit Intoxikationen zu rechnen.

**3.4** Wenn Sie die Anwendung von **Spenglersan® Kolloid Dx** vergessen haben, holen Sie diese Anwendung nicht nach.

**3.5** Wenn Sie die Anwendung von **Spenglersan® Kolloid Dx abbrechen**, können sich die vorhandenen Beschwerden erneut verschlimmern. In diesem Fall sollten Sie unverzüglich Ihren Arzt bzw. Therapeuten befragen.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

*Hinweis:* Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

#### *Meldung von Nebenwirkungen*

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn  
Website: <http://www.bfarm.de>

#### *Für Impfstoffe und biologische Arzneimittel gilt alternativ:*

Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel  
Paul-Ehrlich-Institut  
Paul-Ehrlich-Str. 51-59, D-63225 Langen  
Tel: +49 6103 77 0, Fax: +49 6103 77 1234  
Website: <http://www.pei.de>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist Spenglersan® Kolloid Dx aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25°C aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

#### **6. Weitere Angaben**

Was **Spenglersan® Kolloid Dx** in 10 g enthält:  
Die Wirkstoffe sind:

Antigene aus *Staphylococcus aureus* subsp. *aureus*  
Spengler ad usum externum Dil. D9  
(HAB, Vorschrift 58a) 1,67 g

Antitoxine aus *Staphylococcus aureus* subsp. *aureus*  
Spengler ad usum externum Dil. D9  
(HAB, Vorschrift 58b) 1,67 g

Antigene aus *Streptococcus pneumoniae* subsp. *pneumoniae*  
Spengler ad usum externum Dil. D9  
(HAB, Vorschrift 58a) 3,33 g

Antitoxine aus *Streptococcus pneumoniae* subsp. *pneumoniae*  
Spengler ad usum externum Dil. D9  
(HAB, Vorschrift 58b) 3,33 g

gemeinsam potenziert über 8 Stufen.

Sonstige Bestandteile: Thymol, Salzsäure 25 % (m/V)

1 Sprühstoß entspricht 1 Tropfen.

**Spenglersan® Kolloid Dx** ist eine Mischung zur Anwendung auf der Haut und in Sprühflaschen mit 10 ml und 20 ml erhältlich.

Anwendung auf der Haut

Reg.-Nr.: 2522595.00.00

Hersteller:

Spenglersan GmbH · Steinfeldweg 13 · 77815 Bühl  
Tel: (07223) 3 06 71 · Fax: (07223) 87 13  
Email: [info@spenglersan.de](mailto:info@spenglersan.de) · <http://www.spenglersan.de>

Diese Information wurde zuletzt überarbeitet: Oktober 2013.

---

Sie haben ein homöopathisches Arzneimittel der SPENGLERSAN GmbH erhalten. Dieses Arzneimittel ist nach den Vorschriften des offiziellen Homöopathischen Arzneibuches (HAB) Deutschland und den internationalen Richtlinien für eine sorgfältige Herstellung (GMP) produziert worden. Sie können sich deshalb auf eine gleich bleibende Qualität unserer Arzneimittel verlassen.

Wir wünschen Ihnen baldige Besserung und Wohlbefinden.

Ihre SPENGLERSAN GmbH