

Promanum[®] pure

Händedesinfektion mit speziellem Rückfettersystem

EIGENSCHAFTEN

- Händedesinfektionsmittel mit ausgesuchten Rückfettern
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Farbstoff- und parfümfrei
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze
- Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren)
- Dermatologisch getestet

DGHM-/VAH-, RKI-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste



WIRKSPEKTRUM / EINWIRKZEITEN

EINSATZGEBIET	NORM	EZ
hygienische Händedesinfektion	EN 1500	30 Sek.
chirurgische Händedesinfektion	EN 12791	90 Sek.
bakterizid	EN 13727	15 Sek.
MRSA	EN 13727	15 Sek.
levurozid	EN 13624	15 Sek.
tuberkulozid**	EN 14348	15 Sek.
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	DVV/RKI	15 Sek.
begrenzt viruzid PLUS, gemäß DVV	DVV/RKI	30 Sek.
Rotaviren	DVV/RKI	15 Sek.
Noroviren***	DVV/RKI	15 Sek.
Adenoviren	DVV/RKI	30 Sek.

** Nach Vorgabe des RKI soll bei der Kontamination mit Mykobakterien die hygienische Händedesinfektion 2-mal durchgeführt werden.

*** Surrogatvirus MNV

LIEFERFORM	VE	Art.-Nr.	PZN
100 ml-Flasche	20	19591	08815842
500 ml-Spenderflasche	20	19592	08815948
500 ml-Spenderflasche mit aufgesetzter Dosierpumpe	20	19751	11139729
1000 ml Spenderflasche	10	19593	08815977
1000 ml Spenderflasche mit aufgesetzter Dosierpumpe	10	19752	11139712
5 Liter-Kanister	1	19594	08816008

Promanum[®] pure

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoffe:* Ethanol (100%) 73,4 g, 2-Propanol (Ph. Eur.) 10,0 g. *Sonstige Bestandteile:* Gereinigtes Wasser, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), Butan-2-on, Sorbitol (Ph. Eur.), (Hexadecyl,octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Povidon K 30. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 2-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Kontaktallergie. Hautirritationen wie Rötung und Brennen insbesondere bei häufiger Anwendung.

Warnhinweise: Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 14 °C Flammpunkt nach DIN 51755.

Stand der Information: 03/2012

Pharmazeutischer Unternehmer: B.Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen