

BIGUANELLE® GEL

Dermatologisches Gel, pH 4,0 - Tube mit 30 ml

ZUSAMMENSETZUNG

Hydroxyethylcellulose	2,50 g
Glycerol	2,00 g
Kaliumchlorid	0,20 g
Polyhexamethylenbiguanid-Hydrochlorid (PHMB)	0,15 g
Natriumedetat	0,15 g
Milchsäure	0,01 g
gereinigtes Wasser	auf 100 ml

KATEGORIE

Medizinprodukt

EIGENSCHAFTEN

Biguanelle® Gel schützt Haut und die Schleimhäute bei Erkrankungen und sorgt für eine optimale Regeneration, auch bei geschädigter Haut. Das Produkt beinhaltet Polyhexanid (PHMB), enthält keine Duftstoffe und der pH-Wert liegt bei 4,0.

DARREICHUNGSFORM

Dermatologisches Gel

KLINISCHE ANGABEN

ANWENDUNGSGEBIETE

Gel zur Behandlung von Vulvitis und Balanitis, dessen Wirkung auf der Wiederherstellung des natürlichen pH an den behandelten Stellen und der damit einhergehenden verminderten Vermehrung von pathogenen Keimen beruht, auch in Gegenwart von Läsionen. Biguanelle® Gel unterstützt die natürliche Regeneration des physiologischen pH von Haut und Schleimhäuten bei pathogenen Veränderungen. Das Produkt beinhaltet Polyhexanid (PHMB), enthält keinerlei Duftstoffe und der pH-Wert liegt bei 4,0.

GEGENANZEIGEN

Bekannte Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

NEBENWIRKUNGEN

In einigen Fällen ist das Auftreten von Intoleranz möglich (Brennen oder Reizung), was jedoch nicht besorgniserregend ist und auch keine Änderung der Behandlung erforderlich macht. Bei allen Nebenwirkungen, die im Verdacht des Zusammenhangs mit der Verwendung des Produktes stehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

UNVERTRÄGLICHKEITEN

Keine.

AUSWIRKUNGEN AUF FAHRTEN UND BEDIENUNG VON MASCHINEN

Es sind keine Auswirkungen bekannt hinsichtlich der Verkehrstauglichkeit oder des Bedienens von Maschinen.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Sofern keine anderen Anweisungen durch den Arzt gegeben wurden wird empfohlen, das Gel 1 bis 2 mal am Tag (morgens und abends) leicht einmassierend auf die zu behandelnde Fläche über einen Zeitraum von mindestens 7 Tagen aufzutragen.

WARNHINWEISE

Der Gebrauch aller Produkte zur topischen Verwendung, besonders über einen längeren Zeitraum hinweg, kann zu einer Sensibilisierung führen. In diesem Fall sollte die Behandlung abgebrochen und ein Arzt aufgesucht werden für eine anderweitig geeignete Therapiemaßnahme. Unter normalen Anwendungsbedingungen sind keine Schäden durch Überdosierung bekannt. Bei Allergien gegen einen der Bestandteile sollte das Produkt nicht verwendet werden. Die Anwendung in der Schwangerschaft sollte nur in dringenden Fällen und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Nach Ablauf des auf der Verpackung sichtbaren Haltbarkeitsdatums das Produkt nicht mehr anwenden. Bei nicht intakter Konfektion sollte das Produkt nicht verwendet werden. Die Tube nach Gebrauch gut verschließen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht schlucken.

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Bei Zimmertemperatur, vor Licht und Hitze geschützt aufbewahren.

INHALT DER PACKUNG

Tube mit 30ml

Datum der letzten Überarbeitung der Gebrauchsanweisung: 30/07/2014



Hersteller: Lo.Li. Pharma Srl - Via dei Luxardo, 33 - 00156 Rom, Italien

Vertrieb in Österreich:
Karmed HandelsgesmbH
Arsenal Objekt 3, Top 15
1030 Wien
Österreich

Vertrieb in Deutschland:
Marckyrll
Kapt.-Rueter-Strasse 53
D-26871 Papenburg
Deutschland