

# Salus Mistel

Arzneitee, Visci albi herba

freiverkäufliches Arzneimittel

- Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Unterstützung der Kreislauffunktion

Artikel	Menge	Grundpreis
Mistel	1 Btl à 100 g	61,90 € / 1 kg
Art. Nr.: 01001664   PZN: 06145113		

## Anwendungen, Dosierung, Verzehrempfehlung

Hinweise zur Einnahme / Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

1 Esslöffel (ca. 2 g) Mistel mit 150 ml Wasser (ca. 1 Tasse) kalt ansetzen und 1 – 2 Stunden unter gelegentlichem Umrühren ziehen lassen. Danach abseihen. Nach dem Abseihen des Mistelkrauts kurz aufkochen und danach auf Trinktemperatur abkühlen lassen. Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nieren-/ Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Dosierung:

Erwachsene trinken 2 – 3-mal täglich eine Tasse Mistel.

Art der Anwendung:

Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.

Dauer der Anwendung:

Die Dauer der Anwendung beträgt soweit nicht anders verordnet 2 Wochen.

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nieren-/ Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder bei Auftreten anderer als der auf der Packung erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

## Zusammensetzung lt. Packungsangabe

Zusammensetzung und Inhalt der Packung

100 g Arzneitee enthalten als Wirkstoff:  
100 g Mistelkraut, geschnitten.

Sonstige Bestandteile:

keine.

Aufbewahrungshinweise und Haltbarkeit:

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Haltbarkeit nach Anbruch:

5 Monate.

### **PFLICHTANGABEN**

Mistel 100 g Anwendungsgebiete: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel angewendet zur Unterstützung der Kreislauffunktion ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.